

» 에이즈상담실

Q

치과 진료를 받았는데 감염이 걱정됩니다.

☉☉ 요즘 병원상태에 대해 말이 많은데, 제가 1년 전 쯤에 치아가 많이 안 좋아서 치과에 갔었거든요. 근데 치료 받고 나서 2주 후 쯤에 초기증상이 나타나고 그 다음에 무증상기인가요? 초기증상은 언제 나타나고 어떤 종류로 나타나는지 알려주세요. 너무 무섭고 걱정돼요.

A

기구를 공동 사용하는 것만으로는 감염되지 않습니다.

☉☉ 에이즈 감염인과 기구를 공동으로 사용하는 것만으로 에이즈에 감염이 되는 것이 아닙니다. 기구에 감염인의 혈액이 개입이 되고, 동시적으로 나에게도 출혈이 나는 상처 부위나 점막에 침투한 경우에 감염의 가능성을 생각해 볼 수 있는 것입니다. 병원에서 기본적인 소독 등의 세팅이 되어 있고, 만약 소량의 감염인의 혈액이 묻어 있었다 하더라도 동시적인 접촉이 아니라면 감염의 가능성은 희박합니다. 감염이 되어도 증상이 없는 경우가 많고, 일부에서 보이는 증상들도 일반적인 증상들이므로 증상으로는 에이즈 감염 여부를 판단하는데 별 도움이 되지 않습니다.

Q

에이즈에 걸리면 생리가 멈추는 경우가 있나요?

☉☉ 제가 웬지 HIV 보균자 같은 느낌이 많이 듭니다. 정확히 언제부터인지는 기억이 없지만 제 팔과 허벅지 안쪽 부근에 자주 붉은 점들(볼펜으로 꼭 찌른 크기정도?)이 많이 퍼지고 있습니다. 사라지기는커녕 자꾸만 늘어나고 있는 상태라 영 좋지가 않네요. 또 목 부근과 가슴 부근 팔 부근이 자주 가렵습니다. 꼭 벌레물린 것처럼 가려워서 어떨 땐 자면서도 긁습니다.

에이즈에 걸리면 혹시 생리가 멈추는 경우가 있는지요. 전 임신은 아닌데 생리 일자가 지났는데도 안하고 있습니다. 지금은 결혼은 했지만 결혼 전에 낙태수술을 받은 적이 있고, 성관계는 6년 전에 처음으로 한 것 같습니다. 하루빨리 검사를 해보는 게 더 좋을까요?

A

무월경은 에이즈와 상관없이 산부인과에서 진료를 받아보십시오.

☉☉ 혹시 현재 복용중인 약이 있으신지요. 복용중인 약이 있으시다면 현재 몸에 보이는 증상에 대한 의뢰인과 상세한 상의가 필요할 듯합니다. 6년 전에 에이즈 감염이 의심되는 일이 있으셨다는 것이지요. 그러하시다면 지금이라도 에이즈 검사를 받아 확인을 해보시는 것이 필요합니다. (에이즈 검사는 감염이 의심되는 마지막 성관계 후 12주가 경과한 후에 받으시면 됩니다.) 그리고 무월경의 증상은 에이즈와는 관련이 없으니, 무월경이 지속된다면 빨리 산부인과를 방문하시어 진료를 받아보세요.

에이즈 검사는 보건소나 병원, 우리 협회에서 가능하며, 보건소와 협회에서는 무료로 익명으로 검사가 가능합니다.

Q

동성 관계를 원하는데 에이즈에 걸릴까 걱정입니다.

☉☉ 저는 이번에 검사를 받고 확실히 아니라고 판정 났는데요, 문제는 제가 남들 보기는 미친놈 같겠지만 이 반이에요. 이 어린 나이에 그런 걸 깨닫고 나서는 자꾸 여자랑 한다는 생각은 안 들고 남자랑 하고 싶다는 생각이 자꾸 들어요. 에이즈가 걸릴 수 있잖아요. 전 그게 정말 무서워요.

전에 몇 번 만나서 했는데 무서워서 2년 동안 두려움에 떨다가 검사를 받아 아니라는 판정 나와서 기분이 다시 좋아지고 있거든요. 근데 아니라는 판정을 받아도 남자랑 또 만나고 싶고 자꾸(미친 놈 같지만) 하고 싶습니다. 정말 어떻게 해야 하죠? 하고는 싶은데 하면 에이즈에 걸릴 수도 있고, 정말 무조건 참으라는 것도 한계가 있고요. 답변 부탁드립니다.

A

안전한 성관계를 실천하십시오.

☉☉ 여러 가지로 고민이 많으시겠습니다. 일단은 현재까지 검사결과가 음성으로 나왔으니 그것은 축하할 일입니다. 이제는 앞으로의 일에 대하여 고민을 하고 대책을 세워야 하는 것이 문의하신 비와 같이 관건입니다.

우선 중요한 것은 무슨 일이 있어도 안전한 성관계를 하겠다는 의지라고 생각합니다. 에이즈는 감염경로가 잘 알려져 있어서 그 경로를 회피한다면 감염되는 것에 대하여 걱정하지 않으셔도 됩니다. 즉, 혈액, 정액, 질분비액, 모유와의 접촉을 피하는 것이 현명합니다. 가장 이상적인 방법은 성관계를 갖기 전에 상대방과 선생님이 성병과 에이즈 검사를 하고 모두 정상인 상태에서 관계가 이루어진다면 안전한 성관계가 될 것입니다. 물론 서로간만 성관계를 해야 한다는 동의 아래 이루어져야겠지요. 만일 낯선 사람과 성관계를 하게 된다면 반드시 콘돔을 착용하셔야 합니다. 이것은 구강성교도 마찬가지입니다. 물론 실생활에서 적용하려면 귀찮은 면도 있지만, 조금씩 실천하면 쉬워질 것이고 건강한 삶을 유지할 수 있으리라 생각합니다.

Q

다른 약을 먹거나 주사를 맞은 경우 검사결과에 영향이 있나요?

☉☉ 지난주에 에이즈 검사 받았어요. 걱정되는 일이 있던 지 6개월 지나 검사받은 결과는 음성입니다. 그런데 지금 생각해 보니 제가 검사받기 10일 전쯤에 몸이 아파서 항생제랑 진통제를 먹었거든요. 항생제 주사도 맞았어요. 혹시 항생제와 진통제가 검사결과에 영향을 끼치지 않나요? 혹시 양성인데 항생제와 진통제 그리고 항생제 주사 때문에 음성으로 나올 수도 있나요? 항생제나 진통제 먹어도 검사결과는 정확하게 나오나요? 항생제와 진통제를 검사받기 10일전에 복용했고 거기다가 항생제 주사까지 맞았는데 지금 음성이라는 결과가 정확한건가요? 나중에 다시 검사 받아봐야 하나요?

A

다른 질병이나 약 등은 영향을 미치지 않습니다.

☉☉ 안녕하세요. 검사 상 음성이 나왔다고요? 축하드립니다. 항생제나 진통제는 검사 결과에 영향을 미치지 않습니다. HIV바이러스에 대한 항체를 검사하는 것이기에, 다른 질병이나 복용하는 약 등은 문제가 되지 않습니다. 6개월 후의 검사라면 정확하니 걱정하지 마세요, 좋은 하루 되세요.