

Q&A

레드리본 에이즈 상담실

Q | 귀를 뚫었는데 감염이 걱정됩니다.

얼마전에 시내 지하상가에 가서 총으로 귀를 뚫었는데요, 네이비 지식검색을 보니까 총으로 뚫을 때 에이즈를 걸릴 수 있다고 하더라고요. 그래서 걱정이 몹시 걱정이 됩니다. 만약에 에이즈에 걸리게 되면 어떤 소기현상이 있는지 좀 알려주시고, 귀를 총으로 뚫을 때 에이즈에 걸릴 확률이 얼마나 될지 좀 알려주시면 감사하겠습니다.

A | 현실적으로 감염가능성이 없으니 안심하십시오.

걱정하지 않으셔도 됩니다. 에이즈의 감염은 감염원의 체액 속에 있는 HIV가 비감염인의 몸속으로 들어갈 때 가능합니다. 체액이라 함은 혈액, 정액, 주분비액, 모유만 포함되구요. 그렇기에 에이즈는 98%가 감염인과의 직접적인 상관관계로 전파됩니다. 귀를 뚫을 때 에이즈에 감염되려면 님이 뚫기 전에 에이즈 감염인이 그 총으로 귀를 뚫고 님과도 접촉한 상태가 아닌 상태에서 님의 귀를 뚫어 혈액이 접촉되어야만 감염가능성이 있습니다. 하지만 현실적으로 이런 일은 불가능합니다. 귀를 뚫을 때 좀 서서 기다려야 하니 앞사람이 뚫고 바로 님께서 했을 리도 없고 직접 총이 귀에 닿는 것도 아니지요? 총에 각사의 귀걸이를 꼽아서 뚫잖아요. 그리고 피가 종종 흐르는 것도 아니고요. 만약 그 총에 에이즈 바이러스가 묻어 있었다 하더라도 이미 공기 중에 노출되어 감염력은 상실합니다. 인심이 되셨나요? 현재 귀를 뚫을때 감염된 사람은 없습니다.

Q | 공중화장실 사용 시 불안합니다.

공중 화장실 양변기에서 대변을 보다가 물이 항문으로 튀는 경우가 종종 있습니다. 이전 사용시가 감염된 체액을 변기 본체에 묻혔을 경우 감염된 체액이 물속에 섞여 있을 경우가 있다고 가정한다면, 물을 내리지 않은 상태로서 치질 같이 약한 조직이 있는 사람은 위험하지 않을까요? 또 공중 화장실에서 자위행위를 하는 사람이 많다고 들었습니다. 고장으로 물을 내리지 못하는 경우도 있기 때문에 불안합니다.

A | 화장실 공동사용과 같은 일상생활에서는 감염되지 않습니다.

공중 화장실 양변기에서 대변을 보다가 물이 항문에 튀었을 경우에는 감염의 위험이 없습니다. 양변기의 물의 양이 많기 때문에 감염원의 체액이나 상액이 있다하더라도 물에 희석이 되어서 감염의 위험은 없습니다. 물에 섞여있는 감염원의 체액이나 정액속의 바이러스가 물 밖으로 나와서 자신의 몸속으로 들어오거나 알 수는 없습니다. 에이즈는 감염경로가 확실히 밝혀진 질환입니다. 그 외의 일상생활 속에서 에이즈 감염은 걱정하지 않으셔도 무방합니다. 부끄럽게 에이즈 걱정을 하지하시고 건강한 생활하시기 바랍니다.



Q1 안마시술소를 출입한 후 증상이 있습니다.

작년에 사회생활을 시작하면서 들뜬 마음에 안마시술소에 몇 번 갔습니다. 쿠폰은 사용했지만 제가 원래 왼손이 심해서 쿡기도 하고 싱셔도 생기고 하는데, 그 후 처음으로 가슴에 여드름이 하나 생겨서서 왼팔이 정말 부서질 정도로 아프길래 그때부터 에이즈 걱정을 하게 됐습니다.

마지막으로 안마간지 3개월 뒤에 진짜 용기내서 일반병원 갔는데 매독검사랑 소변검사만 해주고 에이즈는 6개월은 되어 해주겠다고 해서 3개월 더 기다리는데 생전 처음으로 다리 전체에 부스럼에 허리, 배, 가슴, 얼굴까지... 사디구니도 부었던 것 같고 냄새도 났고, 거드렁이도 따라왔고, 눈 주위엔 노인처럼 검은 점도 생기고... 고민고민하다가 부기소에서 익명검사하고 10일 뒤에 오라고 하는데 이젠 기약 포기입니다.

양상이겠죠. 이제야 뭘해도 즐겁지 않고, 시금 손에는 정말 카포시육종 하나 똑같이 것이 하나씩 번져갑니다. 이젠 정말 살 의욕이 없습니다. 안마 같은 것은 권찮은 술 일었는데, 진짜 에이즈에 대해 걱정했으면 이런 일 없었으텐데... 이렇을 때부터 후기신이 많아 결국 이렇게 된 것 같아요. 부모님한테 너무나 죄송합니다. 너무 많이 울어서 이제 눈물도 나지 않습니다.

A1 에이즈는 증상으로 예측이 불가능한 질병입니다.

어더 가지 증상으로 걱정이 많이 되시나합니다.

에이즈 감염을 증상으로 예측할 수 있다면 좋겠지만, 에이즈는 증상으로 예측이 불가능한 질병입니다. 또한 수혈로 인해 감염되지 않는 한 보통 8~10년 후 발병됩니다. 기손에 가지고 있는 질병으로 인해 발생된 증상일 가능성이 더 높으니 크게 염려하지 마십시오. 이곳에서 검사를 받은 데리수의 분들도 심각한 증상으로 고만하고 검사를 받고 있습니다. 하지만 검사자 중 양성으로 확인되는 경우는 극히 드는 경우이기에, 증상으로 걱정하지 않으셨으면 하는 바램입니다.

내담자는 의사도 아니고, 에이즈를 전문으로 공부한 사람도 아닙니다. 에이즈만을 전문으로 진료하는 의료인도 검사를 실시하지 않는 한 에이즈 감염을 놓칠 수 없습니다. 증상으로 걱정하기 보다는 그 증상에 해당하는 치료를 받는 것이 중요합니다. 검사를 받으셨더니, 살 내리 결정이며, 이번 검사에서 좋은 결과가 있길 바랍니다. 마음을 편히 갖으시고 결과를 기다려 보십시오.

Q1 동성간 강간을 당하고 나서 증상이 있습니다.

안녕하세요. 저는 고1 남자학생입니다. 6학년 1리니까 4년 전에 남자 2명에게 강간당했습니다. 기억은 잘나지 않지만 고통 없어 한 것 같습니다. 그리고 이후에는 성관계는 하지 않았습니다.

얼마 전에 목상을 심하게 앓았고 평소에는 없지만 몸에 물을 문히면 가슴과 등주위에 붉은 점 같은 게 심하게 많이 생깁니다. 그리고 시수 피곤하고, 몸에 항상 기운이 없는 것처럼 힘이 없어요.

A1 검사를 받으시고 과거의 좋지 않은 일은 떨쳐버리십시오.

과거에 좋지 않은 일이 벌어진 것에 대해 심심한 위로의 말씀을 드립니다.

아마도 초등학교 6학년 때면 사춘기 시절로 많이 예민하고 민감한 시기인데, 좋지 않은 일을 당하면서 많이 힘들었을 것으로 생각되네요. 하지만 감추고 싶은 과거 일수록 당당하게 말할 수 있을 때, 비로소 그 일에 얽매이지 않고 즐겁고 행복한 삶을 살 수 있는 것입니다. 앞으로는 과거의 일로 생활이 위축되지 않기를 바랍니다. 에이즈 감염은 상대가 에이즈 감염인이었을 경우에만 가능성이 존재하는 것입니다. 무조건 동성 간에 항문성교를 했다고 해서 감염되는 것이 아닙니다.

또한 상대가 감염인이었다고 해서 무조건 감염되는 것도 아니어서 한 번의 성관계로 감염될 확률은 0.1~1% 정도입니다. 그러나 일단 불안한 마음부터 가라앉히는 것이 좋겠네요.

님께서 말씀하시는 증상들이 에이즈 증상은 아닙니다. 감염이 되면 나타날 수도 있다는 것이지요. 하지만 그러한 증상들은 초기에 나타날 수 있는 증상들로 감염 후 3~6주 사이에 나타났다가 약 2주간 지속되고 자연히 사라지지요.

7 후부터는 무증상기입니다. 무증상기는 아무런 증상이 나타나지 않는 시기라는 뜻이지요.

지금 님께 나타나고 있는 증상들을 에이즈외 연관 짓지 마시고, 증상에 맞는 전문병원에 가서서 치료를 받으십시오. 에이즈는 지금이라도 검사를 받아주시면 정확한 결과를 확인하실 수 있습니다.

우리 협회와 부기소에서는 무료, 익명으로 에이즈 검사를 해드리고 있으니 선하로 문의하시기 바랍니다. 문의전화 1588-5448