

# 에이즈상담실 Q&A

## Q 상처에 침투하는 경우

저의 경우는 금년 8월에 직업여성과 관계를 가졌습니다. 관계 시 콘돔을 사용하였습니다. 그런데 여름이다 보니 제 자신의 성기 주변에 껌으로 인한 가려움증으로 여러 군데(성기주변 및 사타구니 등)에 상처가 있었으며 혈액이 비치는 곳도 있었습니다. 상대방의 콘돔으로 인하여 감염이 되었을 가능성은 얼마나 되는지요.  
전 지금 보건소에 검사를 의뢰한 상태인데 기다리는 요즘 크티어 증세에 처해있습니다.

## A 상처부분에 많은 양의 질 분비물이 묻지 않았다면 크게 걱정하실 필요 없어.

조금 여름에 성매매·여성과의 성관계 후 최근에 보건소에 검사를 의뢰한 상태지만 기다리는 시간이 너무 힘들어 협회에서 검사를 받아보고 빨리 결과를 알고 싶군요. 님의 성관계 과정에 대해서 설명 드리면 설명 상대방이 감염인이라 해도 님의 사타구니의 상처 최소한 피가 나는 열린 상처여야 항아부분에 많은 양의 질 분비물이 묻지 않았다면 크게 걱정하실 필요 없습니다. 극히 소량의 질 콘돔으로는 감염가능성이 없습니다. 그리고 상처여 피가 나지 않았다면 크게 염려하실 필요는 없으십니다. 우선 검사를 의뢰한 상태니 결과가 나올 때 까지 편안한 마음으로 기다려 보시게 간 어떻게요. 상대방이 감염인인지 비감염인인지 확실치 않은 상태에서 미리 걱정하실 필요는 없습니다.

## Q u e s t i o n

## Q 감염경로에 대한 질문입니다.

에이즈 감염경로에 대해 몇 가지 질문 드립니다.

만약 에이즈 감염자의 정액이 마우스랑, 눈이 튀어 들어갔다면 100% 감염이 되나요? 콘돔 없이 성관계시 체내사정의 경우에도 무조건 감염되지 않는다고 들었습니다만 눈도 마찬가지로 아닌지 눈은 다른지 질문드립니다.

그리고 전에는 프리킴이라고 하는 사정 전 처나콘돔을 쓰는 에이즈 감염률이 없는줄로 안나되었는데 최근 어떤 사이트에서는 프리킴으로도 감염가능성: 바이 러스가 흔해왔다고 안나 되어 있습니다. 어느게 맞는지, 그리고 감염률이 있다면 정액과 비교하여 감염가능성이나 감염 사례에 대해 안내 부탁드립니다.

## A 점막으로 감염될 확률은 0.09%

감염인의 정액이 소량 눈이 튀어 들어갔을 경우 감염가능성이 궁금하시고 사정전 분비물이 있는 에이즈바이 러스로도 감염이 되는지 궁금하시군요. 에이즈를 일으키는 원인 바이러스인 HIV는 감염인의 체액중 주로 혈액, 정액, 질분비물, 모유등이 많이 존재합니다. 체액이 비감염인의 상처나 점막을 통해 감염되며 콘돔을 사용하지 않은 성관계로 가장 많이 감염되고 있습니다. 님의 경우처럼 매우소량의 정액이 눈이 튀었다고 100%감염되는 것은 아닙니다. 눈등자와는 인접한 점막으로 되어 있으며 점막으로 감염될 확률(0.09%)은 항문성교(0.5-3%)나 질성교(0.1-1.0%)에 비해 낮습니다.

점막으로의 감염확률 0.09%는 에이즈바이 러스가 가장 많이 존재하는 혈액이 튀었을때의 감염확률임을 감안할 때 정액으로 인한 감염확률은 이보다 더 낮다고 할 수 있습니다. 남성 동성관계에서 항문을 통한 처나사정의 경우, 질 성교에 비해 감염확률에서 약간 더 높습니다. 항문에는 모세혈관들이 많이 분포되어 있고 운할처 역할을 하는 콘돔이 분비되지 않아 상처가 나기 쉬워 혈액이 통반될 수 있기 때문입니다. 감염인의 체액은 대부분 에이즈바이 러스가 존재하며 사정전 분비물에는 정액보다는 현저히 낮은 농도이지만 에이즈바이 러스가 존재하기 때문에 성교처음부터 콘돔을 바르게 사용하셔야 감염으로부터 안전합니다. 에이즈는 예방이 가능한 질병입니다. 감염여부를 모르는 사람과 성관계를 갖지 않는것이 가장 좋으나 부득이 한 경우 반드시 처음부터 콘돔을 바르게 사용한다면 성병이나 에이즈의 감염으로부터 자신을 보호 할 수 있습니다.

## Q 감염자인 배우자와의 부부생활

저는 감염자이고 현재 7촌이 며 아내와의 부부관계가 불가능한 상황여서 몇 가지 의문이 있어 문의 드립니다.

- 1) 콘돔을 사용하지 않을 경우 아내가 100% 감염이 되는 것인가요?
- 2) 콘돔을 사용하지 않아도 안전할 수 있는 방법은 없나요?
- 3) 그리고 요양성교시엔 위험한가요?
- 4) 아내가 여방주사 같은것이 라도 맞아야 하나요?

## A 콘돔이 안전한 성관계를 위한 유일한 대안

감염 후 성관계에 대해 궁금하시군요.

감염 후 안전한 성관계는 너무나 중요하다고 할 수 있습니다. 왜냐하면 부부간의 성관계는 부인에게 전파시킬 수 있기 때문입니다. 한 행법상 배우자는 정기 검진대상자로 되어 있으며, 부인이 남당자의 감염사실을 알고 있다고 가정하여 답변 드리겠습니다.

질 1,2의 경우 콘돔 없이 성관계를 하면 0.1-1%의 감염 위험이 있습니다. 현재 콘돔이 안전한 성관계를 하기 위한 유일한 대안입니다.

3) 답변 : 질 성관계나 항문성교에 비해 상대적으로 감염위험은 낮으나 구강성교를 받는 입장이든 허주는 입장이든 감염 가능성은 있습니다. 애무를 하는 입장이라면 사정전 콘비콜이나 정액, 질 콘비콜이 입 속으로 들어올 경우 감염가능성이 있고, 반대로 아쿠 넣는 입장인 경우 상대방의 구강에 활연이 동반되고 자신의 성기에 열증이나 상처가 있어 그 부위에 상대 활연이 닿았다면 감염가능성이 있습니다.

4) 답변 : 어이즈는 현재 원치제나 예방약이 없습니다. 따라서 안전한 성관계를 늘 염두 하두시기를 권해 드립니다.

# A n s w e r

## Q 직장인 건강검진관련

올해부터 직장에서 실시하는 건강검진 항목에 어이즈 검사가 생겼습니다. 검사결과가 회사로 통보되는 경우 어떻게 대처해야 하는지요? 정말 민감한 문제가 발생하여 문의 드립니다. 답변주시면 감사하겠습니다.

## A 지정병원에 담당자에게 도움을 청하는 방법이 가장 현명

아주 어려운 문제에 공략하시어 스트레스가 크시리라 생각합니다.

현재 직장검진의 문제점은 한 두 가지가 아니므로 직접적으로 건강검진에서 불이익을 받지 않을 수 있도록 지금까지의 경험상으로 성공한 사례를 중심으로 말씀드리겠습니다. 우선 직장검진 항목에 어이즈가 포함이 되어있다면 지정병원에 담당자에게 도움을 청하는 방법이 가장 현명합니다. 도움을 청하는 방법은 건강검진표를 담당의에게 제시하고 검진종목에 어이즈가 포함된 경우 검진의료기관의 선택에 대하여 종사하고 있는 직장이 확인하는 방법이 있습니다. 산업안전보건법에 의하면 제 43조에 명시된 근로자는 사업주가 실시하는 건강진단을 받아야 한다. 라고 규정하고 있지만 사업주가 지정한 검사기관이라 할지라도 본인이 희망하지 않으면 다른 건강진단기관으로부터 이에 상응하는 건강진단을 받아 회사에 제출하여 결과를 증명할 수 도 있다. 라고 명시되어 있습니다.

그리고 직장검진에 어이즈가 포함이 되어있다면, 노출이 부담 되겠지만 후천성면역결핍증예방법 제7조에 의한 비밀누설금지조항에 입각하여 타인에게 알리지 않도록 요청하는 방법이 있습니다. 그러나 이것은 현실적으로 상당히 어려운 부분이므로 초후에 선택해야 할 조건으로 남겨두어야 합니다.

만약 보건소나 행정기관과 협조하여 검진을 하게 되더라도 검사 결과란에 음성이나 양성의 표기를 하지 않고 공란으로 남겨두는 방법도 있으나 이것은 인사부에서 관리부에서의 의심을 살 수 있는 문제가 있으므로 그다지 큰 효과를 거두지는 못합니다. 또한 직장검진 후 결과 통보를 사업주에게 일괄 통보 시 감염사실이 직장이나 타인에게 노출되었을 때는 감염인 본인이 검진 및 결과 통보 의사에게 의료인의 설명의무위반으로 법적인 소송을 제기 할 수 있습니다.

이렇게 여러 가지 사례가 있지만 선택은 본인이 유리한 쪽을 결정하시기 바라며 직장의 지속적인 우저어 힘쓰시기 바랍니다. 어렵더라도 여유를 가지고 침착하게 대응하시어 좋은 결과를 내시길 바랍니다.