

東醫寶鑑 中 荊芥가 主藥으로 配伍된 方劑의 活用に 대한 考察

임대환, 전영균, 김원채*
원광대학교 한의과대학 방제학교실, *신북중앙한의원

ABSTRACT

The Applications of *Herba Schizonepetae* Mainly Blended Prescription in *Dongeuibogam*

Dae-Hwan Lim, Young-Kyun Jeon, Won-Chae Kim*
Department of Oriental Medical Prescription, Wonkwang University, *ShinBuk JoongAng Oriental Clinic

This report describes 86 prescriptions related to the use of *Herba Schizonepetae* main blended from *Dongeuibogam*.

The following conclusions were drawn through investigations on the prescriptions that use *Herba Schizonepetae* as a key component.

Prescriptions that *Herba Schizonepetae* was taken as a monarch drug are utilized for 22 therapeutic purposes, for example, eye disease, abscess disease, head and tooth, and woman disease. In particular, 16.3% of prescriptions appear in the chapter of eye.

Prescriptions that utilize *Herba Schizonepetae* as the main component are used in the treatment of eye, abscess and woman disease, head disease, tooth disease and they are also used

-
- 교신저자 : 김원채
 - 전남 영암군 신북면 월평리 108-2번지 신북중앙한의원
 - Tel : 061-471-7581 E-mail : hexa-gon@hanmail.net
 - 접수 : 2009/ 11/ 29 수정 : 2009/ 12/ 07 채택 : 2009/ 12/ 11

for treating 56 different types of disease.

Herba Schizonepetae is used in pathogenic factors such as wind and used in pathology related to the liver and stomach system.

The dosage of Herba Schizonepetae is 1*pun 3li*(about 0.49g) to 4*don*(about 14g), however 5*pun 3li*(about 1.99g)~1*don*(about 3.75g) has been taken the most for clinical application.

Bangpungtang and Saenglyosamultang are the most useful base prescriptions which use the Herba Schizonepetae as the main ingredient.

Key word : Herba Schizonepetae, key component, pathogenic factors, dosage, base prescriptions

1. 緒 論

荊芥는 脣形科(꿀풀과 : Labiatae)에 속한 1년생草本인 형개 및 同屬 近緣植物의 地上部 全草로 학명은 *Schizonepeta tenuifolia* (BENTH.) BRIQ.이다. 주로 가을에 꽃이 필 때 채취하여 햇볕에 말려서 사용하는데, 止血시킬 경우에는 炒炭하여 사용하기도 한다. 따뜻하고 습한 기후와 배수가 잘되는 부드럽고 비옥한 사질양토에서 잘 자라며, 우리나라 전 지역에서 재배한다^{1,2,4,5)}.

荊芥의 性味는 辛, 微溫, 無毒하고 肺·肝 二經에 작용하며, 祛風解表·破結聚之氣·宣毒透疹·利咽喉·止痒·止血·散瘀血 등의 효능이 있어 外感風寒, 혹은 風熱證, 麻疹透發不暢, 風疹瘙痒, 瘡瘍初起, 각종 出血 병증 등을 치료하였으며^{1,3,6,7,17-22)} 荊芥에 대한 기록은 『神農本草經』에서부터 그 유래를 찾아 볼 수 있다.

荊芥의 함유성분으로는 주로 menthone, pulegone 및 isomenthone, menthol 등이 있으며, Triterpene 화합물로는 β -sitosterol, oleanolic acid, ursolic acid 등이 함유되어 있고, 그밖에도 hesperidin, luteolin,

apigenin 등이 함유되어 있다^{8,9,13,15)}. 皮膚의 血液循環作用 및 汗腺의 分泌를 촉진시키는 효능이 있어 경미한 解熱, 鎮痛作用이 있고, 瘡, 癬의 病變組織을 파괴하고 吸收를 촉진하는 作用과 痙攣을 弛緩하는 作用, 健胃驅風 作用 등이 있다^{14,16,17)}.

한편 荊芥는 여러 가지 약물과 함께 配伍하여 다양하게 方劑구성에 사용되어 왔는데, 風熱을 치료할 때는 防風通聖散과 洗肝明目湯에서와 같이 防風, 薄荷, 連翹, 石膏 등을 配伍하여 사용하였으며, 宣毒透疹을 통해 大風瘡를 치료할 때는 加味苦蔘丸 등에서와 같이 牛蒡子, 蛇床子, 蒼耳子, 皂角刺 등을 配伍하여 사용하였으며, 止血을 통해 腸風臟毒을 치료할 때는 槐花散, 腸風黑散, 栝葉湯 등에서와 같이 槐花, 槐角, 枳殼 등을 配伍하여 사용하였다^{1,2,7,12)}.

이와 같이 荊芥는 配伍되는 약물에 따라 다양한 효능을 발휘하고 있는 바, 저자는 東醫寶鑑 중 荊芥가 主藥으로 配伍된 86種²⁵⁻³⁶⁾의 方劑에 대한 治療領域, 病症 및 主治, 病因·病理, 使用量, 處方構成 등의 資料分析을 통하여 荊芥의 활용에 대한 方劑學的 知見을 얻었기에 報告하는 바이다.

II. 本 論

調査方法은 東醫寶鑑 中 荊芥가 主藥으로 配伍된 86處方의 內容을 data base化하여 文獻的 資料分析 및 研究內容을 整理하였다. 處方名은 同一하나 構成內容이 다른 경우는 處方에 (2), (3), (4)를 表記하여 區分하였다.

本 論文에서 主藥이라 함은 處方構成에서 荊芥의 役割이나 使用量이 君臣藥으로 作用하거나, 혹은 여러 가지 藥物과 等分으로 構成되어 있는 경우로 효능과 사용량으로 볼 때 主된 역할을 할 수 있는 것으로 한정하였다.

君臣藥에 대해서는 《素問·至真要大論》에서 “主病之謂君, 佐君之謂臣...”, 《脾胃論》에서는 “君藥分量最多, 臣藥次之, 使藥又次之, 不可令臣過于君”, “力大者爲君”, 《活人心統》에서는 “凡用藥殊分, 主病爲君, 以十分爲率, 臣用七八分, 輔佐五六分, 使以三四分”이라 한 內容을 참조하였다¹⁰⁻¹²⁾.

1. 荊芥가 主藥으로 配伍된 方劑의 治療領域에 대한 調査

荊芥가 主藥으로 配伍된 方劑의 治療領域에 대해 調査하고, 빈도수가 높은 순서대로 整理하였다 (Table 1).

Table 1. 荊芥가 主藥으로 配伍된 方劑의 治療領域

治療領域(病門)	處方名	빈도수	백분율
眼	驅風一字散, 蟬花散(3), 洗肝明目湯, 清涼散, 清肺散, 通血丸, 消毒飲, 速效散, 通肝散, 撥雲退翳丸, 蟬花散(2), 保肝散, 石膏羌活散, 點爛弦風藥	14	16.3
諸瘡	三黃敗毒散, 加味苦參丸, 磨風丸, 宣熱丹, 當歸飲子, 洗藥, 何首烏散, 涼血飲(2), 連翹飲, 洗毒散, 洗下疳瘡方	11	12.8
頭	四神散, 一字輕金散, 上清散, 加減芎辛湯, 菊花茶調散, 消風散, 荊黃湯	7	8.1
牙齒	齧鬼散, 擦牙方, 蜂窩散, 荊芥湯, 當歸連翹飲, 瀉胃湯, 白芷湯	7	8.1
婦人	歸荊湯, 愈風散, 的奇散, 人參荊芥散, 清魂散, 荊芥散, 旋覆花湯	7	8.1
小兒	罩胎散, 加味敗毒散, 紅綿散, 加減紅綿散, 洗疔瘡藥	5	5.8
咽喉	金消丸, 荊黃湯(2), 神效散, 利膈湯, 玉屑無憂散	5	5.8
風	當歸散(2), 理氣祛風散, 清痰順氣湯, 疎風順氣湯	4	4.7
血	加味四物湯, 結陰丹, 荊槐散	3	3.5
癰疽	涼血飲, 連翹敗毒散, 解毒湯	3	3.5
後陰	槐花散, 栝葉湯, 腸風黑散	3	3.5
皮	加減何首烏散, 追風丸	2	2.3
面	連翹散, 加味消毒飲	2	2.3
瘟疫	芩連消毒飲, 柴胡升麻湯	2	2.3
鼻	荊芥連翹湯, 黃芩湯	2	2.3
聲音	荊蘇湯, 人參荊芥散(2)	2	2.3
火	洗心散, 防風通聖散	2	2.3
寒	消風百解散	1	1.2
耳	荊芥連翹湯(2)	1	1.2
手	五靈脂散	1	1.2
咳嗽	金佛草散	1	1.2
疔瘡	散邪湯	1	1.2
합계		86	100.0

2. 荊芥가 主藥으로 配伍된 方劑의 病症 및 主治 調査 하고, 이에 대한 病證 및 主治를 調査하였다 (Table 2).

荊芥가 主藥으로 配伍된 方劑를 疾患別로 區分

Table 2-1. 眼·鼻·耳·咽喉·咳嗽·寒·風·聲音에 荊芥가 主藥으로 配伍된 方劑의 病症 및 主治

領域區分	病症 區分	處 方	主 治
眼	外障	驅風一字散	眼痒極甚
		蟬花散	肝經蘊熱 毒氣上攻 眼目赤腫 生翳多淚
		洗肝明目湯	一切風熱 眼目赤腫疼痛
		清涼散	水瑕深翳青色
		清肺散	肺熱上攻 白睛腫脹 日夜疼痛
		通血丸	治血灌瞳人刺痛 無障翳
		消毒飲	瞼生風粟
		速效散	努肉 紅綠 紅白翳障 及白珠上有死血 紅筋 或上瞼胞腫如桃 日夜疼痛昏暗
	瞳膜	撥雲退瞳丸	瞳膜
		蟬花散(2)	風眼 熱眼 昏溢 腫痛漸生 瞳膜
	內障	通肝散	水瞳
	視一物爲兩	保肝散	風邪入腦 看一成二 欲成內障
	通治眼病	石膏羌活散	遠近內外瞳障 風熱昏暗 爛弦赤眼 倒睫 拳毛 一切目疾
	爛弦風	點爛弦風藥	點眼藥
鼻	鼻淵	荊芥連翹湯	鼻淵
		黃芩湯	肺火盛鼻孔乾燥或生瘡腫痛
耳	耳痛成膿耳	荊芥連翹湯(2)	兩耳腫痛 由腎經有風熱
咽喉	咽喉痛	金消丸	咽喉腫痛
		荊黃湯(2)	風熱結滯 咽喉腫痛 大便秘澀
	喉痺失音	神效散	喉痺 語聲不出
	咽喉瘡	利膈湯	咽喉生瘡
獸骨哽	玉屑無憂散	諸骨哽不下 及纏喉風	
咳嗽	風嗽	金沸草散	肺或風寒 咳嗽 聲重 痰涎黃濁壅盛
寒	傷寒表證	消風百解散	感傷風寒 頭痛 身疼 鼻塞 聲重
風	歷節風	當歸散(2)	熨烙寒濕痛風
	口眼喎斜	理氣祛風散	中風喎斜
		清痰順氣湯	風中經絡 口眼喎斜
手足癱瘓	疎風順氣湯	中風 半身不遂 或全體不能舉動 因元氣虛弱 兼酒色之過 而更挾外邪也	
聲音	卒然無音	荊蘇湯	感風寒卒 及失音 通用
		人參荊芥散(2)	感冒風寒 言語不出 咽乾鼻涕

Table 2-2. 婦人·小兒·血에 荊芥가 主藥으로 配伍된 方劑의 病症 및 主治

領域區分	病症 區分	處 方	主 治
婦人	產後風痙	歸荊湯	產後風痙
		愈風散	產後中風
	產後泄痢	的奇散	產後泄瀉 惡露不行 此餘血滲入大腸 爲瀉 下青黑色物 是驗
	婦人雜病	人參荊芥散	血風體痛 寒熱盜汗 頰赤 口乾 痰嗽 胸滿 或月水不調 臍腹疔痛通 痲癩成塊
	血暈	清魂散	產後血暈
荊芥散		血暈如神	
喘嗽	旋覆花湯	產後感冒風寒 咳喘痰盛	
小兒	發熱三朝	加味敗毒散	小兒發熱
		紅綿散	小兒發熱
	驚搐	加減紅綿散	驚搐
	諸疔	洗疔瘡藥	疔病 遍體生瘡 乃虫蝕皮膚
孕婦痘瘡	罩胎散	妊婦痘瘡	
血	失血眩暈	加味四物湯	血虛 眩暈 卒倒 不可 艾灸 驚哭叫動 動則 乘虛而 死矣
	便血	結陰丹	結陰便血
	齒衄	荊槐散	牙宣出血

Table 2-3. 諸瘡·癰疽·溫疫·後陰·瘰癧·皮에 荊芥가 主藥으로 配伍된 方劑의 病症 및 主治

領域區分	病症 區分	處 方	主 治
諸瘡	疥癬	當歸飲子	遍身疥癬 腫痒 流膿
		洗藥	疥癬 癢痒 生瘡
		何首烏散	遍身 疥癬 癢痒
	大風瘡	加味苦參丸	大風瘡
		磨風丸	大風瘡
	有名無名 諸惡瘡	涼血飲(2)	血熱 生瘡
		連翹飲	惡瘡遍身 痛痒及血風瘡
	洗瘡	洗毒散	陰蝕瘡 及諸般惡瘡
洗下疳瘡方		疳瘡	
天庖瘡	三黃敗毒散	天庖楊梅等瘡	
瘰癧	宣熱丹	解瘰癧風熱之毒 自小便出	
癰疽	心癰	涼血飲	心癰 退潮 止渴 解熱 能內消
	癰疽五發	連翹敗毒散	癰疽初發 憎寒壯熱 甚者頭痛拘急 狀似傷寒
	癰疽	解毒湯	癰疽 未破已破皆洗 如成膿潰爛 最要洗 淨然後用藥糝貼
溫疫	大頭瘟	芩連消毒飲	天行大頭病 咽喉腫痛
	瘟疫	柴胡升麻湯	時行瘟疫 頭痛壯熱
後陰	腸風臟毒	槐花散	腸風臟毒
		栢葉湯	腸風
		腸風黑散	腸風 臟毒並治之
瘰癧	瘰癧	散邪湯	風瘰初起
皮	癩風癩瘍 風白駮	加減何首烏散	紫白癩風 及 癩瘍風 白駮癩疹 疥癬 等疾
		追風丸	白癩風

Table 2-4. 頭·牙齒·面·火·手·其他門에 荊芥가 主藥으로 配伍된 方劑의 病症 및 主治

領域區分	病症 區分	處方	主治
頭	頭風	加減芎辛湯	頭風 或攻目
		菊花茶調散	頭風鼻塞或偏正頭痛
		消風散	諸風上攻 頭目昏眩 鼻塞 耳鳴 皮膚麻痒 及婦人血風 頭皮腫痒
	正頭痛	四神散	婦人血風 眩暈 頭痛
		一字輕金散	偏正頭風痛 夾腦風 眉稜骨痛 牽引兩眼抽 掣疼痛迸出 或生瞽膜 視物不明
	眉稜骨痛	上清散	風頭痛 眉骨眼眶俱痛 不可忍
熱暈	荊黃湯	風熱眩暈	
牙齒	齒病	鹹鬼散	胃熱齒痛
		擦牙方	牙齒痛
		蜂窩散	風牙虫牙痛不可忍
		荊芥湯	風熱 齒痛
	蟲蝕痛	當歸連翹飲	齒痛 呷風痛甚 開口臭穢
		瀉胃湯	牙痛如神 此胃熱也
齒病惡寒惡熱	白芷湯	齒痛惡寒	
面	面上雜病	連翹散	面生穀嘴瘡 俗名粉刺
	搭腮腫	加味消毒飲	搭腮腫
火	中焦熱	洗心散	中焦有熱 頭目昏重 咽喉腫痛 口舌生瘡 五心煩熱 便尿秘澀
	通治火熱病	防風通聖散	熱風燥三者之總劑也
手	肩臂病	五靈脂散	風寒濕 氣血壅滯 臂胛疼痛

3. 荊芥가 主藥으로 配伍된 方劑의 病因·病 理 調査 기록된 內容을 調査하여 有形別로 分類^{23,24)}하여 整理하였다(Table 3).
 荊芥가 主藥으로 配伍된 方劑 中 病因·病理가

Table 3. 荊芥가 主藥으로 配伍된 方劑의 病因·病理

區分	病因·病理	病症	處方
風	風	風瘡初起 無汗	散邪湯
	風乘肺	或風寒咳嗽 聲重 痰涎黃濁壅盛	金沸草散
	諸風上攻	頭目昏眩 鼻塞 耳鳴 皮膚 麻痒 及婦人 血風 頭皮腫痒	消風散
	風邪入腦	看一成二 欲成內障	保肝散
	風中血脉	口眼喎斜	理氣祛風散 清痰順氣湯
	產後中風	口噤 牙緊 手足痠癢欲死	愈風散 歸荊湯
	風博皮膚血氣不和	白癩風	
紫白癩風 癩瘍風 白癩 癩疹 疥癬			加減何首烏散

			追風丸	
	風邪客於喉間 氣鬱而熱	咽喉腫痛	金消丸	
	風乘陽明經	搭顛腫	加味消毒飲	
	手陽明虛熱有風	下片牙痛	白芷湯	
風熱	風熱	熱暈	荊黃湯	
		遠近內外腎障 風熱昏暗 爛弦赤眼 倒睫 拳毛 一切目疾	石膏羌活散	
		癩癧	宣熱丹	
	風熱相搏	遍身 疥癬 腫痒 流膿	當歸飲子	
風熱結滯	咽喉腫痛 大便秘澀	荊黃湯(2)		
風熱燥	諸風熱	防風通聖散		
風寒濕	孕婦傷寒	發大熱 或發痘疹 恐傷胎	罩胎散	
	(感傷)風寒	產後感冒風寒 咳喘 痰盛	旋覆花湯	
		卒瘕及失音	荊蘇湯	
	風寒濕	頭痛 身疼 鼻塞 聲重	消風百解散	
寒濕	氣血壅滯 臂胛疼痛	五靈脂散		
時氣	時行溫疫	頭痛 壯熱	柴胡升麻湯	
	時氣之一端	發熱似傷寒未辨疑似間	加味敗毒散	
臟腑	五臟	五藏俱受熱	水瑕深腎青色	
	肝	肝經蘊熱	腎膜 毒氣上攻 眼目赤腫 生腎多淚	蟬花散(2)
		肝臟風熱	一切風熱 眼目赤腫 疼痛	洗肝明目湯
		肝壅瘀血	兩臉上下 初生如粟米大 漸大如米粒 或 赤或白 不甚疼痛	消毒飲
		肝氣盛而發在表	腎膜	撥雲退翳丸
	心	心熱	努肉紅綠 紅白腎障 及白珠上有死血 紅筋 或上瞼胞腫如桃 日夜疼痛 昏暗	速效散
	肺	肺火盛	鼻孔乾燥 或生瘡腫痛	黃芩湯
		肺熱上攻	白睛腫脹 日夜疼痛	清肺散
	腎	腎經有風熱	兩耳腫痛	荊芥蓮翹湯(2)
	膽	膽受風熱	眼痒極甚	驅風一字散
	胃	胃熱	齒痛 喜冷惡熱	瀉胃湯
			齒痛	敲鬼散
		胃中濕熱	齒痛 呷風痛甚 開口臭穢	當歸蓮翹飲
		腸胃有濕	脹滿下血	槐花散
大腸	餘血滲入大腸	產後泄瀉 惡露不行	的奇散	
三焦	中焦有熱	頭目昏重 咽喉腫痛 口舌生瘡 五心煩熱 便尿秘澀	洗心散	
氣血	血熱	諸般遍身瘡 及惡瘡出膿血 痛痒	涼血飲(2)	
	血分熱燥 以致風毒 剋於皮膚	遍身疥癬 瘙痒	何首烏散	
	去血過多	血暈 虛而成暈 脉微澀	加味四物湯	
	陰氣內結 不得外行 血無所稟 滲入腸間	結陰便血	結陰丹	
	氣血暴虛 血隨氣上 迷亂心神	眼前生花 甚者 悶絕 口噤 神昏 氣冷	清魂散	

	因元氣虛弱 兼酒色之過 而更挾外邪	中風 半身不遂 或全體不能舉動	疏風順氣湯
虛勞	婦人虛勞	血風 體痛 寒熱 盜汗 頰赤 口乾 痰嗽 胸滿 或月水不調 臍腹痛 疥癬成塊	人蔘荊芥散

4. 荊芥의 使用量에 대한 調査

荊芥의 각 處方別 一回 使用量을 調査하여 整理하였다(Table 4). 丸劑, 散劑, 丹劑 等은 20貼

分量으로 나누어 계산하였다. 또한 等分과 用量이 未詳인 경우는 百分率 계산에서 제외하였다. 外用劑는 備考에 外라고 표시하였다.

Table 4. 荊芥의 一回 使用量

用 量	病 症	處 方	用 量	備 考	百分率	
一分三厘~五分	瞽膜	蟬花散(2)	0.13錢		40.4	
	通治眼病	石膏羌活散				
	外障	蟬花散(3)	0.14錢			
	獸骨硬	玉屑無憂散	0.20錢			
	肩臂病	五靈脂散	0.22錢			
	頭風	菊花茶調散	0.27錢			
	疥癬	何首烏散	0.29錢			
	咽喉瘡	利膈湯				
	孕婦痘瘡	罩胎散	0.30錢			
	發熱三朝	加味敗毒散				
	內障	通肝散	0.33錢			
	通治火熱病	防風通聖散	0.35錢			
	癩風癰瘍風白駮	加減何首烏散	0.38錢			
	天疱瘡	三黃敗毒散	0.40錢			
	腸風臟毒	腸風黑散	0.47錢			
	發熱三朝	紅綿散	0.50錢			外
	驚搖	加減紅綿散				
	外障	洗肝明目湯				
	鼻淵	荊芥連翹湯				
	外障	清肺散				
		速效散				
	視一物爲兩	保肝散				
	手足癱瘓	疎風順氣湯				
頭風	加減芎辛湯					
腸風臟毒	槐花散					
正頭痛	四神散					
齒病	荊芥湯					
五分三厘~一錢	外障	驅風一字散		0.53錢		
	口眼喎斜	理氣祛風散	0.60錢			
	失血眩暈	加味四物湯	0.70錢			

	耳痛成膿耳	荊芥連翹湯(2)			
	癰疽五發	連翹敗毒散			
	大頭癰	芩連消毒飲			
	有名無名諸惡瘡	連翹飲			
	蟲蝕痛	當歸連翹飲			
	面上雜病	連翹散			
	婦人雜病	人參荊芥散	0.75錢		
	心癰	涼血飲	0.80錢		
	血暈	清魂散	0.90錢		
	卒然無音	人參荊芥散			
		荊蘇湯			
	疔瘡	散邪湯			
	頭風	消風散			
	齒病	蜂窩散			
	蟲蝕痛	瀉胃湯			
	齒病惡寒惡熱	白芷湯			
	中焦熱	洗心散			
	傷寒表證	消風百解散			
	喘嗽	旋覆花湯			
	口眼喎斜	清痰順氣湯			
	鼻瘡	黃芩湯			
	腸風臟毒	栝葉湯			
	搭頸腫	加味消毒飲			
	瘟疫	柴胡升麻湯			
	有名無名諸惡瘡	涼血飲(2)			
一錢二分~一錢五分	疥癬	當歸飲子	1.20錢		
	外障	清涼散			
	產後風痊	歸荊湯	1.50錢		4.5
一錢七分~二錢	歷節風	當歸散(2)	1.70錢		
	風嗽	金佛草散			
	熱暈	荊黃湯			
	外障	消毒飲			
	血暈	荊芥散			
	癰疽	解毒湯			外
三錢	產後風痊	愈風散			
	洗瘡	洗毒散	3.00錢		外
四錢	咽喉痛	荊黃湯(2)	4.00錢		1.5
等分	腎膜	撥雲退瞽丸			
	喉痺失音	神效散			
	咽喉痛	金消丸			
	齒病塗擦	鹹鬼散			
	齒衄	荊槐散			外

用量未詳	疥癬	洗藥	外
	産後泄痢	的奇散	
	正頭痛	一字輕金散	
	便血	結陰丹	
	大風瘡	磨風丸	
	瘰癧	宣熱丹	
	外障	通血丸	
	大風瘡	加味苦參丸	
	癩風癰瘍風白駮	追風丸	
	齒病塗擦	擦牙方	
	點眼藥	點爛弦風藥	
	諸疔	洗疔瘡藥	
	眉稜骨痛	上清散	
	洗瘡	洗下疳瘡方	

5. 荊芥가 主藥으로 配伍된 方劑의 構成內容 調査 하고, 이에 대한 處方構成 內容을 調査하여 分析 하였다(Table 5)³⁷⁾.
 荊芥가 主藥으로 配伍된 方劑를 疾患別로 區分

Table 5-1. 眼·鼻·耳·咽喉·咳嗽·寒·風·聲音에 荊芥가 主藥으로 配伍된 方劑의 構成內容

病症	處方	構成內容	基本處方
外障	驅風一字散	川芎 荊芥 川烏炮 各五錢 羌活 防風 各二錢半	防風湯
	蟬花散(3)	草龍膽 甘菊 密蒙花 蔓荊子 荊芥穗 川芎 蟬殼 青箱子 草決明 梔子 防風 木賊 白蒺藜 甘草 各等分	蒼朮散 蟬花散(2) 密蒙花散 清涼散
	洗肝明目湯	當歸尾 川芎 赤芍藥 生地黃 黃連 黃芩 梔子 石膏 連翹 防風 荊芥 薄荷 羌活 蔓荊子 甘菊 白蒺藜 草決明 桔梗 甘草 各五分	決明散 散熱飲子 回春涼膈散 生料四物湯 蒼朮散
	清涼散	蔓荊子 荊芥穗 苦竹葉 甘草 各一錢半 梔子 七分半	
	清肺散	桑白皮 片苓 甘菊 枳殼 防風 荊芥 柴胡 升麻 赤芍藥 當歸尾 玄參 苦參 白蒺藜 木賊 旋覆花 葶藶子 甘草各五分	參歸丸 蒼朮散
	通血丸	川芎 當歸尾 防風 荊芥 各一兩 生乾地黃 赤芍藥 甘草 各五錢	四物湯
	消毒飲	大黃煨 荊芥穗 各二錢 惡實 甘草 各一錢	五聖湯
	速效散	黃連 黃芩 黃栢 梔子 連翹 薄荷 荊芥 柴胡 當歸 生地黃 地骨皮 天花粉 蔓荊子 甘菊 惡實 白蒺藜 草決明 石決明 枳殼 甘草 各五分	黃連解毒湯 回春涼膈散 清涼散
瞽膜	撥雲退瞽丸	甘菊 川椒 木賊 白蒺藜 密蒙花 蛇退 蟬退 川芎 蔓荊子 荊芥穗 石 燕子煨 黃連 薄荷 瓜蒌根 枳實 羌活 當歸 地	局方密蒙花散 磨光散

		骨皮 甘草各等分	蒼朮散
	蟬花散(2)	蟬殼 甘菊 川芎 防風 羌活 梔子 白朮炒 草決明炒 荊芥 穗 蔓荊子 穀精草 密蒙花 木賊去節 童便浸晒 蒼朮 甘草 灸 各等分	蒼朮散 菊花散 清涼散
內障	通肝散	山梔子 白朮炒 枳殼 荊芥 甘草 各五錢 車前子 鼠粘子炒 各二錢半	
視一物爲兩	保肝散	川芎 當歸 地骨皮 蒼朮 白朮 密蒙花 羌活 天麻 薄荷 柴胡 藁本 石膏 木賊 連翹 細辛 桔梗 防風 荊芥 甘草各五分 梔子 白芷各三分	洗肝散 蒼朮散
通治眼病	石膏羌活散	石膏 羌活 黃芩 藁本 密蒙花 木賊 白芷 蘿菴子 細辛 麻仁 川芎 蒼朮 甘菊 荊芥 甘草 各等分	菊花散 蒼朮散
點眼藥	點爛弦風藥	薄荷 荊芥 細辛爲末	
鼻淵	荊芥連翹湯	荊芥 柴胡 川芎 當歸 生地黃 赤芍藥 白芷 防風 薄荷 梔子 黃芩 桔梗 連翹 各五分 甘草 三分	回春涼膈散 生料四物湯 芎芷膏
	黃芩湯	片芩 酒炒 梔子 連皮酒炒 桔梗 赤芍藥 桑白皮 麥門冬 荊芥穗 薄荷 連翹各一錢 甘草三分	涼膈散
耳痛成膿耳	荊芥連翹湯(2)	荊芥 連翹 防風 當歸 川芎 白芍藥 柴胡 枳殼 黃芩 梔子 白芷 桔梗 各七分 甘草 五分	回春涼膈散 芎芷膏
咽喉痛	金消丸	黃栢 荊芥 射干 黃芩 各等分	
	荊黃湯(2)	荊芥四錢 大黃一錢	
喉痺失音	神效散	荊芥穗 葶麻肉 等分	
咽喉瘡	利膈湯	薄荷 荊芥 防風 桔梗 人參 鼠粘子炒 甘草各一兩	必用方甘桔湯
獸骨聾	玉屑無憂散	寒水石 煨鵬砂 各三錢 玄參 貫衆 滑石 縮砂 山豆根 黃連 甘草 赤茯苓 荊芥穗 各五錢	
風嗽	金佛草散	荊芥穗二錢 旋覆花 前胡 各一錢半 麻黃 赤茯苓 各一錢 半夏七分半 細辛 甘草 各三分	
傷寒表證	消風百解散	荊芥 蒼朮 白芷 陳皮 麻黃 各一錢 甘草 五分	
歷節風	當歸散(2)	防風 當歸 藁本 獨活 荊芥穗 頗荊葉 各一兩	
口眼喎斜	理氣祛風散	羌活 獨活 青皮 陳皮 枳殼 桔梗 南星 半夏 烏藥 天麻 川芎 白芷 防風 荊芥 白芍藥 甘草各六分	烏藥順氣散 防風湯 導痰湯 芍藥甘草湯
	清痰順氣湯	南星 瓜蒌仁 荊芥穗 貝母 陳皮 蒼朮 官桂 防風 各一錢 黃連 黃芩 並酒炒 甘草 各六分	星香散 省風湯
手足癱瘓	疎風順氣湯	人參 防風 麻黃 羌活 升麻 桔梗 石膏 黃芩 荊芥穗 天麻 南星 薄荷 葛根 芍藥 杏仁 當歸 川芎 白朮 細辛 皂角 各五分	升麻葛根湯 九味羌活湯 芎歸湯 通關散 還魂湯
卒然無音	荊蘇湯	荊芥穗 紫蘇葉 木通 橘紅 當歸 辣桂 石菖蒲 各一錢	
	人參荊芥散(2)	人參 荊芥穗 陳皮 桔梗 半夏 細辛 杏仁 通草 麻黃 甘草 各一錢	三拗湯 甘桔湯

Table 5-2. 婦人·小兒·血에 荊芥가 主藥으로 配伍된 方劑의 構成內容

病 症	處 方	構 成 內 容	基 本 處 方
産後風痙	歸荊湯	荊芥穗微炒 當歸身尾各等分	
	愈風散	荊芥穗略炒	
産後泄痢	的奇散	大荊芥穗 麝香少許	
婦人雜病	人參荊芥散	人參 荊芥 生乾地黃 柴胡 鱉甲 酸棗 仁炒 枳殼 羚羊角 白朮各七分半 桂心川芎 當歸 防風 牡丹皮 赤芍藥 甘草 各五分	十全大補湯 逍遙散類 酸棗仁湯
血暈	清魂散	荊芥穗 五錢 川芎 二錢半 人參 澤蘭葉 各一錢二分半 甘草 一錢	
	荊芥散	荊芥穗 搗爲末 每二錢 童便一盞調	
喘嗽	旋覆花湯	旋覆花 赤芍藥 荊芥穗 半夏麴 五味子麻黃 赤茯苓 杏仁 前胡 甘草 各一錢.	三拗湯 小半夏茯苓湯
孕婦痘瘡	罩胎散	赤茯苓 白朮 當歸 赤芍藥 柴胡 乾葛 人參 桔梗 條芩 防風 陳皮 荊芥 枳殼 紫草 阿膠 白芷 川芎 縮砂 甘草 各三分	生料四物湯 異功散
發熱三朝	加味敗毒散	柴胡 前胡 羌活 獨活 防風 荊芥 薄荷 枳殼 桔梗 川芎 天麻 地骨皮 各三分	人參敗毒散
	紅綿散	全蝎 麻黃 荊芥穗 天麻 甘草 各五分	
驚搐	加減紅綿散	麻黃 荊芥穗 全蝎 天麻 薄荷 紫草茸 蟬殼 各五分	紅綿散
諸疔	洗疔瘡藥	甘草 黃柏 馬鞭草 連根 葱 荊芥穗	
失血眩暈	加味四物湯	當歸 川芎 白芍藥 生地黃 熟地黃 黃芪 人參 白朮 陳皮 白茯苓 荊芥穗 甘草 各七分	十全大補湯
便血	結陰丹	枳殼 威靈仙 黃芪 陳皮 椿根白皮 何首烏 荊芥穗 各五錢	
齒衄	荊槐散	荊芥穗 槐花炒 各等分	

Table 5-3. 諸瘡·癰疽·溫疫·後陰·疥癩·皮에 荊芥가 主藥으로 配伍된 方劑의 構成內容

病 症	處 方	構 成 內 容	基 本 處 方
疥癬	當歸飲子	當歸 赤芍藥 川芎 生地黃 防風 荊芥 白茯苓 各一錢二分 何首烏 黃芪 甘草 各七分	生料四物湯
	洗藥	細辛 荊芥 白芷 川芎 黃芩 防風 地骨皮 甘草 各 等分	
	何首烏散	荊芥穗 威靈仙 蔓荊子 豨薟 何首烏 防風 甘草 各等分	
大風瘡	加味苦參丸	苦參 四兩 防風 荊芥 蒼耳子 胡麻子 皂角刺 各二兩半 蔓荊子 牛蒡子 枸杞子 何首烏 禹餘糧 蛇床子 右七錢半 白芷 四錢	追風丸
	磨風丸	當歸 羌活 獨活 川芎 天麻 細辛 防風 荊芥 威靈仙 麻黃 何首烏 蔓荊子 牛蒡子 車前子 皴面草(即蒼蘘也) 蒼耳草 各一兩	何首烏散 芎歸湯 防風湯
有名無名諸惡瘡	涼血飲(2)	赤芍藥 黃芩 川芎 荊芥 生苳 麥門冬 天花粉 甘草 各一錢	生料四物湯
	連翹飲	連翹 赤芍藥 當歸 荊芥 防風 惡實 川芎 梔子 黃芩 瞿麥 木通 生乾地黃 瓜蒌根 麥門冬 甘草	生料四物湯 導赤散

		各七分	通心飲
洗瘡藥	洗毒散	蛇床子 地骨皮 大薊 麻黃 荊芥 防風 枯白礬 各三錢 葱白三莖	
	洗下疳瘡方	黃栢 黃連 當歸 白芷 獨活 防風 朴硝 荊芥 各三錢 入銅錢 五十文 烏梅五箇 鹽一匙	
天疱瘡	三黃敗毒散	防風 荊芥 連翹 白芷 當歸 赤芍藥 黃芩 黃連 梔子 地骨皮 五加皮 白鮮皮 木瓜 苦參 蟬退 金銀花 薏苡仁 白殭蠶 皂角刺 黃栢 白蒺藜 川芎 (上部倍用)木通(下部倍用) 甘草 各一兩 土茯苓 一斤半	三黃瀉心湯 四物湯 通心飲 蒼朮散 白芷湯
癩癧	宣熱丹	薄荷 皂角 連翹 何首烏 蔓荊子 三稜 荊芥 各一兩	追風丸
心癰	涼血飲	木通 瞿麥 荊芥 薄荷 白芷 天花粉 赤芍藥 麥門冬 生乾地黃 梔子 車前子 連翹 甘草 各八分	通心飲
癰疽五發	連翹敗毒散	羌活 獨活 柴胡 前胡 桔梗 川芎 赤茯苓 金銀花 枳殼 連翹 防風 荊芥 薄荷 甘草各七分	荊防敗毒散 金銀花散
癰疽	解毒湯	黃栢 澤蘭 甘草 荊芥 赤芍藥 大黃 白芷 當歸 獨活各二錢	四順清涼飲
大頭瘟	芩連消毒飲	黃連 黃芩 柴胡 桔梗 川芎 荊芥 防風 羌活 枳殼 連翹 射干 白芷 甘草 各七分	加味消毒飲 必用方甘桔湯
瘟疫	柴胡升麻湯	柴胡 前胡 葛根 赤芍藥 荊芥 石膏各一錢 桑白皮 黃芩各七分 升麻五分	升麻葛根湯
腸風臟毒	槐花散	槐花炒 栢葉焙 荊芥 枳殼 各等分	荊槐散
	栢葉湯	側柏葉 當歸 生乾地黃 黃連 荊芥穗 枳殼 槐花炒 地榆 各一錢 甘草灸五分	荊槐散
	腸風黑散	荊芥穗二兩 猬皮一兩半 亂髮 槐花 槐角各一兩 同入罐內 鹽泥固濟 燒存性 出火毒 再入甘草炒 枳殼炒 各一兩	槐花散
瘰癧	散邪湯	川芎 白芷 麻黃 白芍藥 防風 荊芥 紫蘇葉 羌活 各一錢 甘草 五分	芎芷膏 防風湯
癩風癧瘍 風白駮	加減何首烏散	何首烏 蔓荊子 石菖蒲 荊芥穗 苦參 威靈仙 甘菊 枸杞子 各等分	何首烏散
	追風丸	何首烏 荊芥穗 苦參 蒼朮 各四兩	

Table 5-4. 頭·牙齒·面·火·手·其他門에 荊芥가 主藥으로 配伍된 方劑의 構成內容

病症	處方	構成內容	基本處方
頭風	加減芎辛湯	川芎 細辛 白芷 石膏 藁本 皂角 羌活 防風 荊芥 桔梗 蔓荊子 甘菊 薄荷 甘草 各五分	川芎茶調散
	菊花茶調散	甘菊 川芎 荊芥 羌活 白芷 甘草 各一兩 防風 七錢半 細辛 五錢 蟬殼 白殭蠶 薄荷 各二錢半	川芎茶調散
	消風散	荊芥 甘草 各一錢 人參 茯苓 白殭蠶 川芎 防風 藿香 蟬殼 羌活 各五分 陳皮 厚朴 各三分	防風湯 異功散
正頭痛	四神散	甘菊 當歸 旋覆花 荊芥穗 各等分	
	一字輕金散	川芎 白芷 藿香 荊芥 旋覆花 石膏 防風 各五錢 南星 川	天香散

		烏生 各二錢半 草烏 一錢半	芎芷膏
眉稜 骨痛	上清散	川芎 鬱金 芍藥 荊芥 薄荷 芒硝 各二錢半 乳香 沒藥 各五分 龍腦 二分半	乳香散
熱暈	荊黃湯	大黃酒炒 荊芥穗 防風 各二錢	
齒病	馱鬼散	黃連 胡桐淚 荊芥穗 薄荷 升麻 羊脛 骨灰 等分 麝香少許	荊芥湯
	擦牙方	葦撥 細辛 川椒 荊芥 薄荷 樟腦 青鹽 爲末擦之	荊芥湯
	蜂窩散	露蜂房 白痰藜 川椒 艾葉 葱根 荊芥 細辛 白芷各一錢	
	荊芥湯	荊芥 薄荷 升麻 細辛 各三錢	
蟲蝕痛	當歸連翹飲	當歸 生地黃 川芎 連翹 防風 荊芥 白芷 羌活 黃芩 梔子 枳殼 甘草 各七分 細辛 三分	生料四物湯
	瀉胃湯	當歸 川芎 赤芍藥 生地黃 黃連 牡丹皮 梔子 防風 荊芥 薄荷 甘草 各一錢	生料四物湯
齒病惡 寒惡熱	白芷湯	防風 荊芥 連翹 白芷 薄荷 赤芍藥 石膏各一錢	
面上雜病	連翹散	連翹 川芎 白芷 片芩 黃連 沙參 荊芥 桑白皮 梔子 貝母 甘草 各七分	黃連解毒湯 芷貝散
搭腮腫	加味消毒飲	荊芥 防風 惡實 甘草 連翹 羌活 各一錢	防風湯
中焦熱	洗心散	麻黃 當歸 大黃 荊芥穗 赤芍藥 甘草 各一錢 白朮五分	四順清涼飲
通治火 熱病	防風通聖散	滑石一錢七分 甘草一錢二分 石膏 黃芩 桔梗 各七分 防風 川芎 當歸 赤芍藥 大黃 麻黃 薄荷 連翹 芒硝 各四分半 荊芥 白朮 梔子 各三分半	回春涼膈散 四物湯 六一散 白虎湯 調胃承氣湯
肩臂病	五靈脂散	五靈脂 荊芥穗 防風 羌活 獨活 穿山甲 骨碎補 草烏製 甘草節 各五錢 麝香 半錢	烏龍丹 防風湯

III. 考 察

東醫寶鑑 中 荊芥가 主藥으로 配伍된 方劑의 治療領域에 대한 調査 結果, Table 1에서 보는 바와 같이 眼, 諸瘡, 頭, 牙齒, 婦人, 小兒, 咽喉, 風, 血, 癰疽, 後陰, 皮, 面, 溫疫, 鼻, 聲音, 火, 寒, 耳, 手, 咳嗽, 疥瘡 等 22개의 領域에서 活用하고 있음을 알 수 있었다.

이 중 眼門에 사용한 處方 빈도수가 16.3%로 가장 많았고, 諸瘡門이 12.8%, 頭門, 牙齒門, 婦人門이 8.1%로 조사되어, 荊芥는 주로 眼疾患, 外感 風寒·風熱, 皮膚, 出血 等の 疾患에 많이 活用되고 있음을 알 수 있었다. 또한 荊芥가 眼門 및 諸瘡門에 가장 많이 活用되고 있는 것으로 보아, 적어도 17세기까지는 荊芥가 眼科나 皮膚科, 外科

疾患에 活用도가 높았음을 알 수 있었다. 그 밖의 治療領域의 處方 인용 빈도수는 Table 1과 같았다.

荊芥가 主藥으로 活用된 病症을 조사해보면 Table 2에서 보는 바와 같았다.

眼에 있어서는 外障, 瞖膜, 內障, 視一物爲兩, 通治眼病藥, 點眼藥 等に 荊芥를 主藥으로 사용하였고, 鼻에는 鼻淵에, 耳에는 耳痛成膿耳에, 咽喉에는 咽喉痛, 喉痺失音, 咽喉瘡, 獸骨哽 等に, 咳嗽에는 風嗽에, 寒에는 傷寒表證에, 風에는 歷節風治法, 口眼喎斜, 手足癱瘓에, 聲音에는 卒然無音에 荊芥가 主藥으로 사용되었다(Table 2-1).

婦人에는 產後風痙, 產後泄痢, 婦人雜病, 血暈, 喘嗽에, 小兒에는 發熱三朝, 驚搐, 諸疳, 附孕婦痘瘡에, 血에는 失血眩暈, 便血, 齒衄에 荊芥가 主藥

으로 사용되었다(Table 2-2).

諸瘡에는 疥癬, 大風瘡, 有名無名, 諸惡瘡, 洗瘡藥, 天疱瘡, 癩癰에, 癰疽에는 心癰, 癰疽五發證, 癰疽湯洗法에, 溫疫에는 大頭瘟治法, 瘟疫治法에, 後陰에는 腸風臟毒에, 疥瘡에는 疥瘡에, 皮에는 癩風癩癢, 風白騷에 荊芥가 主藥으로 사용되었다(Table 2-3).

頭에는 頭風, 正頭痛, 眉稜骨痛, 熱暈에, 牙齒에는 齒病塗擦方, 蟲蝕痛, 齒病惡寒惡熱에, 面에는 面上雜病, 搭腫腫에, 火에는 中焦熱, 通治火熱藥法에, 手에는 肩臂病因에 荊芥가 主藥으로 사용되었다(Table 2-4).

荊芥가 使用된 病症을 살펴보면, 眼科 疾患 중 外障에 사용된 處方이 가장 많은 것으로 보아 感染性 眼科疾患에 적용도가 높음을 알 수 있었고, 耳鼻咽喉科 疾患에서는 咽喉疾患 즉, 咽喉痛, 失音, 咽喉瘡 등의 病症에 많이 活用되었음을 알 수 있었다.

外感を 통한 傷寒, 咳嗽 등에 荊芥가 主藥으로 사용된 경우가 전체 비중으로 볼 때 많은 頻度を 차지하지 않고 있다는 점이 特異할만하며, 中風疾患이나 小兒驚搐, 婦人, 風齒, 中樞神經病이나 腦血管疾患, 熱性痙攣病 등에 比較的 많이 사용되고 있음을 보여주고 있다.

皮膚科 疾患에서는 疥癬, 大風瘡, 惡瘡, 天疱瘡, 癰疽, 大頭瘟 等 發熱性, 搔痒性, 化膿性 炎症, 二次感染에 해당되는 病症 등에 活用되는 것으로 보아 現代醫學의 難治病인 아토피성 皮膚疾患, 알러지성 皮膚疾患에도 많이 活用할 수 있음을 보여 주고 있다. 한편, 頭痛이나 齒痛에도 活用도가 많은 것으로 보아 一定한 鎮痛, 鎮靜作用을 할 수 있음을 보여주고 있다(Table 2-1~4).

荊芥가 主藥으로 配伍된 方劑의 病因·病理는 Table 3에서 보는 바와 같았다. 즉 臟腑病理에서는 肝經蘊熱, 肝藏風熱, 肝壅瘀血, 胃熱, 胃中濕熱, 腸胃有濕 等으로 肝胃病理가 많았고, 六氣病理에서는 風中血脈, 產後中風, 風博皮膚, 風熱燥, 風寒,

風寒濕等 風으로 인한 病理가 많았다.

荊芥는 風, 風熱, 風熱燥 等の 六氣에 關聯된 病理에 主로 使用되고 있어, 外感 邪氣를 發散시키고 解熱作用이 있음을 시사하고 있다. 臟腑病理로 보면 五官에 關聯이 있는 病理에 主로 使用되고 있다. 즉 眼疾患의 경우 肝·膽에 관한 病理가, 鼻疾患의 경우 肺에 관한 病理가, 耳疾患의 경우 腎에 관한 病理가, 齒疾患의 경우와 胃에 관한 病理가 많았음을 알 수 있었다. 氣血病理에서는 血熱, 血虛, 氣虛에 관한 病理가 많았음을 알 수 있었다.

荊芥가 主藥으로 사용된 處方의 一貼當 荊芥 使用量을 조사한 결과는 Table 4와 같았다. 86種의 方劑에서 荊芥의 使用量은 一分三厘~五分, 五分三厘~一錢, 一錢二分~一錢五分, 一錢七分~二錢, 三錢, 四錢, 等分 및 用量未詳인 경우로 조사되었다. 東醫寶鑑 原文에서는 使用量이 三分에서 四兩까지로 기재되어 있었지만, 一回 貼當 使用量으로 계산해 보았을 때는 Table 4와 같이 一分三厘에서 四錢까지로 나타났음을 알 수 있었다. 그 중에서도 使用量이 五分三厘~一錢인 경우가 전체의 51.8%로 가장 많았으며, 그 다음으로 多用된 용량은 一分三厘~五分으로서 40.4%로 조사되었다. 즉 五分에서 一錢까지를 가장 많이 사용하고 있음을 알 수 있으며, 이를 一般的인 使用量으로 볼 수 있겠다. 外用劑로 사용하거나 咽喉痛에 使用할때는 二錢에서 四錢까지 使用하는 경우도 있었다. 그 밖에도 使用量이 명확하지 않은 경우와 各等分으로 活用된 경우도 있었는데, 여타 處方들의 使用量 범위 이내에서 適當량을 사용하면 큰 무리가 없을 것으로 생각된다.

荊芥가 主藥으로 配伍된 方劑의 構成內容을 조사해보면 Table 5에서 보는 바와 같다. 먼저 Table 5-1에서 보는 바와 같이 眼에는 防風을 配合하여 祛風解表하는 效能을 높였으며, 蒼朮散類, 清涼散類 等の 基本方을 많이 사용하였고, 防風湯, 菊花散類, 四物湯, 回春涼膈散, 密蒙花散 等を 配

습하여 활용하였다. 耳와 鼻에는 涼膈散類, 芎芷膏 등을 基本方으로 많이 활용하였다. 咳嗽, 風, 寒에는 羌活, 獨活, 防風, 麻黃 등의 發散藥을 配合하여 發汗解表와 祛風의 作用을 강화시켰다(Table 5-1).

婦人에는 生料四物湯類와 十全大補湯類, 三拗湯 등의 基本方을 配合하여 활용하였으며, 小兒에는 荊芥敗毒散類와 紅綿散을 基本方으로 配合하여 활용하였다. 血에는 樗根白皮, 槐花炒 등을 配合하여 止血, 散瘀血作用을 강화하여 活用하였다(Table 5-2).

諸瘡에는 四物湯類, 追風丸類, 通心飲, 三黃瀉心湯類 등의 基本方을 많이 사용하였고, 何首烏散, 導赤散, 白芷湯 등을 配合하여 活用하였다. 癰疽에는 通心飲, 荊防敗毒散類, 金銀花散, 四順清涼飲을 配合하여 活用하였고, 溫疫에는 加味消毒飲類, 必用方甘桔湯類, 升麻葛根湯類를 配合하여 活用하였다. 腸風臟毒에는 槐花, 槐角, 側柏葉, 亂髮, 地榆 등을 配合하여 荊芥의 止血作用을 강화하였다(Table 5-3).

頭에는 川芎茶調散, 防風湯, 芎芷膏 등의 基本方을 많이 使用하였고, 異功散類, 天香散類, 乳香散 등을 配合하여 活用하였다. 牙齒에는 荊芥湯類, 生料四物湯類 등을 基本方으로 配合하여, 齒病塗擦方, 蟲蝕通 등에 활용하였고, 面에는 黃連解毒湯類, 芷貝散, 防風湯 등을 基本方으로 활용하였다(Table 5-4).

Table 5의 조사내용을 요약해보면, 眼科疾患에서는 基本方으로 蒼朮散이 가장 많이 사용되었고, 鼻病에서는 涼膈散이 가장 많이 사용되었고, 皮膚科疾患에서는 生料四物湯이 가장 많이 사용되었고, 頭部疾患에서는 川芎茶調散, 齒科疾患에서는 荊芥湯을 基本方으로 많이 사용되고 있었음을 알 수 있다.

위에서 보는 바와 같이 荊芥는 配伍되는 處方이나 藥物에 따라 祛風解表·破結聚之氣·宣毒透疹·利咽喉·止痒·止血·散瘀血 등의 다양한 效

能을 發揮하고 있음을 알 수 있다. 이를 통하여 荊芥가 配合된 方劑를 분석하고 構成藥物의 作用을 이해할 뿐 아니라, 方劑構成에 대한 이론적 근거를 제시하는데 많은 기여를 할 수 있을 것으로 생각된다.

IV. 結 論

東醫寶鑑에 荊芥가 主藥으로 配伍된 86處方에 대하여 資料調査를 한 바 다음과 같이 要約할 수 있었다.

1. 荊芥가 主藥으로 構成된 方劑의 治療領域에 따른 처방빈도는 眼門이 16.3%, 諸瘡門이 12.8%, 頭門, 牙齒門, 婦人門이 8.1%로 조사되었다.
2. 荊芥는 外障, 疥癬, 腸風臟毒, 頭風 등의 病症에 가장 많이 활용되고 있었으며, 그밖에도 醫膜, 鼻淵, 咽喉痛, 口眼喎斜, 產後風痙, 蟲蝕痛 등의 52개 病症에 다양하게 사용되었다.
3. 荊芥가 主藥으로 사용된 處方의 病因病理는 臟腑病理에서는 肝經蘊熱, 肝藏風熱, 肝壅瘀血, 胃熱, 胃中濕熱, 腸胃有濕 등으로 肝胃病理가 많았고, 六氣病理에서는 風中血脈, 產後中風, 風博皮膚, 風熱燥, 風寒, 風寒濕 등 風으로 인한 病理가 많았다.
4. 荊芥가 主藥으로 사용된 處方의 1회 荊芥 使用量은 一分三厘~四錢까지이며, 五分三厘~一錢을 가장 많이 사용하였다.
5. 荊芥는 配伍되는 藥物과 처방에 따라 祛風解表, 宣毒透疹, 止血 등의 다양한 作用을 하는 것을 알 수 있었으며, 荊芥가 主藥으로 사용된 處方의 基本方으로는 防風湯, 生料四物湯을 가장 많이 사용하였음을 알 수 있었다.

參考文獻

1. 辛民教. 臨床本草學. 서울:永林社. 1997:338, 339.
2. 申佶求. 申氏本草學 各論. 서울:壽文社. 1988: 218-20.
3. 李京淳. 完譯 中藥大辭典. 서울:鼎談. 1997:4812-6.
4. 安德均. 韓國本草圖鑑. 서울:教學社. 2003:34.
5. 李永魯. 韓國植物圖鑑. 서울:教學社. 1997:678.
6. 辛民教. 鄭善燮 共編. 圖解 鄉藥(生藥)大辭典. 서울:永林社. 1990:863.
7. 全國韓醫科大學 本草學教授 共編著. 本草學. 서울:永林社. 2004:159, 160.
8. 王本樣 外 編著. 現代中藥藥理學. 天津:天津科學技術出版社. 1999:53-6.
9. 蕭培根. 中國本草圖錄 卷六. 北京:人民衛生出版社. 1989:96.
10. 李飛 主編. 方劑學(上册). 北京:人民衛生出版社. 2002:68.
11. 許濟群 王綿之 主編. 方劑學. 北京:人民衛生出版社. 1995:14.
12. 康秉秀. 韓藥臨床配合應用. 서울:永林社. 2004: 475-7.
13. 김형균, 김형민, 송봉근, 이연정, 정헌택 共編. 韓藥의 藥理. 서울:高麗醫學. 2000:173.
14. 박찬웅. 韓藥藥理學. 서울:神光出版社. 2004:159.
15. 임종필. 本草生藥學. 서울:신일상사. 2003:66-7.
16. 藥草의 成分과 利用. 문관심. 서울:日月書閣. 1991:520, 521.
17. 韓方藥理學 教材編纂委員會. 韓方藥理學. 서울:신일상사. 2005:234-7.
18. 王昂. 本草備要解析. 서울:醫聖堂. 1993:106, 107.
19. 寇宗奭. 本草衍義. 서울:醫聖堂. 1994:144.
20. 王好古. 湯液本草. 서울:大星文化社. 1996:319.
21. 李時珍. 本草綱目. 山西:山西科學技術出版社. 1999: 727, 728.
22. 王昂. 本草求真. 서울:高麗電算. 1999:241, 242.
23. 東醫學研究所. 東醫學叢書. 1권. 서울:麗江出版社. 1994:112, 113.
24. 柳道坤東. 醫生理學講義. 益山:圓光大學校出版局. 1999:180, 234.
25. 許 浚. 東醫寶鑑. 서울:南山堂. 2003:69, 70, 72, 82, 226, 227, 228, 230, 235, 242, 243, 260, 261, 262, 264, 265, 270, 273, 275, 286, 291, 293, 307, 309, 313, 314, 322, 323, 324, 327, 382, 400, 444, 445, 520, 522, 524, 536, 561, 620, 631, 708, 804, 815, 818, 840, 850, 871, 872, 876, 880, 891, 892, 894, 903, 983, 984, 989, 992, 997, 1037, 1055, 1067, 1078.
26. 危亦林. 世醫得效方. 上海:上海科學技術出版社. 1997:138, 345, 483, 521, 603, 740, 750, 837, 824, 953, 965.
27. 朱震亨. 丹溪心法附餘 上. 서울:大星文化社. 1993: 60, 98, 104, 197, 207, 373, 382, 385, 450, 455, 461, 463, 579, 602, 603.
28. 張從政. 儒門事親. 서울:東國大學校出版部. 2001: 595.
29. 陳無擇. 三因方. 서울:翰成社. 1977:466, 603.
30. 楊禮壽. 醫林撮要(國譯韓國醫學大系 七卷). 서울:海東醫學社. 1999:170.
31. 虞 搏. 醫學正傳. 서울:成輔社. 1986:46, 429.
32. 李 梈. 醫學入門. 서울:醫聖堂. 1994:656, 1077, 1158, 1213, 1237, 1251, 1265, 1268, 1306, 1309.
33. 龔廷賢. 萬病回春. 서울:醫聖堂. 1993:50, 215, 271, 274, 276, 282, 289, 333.
34. 龔廷賢. 龔廷賢醫學全書(古今醫鑑). 北京:中國中醫藥出版社. 1999:1169, 1208, 1272, 1279, 1282, 1283, 1356, 1357, 1371, 1379.
35. 中華醫書集成 第二十四冊(醫學綱目). 中醫古籍出版社. 1999:511.
36. 陳自明. 婦人良方大全. 北京:人民衛生出版社. 1985:118, 508.
37. 尹用甲. 新東醫方劑2233(도해임상활용). 서울:도서출판 정담. 2006:4, 43, 46, 51, 67, 75, 114, 186, 275, 302, 312, 345, 358, 359, 371, 439, 449,

553, 554, 661, 679, 680, 700, 720, 875, 880, 896,
993, 1032, 1033, 1043, 1044, 1051, 1052, 1066,
1067, 1070, 1071, 1073, 1085, 1122, 1124, 1127,
1128, 1147, 1148, 1204, 1249, 1310, 1335, 1339,
1340, 1341, 1381, 1382, 1537, 1585, 1588, 1589,

1691, 1692, 1693, 1717, 1776, 1783, 1802, 1872,
1873, 1974, 2043, 2046, 2095, 2104, 2139, 2215,
2242, 2294, 2305, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363,
2366, 2367, 2368, 2376, 2425.