

『東醫寶鑑』 중 葛根이 主藥으로 配伍된 方劑의 活用に 대한 考察

전경혜, 국윤범
상지대학교 한의과대학 방제학교실

ABSTRACT

Literature on Applications of Prescriptions Including *Pueraria Thunbergiana Bentham* in *Dongueibogam*

Kyung-Hye Jeon, Yoon-Bum Kook
Department of Oriental Medicine, Sangji University

This report carried out to study 59 prescriptions related to the use of *Pueraria thunbergiana bentham* in *Dongueibogam*

This study is based on *Dongueibogam* which has been widely used for herbal clinic in Korea. And this study is investigated to make sure of the range of treatment, nature of disease, the pathology and the dosage of *Pueraria thunbergiana bentham* in *Dongueibogam*.

The following conclusions were reached through investigations on the prescriptions that used in *Dongueibogam* as a various role.

1. The prescriptions that *Pueraria thunbergiana bentham* was taken as a 15 for monarchy, 15 for attendant, 11 for assistance and valet herb are utilized for therapeutic treatments such as cough, fever etc, mainly Sanghan syndromes in the chapter of Wind.

2. The *Pueraria thunbergiana bentham* was also utilized as a key ingredients in the chapter of

-
- 교신저자 : 국윤범
 - 강원도 원주시 우산동 660번지 상지대학교 한의과대학 방제학교실
 - Tel : 033-730-0661 E-mail : kook@sangji.ac.kr
 - 접수 : 2009/ 05/ 20 1차 수정 : 2009/ 06/ 09 2차 수정 : 2009/ 06/ 12 채택 : 2009/ 06/ 16

Eye and Onyeok epidemic.

3. The most frequent mass of the *Pueraria thunbergiana bentham* when used as a monarchy herb is 2jeon, and the standard limited range of adding *Pueraria thunbergiana bentham* to medical prescription is 7pun~5jeon per dose. But, when used as a attendant herb, an typical and regular adding dose is the range of 3pun~1yang2.5jeon, and 3pun~1.5jun in the case of assistant.

4. The pathogenic factors and phathology of *Pueraria thunbergiana bentham* in the prescription are based on the chapter of Cold when used as a monarchy herb and on the chapter of Wind in the case of attendant herb.

5. The *Seungmagalgeontang* is the most useful base prescription which use the *Pueraria thunbergiana bentham* as the main ingredient.

Key word : *Pueraria thunbergiana bentham*, *Dongeuybogam*, pathogenic, *Seungmagalgeontang*

1. 緒 論

葛根은 콩과 (豆科 : Leguminosae)에 속하는 多年生 藤本인 葛 *Pueraria thunbergiana Bentham*의 周皮를 제거한 根이다¹⁻⁴⁾.

葛根의 性味는 甘·辛·涼 無毒하고 脾·胃에 歸經하며, 效能은 解肌退熱, 生津, 透疹, 升陽止瀉 등의 作用이 있어 外感發熱頭痛, 項背強痛, 口渴, 消渴, 麻疹不透, 熱痢, 泄瀉, 高血壓頸項強痛 등의 치료에 사용된다⁴⁻¹⁰⁾.

葛根은 精油와 維生素 C 및 naringin 같은 플라보노이드 배당체 등을 함유하고 있으며, 실험적인 보고에 의하면 자궁의 수축력과 筋緊張을 증가시키고 腸管에 대해서는 억제작용을 나타내며 심장과 혈관에 대해서는 혈관 수축작용과 혈압 상승 작용을 나타내며, 두꺼비의 적출 심장에 대해서는 少量 투여시 흥분작용을 大量사용시 억제 작용을 하는 것으로 알려져 있다^{2,7)}.

한편, 葛根은 桔梗과 配伍되면 桔梗葛根湯에서와 같이 胸膈의 鬱滯를 풀어 胸痞를 다스리고 黃連, 木香 等과 配伍되면 六神丸에서와 같이 諸痢를 다스리는데 활용되며, 瓜蒌仁과 배합되면 瓜蒌葛根湯에서와 같이 痰鬱을 다스린다. 또한 葛根은 麻仁, 桃仁 및 四物湯類와 같은 潤劑를 配合하면 潤腸丸에서와 같이 通便하는 목적으로 사용되며, 香蘇散 및 越鞠丸類와 配合하면 六鬱湯에서와 같이 解鬱에 사용되기도 한다³⁾.

葛根은 많은 處方에서 활용되었는데 『傷寒論』¹¹⁻¹⁵⁾의 葛根湯, 葛根黃芩黃連湯 等에서 활용되었으며, 『小兒藥證直訣』^{16,17)}의 全氏七味白朮散과 『閻氏小兒方論』¹⁸⁾의 升麻葛根湯과 같이 小兒, 傷寒과 여러 病증에 사용되고 있음을 알 수 있었다.

葛根은 配伍되는 藥材에 따라 다양한 효능을 발휘하고 있는 바, 著者は 『東醫寶鑑』 中 葛根이 配伍되어 있는 59개 處方에 대한 治療領域, 病症 및 主治, 病因·病理, 使用量, 處方構成 등의 文獻의 자료분석을 통하여 葛根의 使用에 대한 方

劑學的 知見를 얻었기에 報告하는 바이다.

II. 研究方法

1. 調査方法

調査方法은 『東醫寶鑑』중 葛根이 配伍된 處方의 내용을 조사하여 文獻的 資料分析 및 研究內容을 정리하였다. 모든 處方은 葛根을 君, 臣, 佐使로 나누어 연구 조사하였다.

2. 調査 內容

- (1) 『東醫寶鑑』中 葛根이 配伍된 方劑의 治療領域에 대해 調査하였다.
- (2) 『東醫寶鑑』中 葛根이 配伍된 方劑의 病症 및 主治에 대해 調査하였다.
- (3) 『東醫寶鑑』中 葛根이 配伍된 方劑의 病因 및 病理에 대해 調査하였다.
- (4) 『東醫寶鑑』中 葛根이 配伍된 方劑의 使用

量에 대해 調査하였다.

(5) 『東醫寶鑑』中 葛根이 配伍된 方劑의 構成內容에 대해 調査하였다.

III. 本 論

葛根이 配伍된 方劑를 모두 조사하여 葛根의 作用을 君藥, 臣藥, 佐使藥(佐使의 구분이 난해한 것)으로 구분하였다.

1. 葛根이 配伍된 方劑의 治療領域에 대한 調査

1) 葛根이 君藥으로 配伍된 方劑의 治療領域에 대한 調査

『東醫寶鑑』中 葛根이 君藥으로 活用된 方劑 28個의 內容을 調査하여 文獻的 資料分析 및 研究內容을 정리되었으며, 處方名은 同一하나 構成內容이 다른 경우 處方에 I, II를 表記하여 區分하였다.

Table 1. 君藥으로 配伍된 方劑의 治療領域

病 門	處 方	빈도수	백분율(%)	비고
大 便	地榆散(膿血利)	1	3.57	
寒	升麻葛根湯(寒下 傷寒及四時傷寒), 十神湯 I (寒上 傷寒表證), 葛根湯(寒上 傷寒陽毒), 葛根解肌湯 I (陽明形證用藥)	4	14.28	十神湯 I (葛根各1錢), 葛根解肌湯 I (葛根1錢)
面	冲和順氣湯(面見五色) 升麻附子湯(面寒)	2	7.14	
頭	神聖散(腦風證)	1	3.57	
皮	葛根橘皮湯(癩疹)	1	3.57	
火	人蔘清肌散(骨蒸熱)	1	3.57	
風	秦芫升麻湯(口眼喎斜)	1	3.57	
瘟 疫	十神湯 II (瘟疫治法), 柴胡升麻湯 I (瘟疫治法), 清熱解肌湯(瘟疫治法), 葛根解肌湯 II (瘟疫治法)	4	14.28	十神湯 II (葛根2錢), 柴胡升麻湯 I (葛根1錢), 葛根解肌湯 II (葛根3錢)
聲 音	柴胡升麻湯 II (聲嘶)	1	3.57	柴胡升麻湯 II (乾葛 7分半)
內 傷	萬盃不醉丹(醒酒令不醉), 神仙不醉丹(醒酒令不醉), 醉鄉寶屑(醒酒令不醉), 三豆解醒湯(醒酒令不醉)	4	14.28	
霍 亂	止渴湯(霍亂後煩渴)	1	3.57	
嘔 吐	葛根竹茹湯(嘔吐治法)	1	3.57	
咳 嗽	葶藶散(諸傷發喘嗽)	1	3.57	
小 兒	白朮散(慢驚風), 四物解肌湯(發熱三朝), 連翹升麻湯(出痘三朝)	3	10.71	
黃 疸	葛朮湯(酒疸), 茵陳瀉黃湯(疫癘發黃)	2	7.14	
합 계		28	100	

2) 葛根이 臣藥으로 配伍된 方劑의 治療領域에 대한 調査

『東醫寶鑑』 中 葛根이 君藥으로 活用된 方劑 18個의 內容을 調査하여 文獻的 資料分析 및 研究 內容을 정리하였다.

3) 葛根이 佐使藥으로 配伍된 方劑의 治療領域에 대한 調査

『東醫寶鑑』 中 葛根이 佐使藥으로 活用된 方劑 13個의 內容을 調査하여 文獻的 資料分析 및 研究 內容을 정리하였다.

Table 2. 臣藥으로 配伍된 方劑의 治療領域.

病門	處方	빈도수	백분율(%)	비고
胞	全生活血湯(崩漏)	1	5.55	
血	葛黃丸(嘔血吐血)	1	5.55	
內傷	解酒化毒散(醒酒令不醉)	1	5.55	
面	升麻胃風湯(胃風證)	1	5.55	
眼	神效明目湯(外障)	1	5.55	
鼻	麗澤通氣湯(鼻塞)	1	5.55	
口舌	瀉胃湯(脣腫脣瘡)	1	5.55	
牙齒	滋陰清胃丸(蟲蝕痛)	1	5.55	
風	清陽湯(口眼喎斜), 靈仙除痛飲(歷節風治法), 白朮湯(破傷風之治同傷寒三法)	3	16.65	
瘟疫	調中湯(瘟疫治法)	1	5.55	
消渴	麥門冬飲子(消渴有三)	1	5.55	
黃疸	當歸白朮湯(酒疸), 腎疸湯(女勞疸)	2	11.1	
疥瘡	一補一發丹(疥瘡)	1	5.55	
小兒	葛根麥門冬散(附癩疹)	1	5.55	
癰疽	二活散(疔疽)	1	5.55	
합계		18	100	

Table 3. 佐使藥으로 配伍된 方劑의 治療領域

病門	處方	빈도수	백분율	비고
血	平胃地榆湯(便血)	1	7.69	佐
後陰	升陽補胃湯(腸風臟毒), 益智和中湯(腸風臟毒)	2	15.38	佐, 佐
胞	柴胡調經湯(崩漏治法)	1	7.69	使
頭	三陽湯(頭痛當分六經)	1	7.69	佐使
眼	撥雲湯(腎膜), 益氣聰明湯(老人眼昏)	2	15.38	使, 佐
鼻	溫肺湯(鼻塞)	1	7.69	佐
脇	枳殼煮散	1	7.69	佐
風	防風湯(三痺)	1	7.69	使
寒	沃雪湯(寒下 感寒及四時傷寒)	1	7.69	佐使
火	紅雪通中散(積熱)	1	7.69	佐
諸瘡	散腫潰堅湯(瘰癧)	1	7.69	佐
합계		13	100	

註) 佐使의 구분이 난해한 것은 비고란에 같이 기재하였다.

2. 葛根이 配伍된 方劑의 病症 및 主治 調査

1) 葛根이 君藥으로 配伍된 方劑의 病症 및 主治 調査

葛根이 君藥으로 配伍된 方劑를 疾患別로 區分하고, 이에 대한 病症과 主治를 調査하였다.

2) 葛根이 臣藥으로 配伍된 方劑의 病症 및 主治 調査

葛根이 臣藥으로 配伍된 方劑를 疾患別로 區分하고, 이에 대한 病症과 主治를 調査하였다.

3) 葛根이 佐使藥으로 配伍된 方劑의 病症 및 主治 調査

葛根이 佐使藥으로 配伍된 方劑를 疾患別로 區分하고, 이에 대한 病症과 主治를 調査하였다.

Table 4. 葛根이 君藥으로 配伍된 方劑의 病症 및 主治

區分	病症	處方	主治證狀
胞	崩漏	全生活血湯	治崩漏太多 昏冒不省 瞑目無所知覺. 盖因血暴亡也 血去則心神無所養 暴損氣血 豈能久活 今當補而升舉之以助其陽 則目張 神不昏迷矣 今立一方 補血養血生血 益陽 以補手足厥陰之不足
大便	膿血利	地榆散	治熱毒下痢膿血
寒	寒上 傷寒表證	十神湯 I	治時令不正瘟疫妄行
	寒上 傷寒陽毒	葛根湯	治陽毒
	寒下 傷寒及四時傷寒	升麻葛根湯	治瘟疫 及時令感冒
	陽明形證用藥	葛根解肌湯 I	治陽明經病 目疼 鼻乾 不得臥 宜解肌
面	面見五色	冲和順氣湯	治面色黧黑 不澤環唇 尤甚
	面寒	升麻附子湯	治面寒
頭	腦風證	神聖散	治腦風
皮	癩疹	葛根橘皮湯	治冬溫發癩
火	骨蒸熱	人蔘清肌散	治虛勞 骨蒸潮熱
風	口眼喎斜)	秦芫升麻湯	治風中 手足陽明經 口眼喎斜
		十神湯 II	治時令不正 瘟疫妄行
瘟疫	瘟疫治法	柴胡升麻湯 I	治時行瘟疫 頭痛壯熱
		清熱解肌湯	治天行瘟疫 頭痛壯熱
		葛根解肌湯 II	治春疫 發熱而渴
		柴胡升麻湯 II	治傷寒咳嗽 聲嘶 或引痛
聲音	聲嘶	萬盃不醉丹	萬盃不醉
		神仙不醉丹	萬盃不醉
		醉鄉寶屑	令飲酒不醉
		三豆解醒湯	治中酒發病 頭痛嘔吐 煩渴 善解酒毒 且多飲不醉 因酒患消渴 尤宜服之
霍亂	霍亂後煩渴	止渴湯	治霍亂熱渴
嘔吐	嘔吐治法	葛根竹茹湯	治胃熱嘔吐
咳嗽	諸傷發喘嗽	葶藶散	治過食 煎炒及酒 以致喘急 不得臥 及治肺癰
	慢驚風	白朮散	治吐瀉日久不止 津液枯竭 煩渴引飲 欲成慢驚風
小兒	發熱三朝	四物解肌湯	傷寒撰進 疑似未辨者 以辛涼之劑調之 卽此湯也
	出痘三朝	連翹升麻湯	治瘡疹一發便密如蠶種 或如糠枇 毒盛者
黃疸	酒疸	葛朮湯	治酒疸
	疫癘發黃	茵陳瀉黃湯	治時氣發熱 變爲黃疸 所謂瘟黃

Table 5. 葛根이 臣藥으로 配伍된 方劑의 病症 및 主治

區分	病症	處方	主治證狀
胞	崩漏	全生活血湯	治崩漏太多 昏冒不省 瞑目無所知覺. 盖因血暴亡也 血去則心神無所養 暴損氣血 豈能久活 今當補而升舉之以助其陽 則目張神不昏迷矣 今立一方 補血養血生血 益陽 以補手足厥陰之不足
血	嘔血吐血	葛黃丸	治飲酒多 積熱 以治吐衄血 垂死者
內傷	醒酒令不醉	解酒化毒散	治傷酒 發熱 煩渴 尿赤澁
面	胃風證	升麻胃風湯	治胃風面腫
眼	外障	神效明目湯	治眼楞緊急 致倒睫拳毛上下瞼 皆赤爛 眼痛流淚 隱澁難開
鼻	鼻塞	麗澤通氣湯	治鼻不聞香臭 此肺經有風熱也
口舌	唇腫唇瘡	瀉胃湯	治胃實熱 唇口乾裂 煩渴便秘
牙齒	蟲蝕痛	滋陰清胃丸	治陽明經血熱 上下牙床腫痛 紅爛肉縮 齒根露者
風	口眼喎斜	清陽湯	治中風 口眼喎斜 頰腮急緊 此胃中火盛 必汗不止 小便數
	歷節風治法	靈仙除痛飲	治肢節腫痛 痛屬火 腫屬濕 兼受風寒 而發動於經絡之中 濕熱流走 於肢節之間
	破傷風之治同傷寒三法	白朮湯	治破傷風 大汗不止 筋攣搐搦
瘟疫	瘟疫治法	調中湯	治夏發燥疫 口乾咽塞
消渴	消渴有三	麥門冬飲子	治膈消
黃疸	酒疸	當歸白朮湯	治酒疸 有飲癖心胸堅滿 不進飲食 小便黃赤
	女勞疸	腎疸湯	治腎疸 目黃 尿赤
痲瘡	痲瘡	一補一發丹	治久瘡 內傷挾外感 間發 內治痰外發汗
小兒	附癩疹	葛根麥門冬散	治小兒 癩疹
癰疽	疔疽	二活散	治疔瘡

Table 6. 葛根이 佐使藥으로 配伍된 方劑의 病症 및 主治

區分	病症	處方	主治證狀
血	便血	平胃地榆湯	治結陰便血
後陰	腸風臟毒	升陽補胃湯	治腸澀下血 啣出遠散 如葡萄 色紫黑 腰腹沈重 名曰 濕毒腸澀
		益智和中湯	治腸澀下血 色紫黑 腹痛 惡寒 右關脈 按之無力 喜熱物 熨之內寒明矣
胞	崩漏治法	柴胡調經湯	治崩漏不止
頭	頭痛當分六經	三陽湯	治三陽合病爲頭痛
眼	腎膜	撥雲湯	治眼生黑白腎 隱澁難開 無疼痛 乃足太陽膀胱 爲命門相火 煎熬逆行 作寒水腎
	老人眼昏	益氣聰明湯	治老人勞傷虛損 耳鳴 眼昏 久服 無內障昏暗 耳鳴 耳聾之證 又令精神爽快 飲食倍增 耳目聰明
鼻	鼻塞	溫肺湯	治鼻不聞香臭
脇	氣鬱脇痛	枳殼煮散	治悲哀傷肝 兩脇痛又治七情傷肝 兩腋 兩脇牽痛
風	三痺	防風湯	治行痺走注無定
寒	寒下 感寒及四時傷寒	沃雪湯	解利四時傷寒 以此溫和表裏 通順陰陽
火	積熱	紅雪通中散	治積熱 除毒熱 開三焦 利五藏 口瘡 重舌 喉閉 腸癰等證
諸瘡	瘰癧	散腫潰堅湯	治瘰癧及馬刀瘡 見而不潰 或潰出膿水

3. 葛根이 君藥으로 配伍된 方劑의 病因·病理 調査

1) 葛根이 君藥으로 配伍된 方劑의 病因·病理을 分類하여 區分하였다¹⁹⁾.

2) 葛根이 臣藥으로 配伍된 方劑의 病因·病理을 分類하여 區分하였다.

3) 葛根이 佐使藥으로 配伍된 方劑의 病因·病理을 分類하여 區分하였다.

Table 7. 君藥으로 配伍된 方劑의 病因·病理

區分		病因病理	病症	處方
內經	大便	虛	膿血利	地榆散
	聲音	血虛受熱	聲嘶, 候破	柴胡升麻湯 II
外形	面	面見五色	面脣紫黑	冲和順氣湯
		陽明之氣不能上榮	面寒	升麻附子湯
	頭皮	風氣循風府 冬溫發斑	腦風證, 項背怯寒, 腦戶極冷	神聖散 葛根橘皮湯
雜病	寒	傷寒及四時傷寒	四時感冒	升麻葛根湯
		傷寒表證	治兩感風寒, 頭痛, 寒熱, 無汗	十神湯 I
		傷寒	陽毒	葛根湯
		陽明經病	目痛, 鼻乾, 不得臥	葛根解肌湯 I
	火	虛火	骨蒸熱, 虛勞, 無汗	人蔘清肌散
	風	風中	口眼喎斜	秦芫升麻湯
	瘟疫	瘟疫	時令不正, 瘟疫妄行	十神湯 II
		時行瘟疫	頭痛, 壯熱	柴胡升麻湯 I
		時行瘟疫	頭痛, 壯熱	清熱解肌湯
		春疫	發熱而渴	葛根解肌湯 I
內傷	酒食傷積	醒酒不醉	萬盃不醉丹	
			神仙不醉丹	
			醉鄉寶屑	
			三豆解醒湯	
霍亂	霍亂	霍亂後煩渴	止渴湯	
嘔吐	胃熱	嘔吐	葛根竹茹湯	
咳嗽	過食, 煎炒及酒	咳嗽, 不得臥, 肺癰	葶藶散	
	吐瀉日久不止	津液枯渴, 煩渴引飲, 慢驚風	白朮散	
小兒	傷寒	發熱三朝	四物解肌湯	
	毒	出痘三朝, 瘡疹	連翹升麻湯	
	酒疸	黃疸	葛朮湯	
黃疸	瘟黃	時氣發熱	茵陳瀉黃湯	

Table 8. 臣藥으로 配伍된 方劑의 病因·病理

區分		病因病理	病症	處方
內經	胞	血暴亡	崩漏 昏冒不省 瞑目無所知覺	全生活血湯
	血	飲酒多, 積熱	嘔血吐血	葛黃丸
外形	面	胃風	胃風證, 面腫	升麻胃風湯
	眼	外障者 肺病也	眼楞緊急 致倒睫拳毛上下瞼皆赤爛 睛痛流淚 隱澁難開	神效明目湯
	鼻	肺經有風熱	鼻不聞香臭	麗澤通氣湯
	口舌	胃實熱	脣口乾裂煩渴便秘	瀉胃湯
	牙齒	治陽明經血熱	上下牙床腫痛紅爛肉縮齒根露者	滋陰清胃丸
雜病	內傷	醒酒令不醉	傷酒發熱, 煩渴, 尿赤澁	解酒化毒散
	風	胃中火盛	中風 口眼喎斜 頰顛急緊 此胃中火盛 必汗不止小便數	清陽湯
		屬火 腫屬濕 兼受風寒 而發動於經絡之中 濕熱流走 於肢節之間	肢節腫痛痛	靈仙除痛飲
		傷風	破傷風大汗不止筋攣搖擗	白朮湯
	瘟疫	夏發燥疫	口乾咽塞	調中湯
	消渴	消渴	膈消	麥門冬飲子
	黃疸	酒疸	有飲癖心胸堅滿不進飲食小便黃赤	當歸白朮湯
		腎疸	目黃尿赤	腎疸湯
	瘰癧	久瘡內傷挾外感	瘰癧	一補一發丹
	小兒	肺, 胃熱毒熏發於皮膚	附隱疹, 狀如蚊瘙所咬	葛根麥門冬散
癰疽	疔疽	疔瘡	二活散	

Table 9. 佐使藥으로 配伍된 方劑의 病因·病理

區分		病因病理	病症	處方
內經	胞	血崩經血錯亂	崩漏不止	柴胡調經湯
	血	陰結	便血	平胃地榆湯
外形	後陰	濕毒腸澀	腸澀下血 啣吐遠散如蒜 色紫黑 腰腹沈重	升麻補胃湯
		內寒	腸澀下血 色紫黑 腹痛惡寒 右關脈按之無力 喜熱物熨之	益智和中湯
	頭	三陽合病	頭痛	三陽湯
	眼	足太陽膀胱 爲命門相火 煎熬逆行 作寒水腎	眼生黑白翳 隱澁難開 無疼痛	撥雲湯
		老人勞傷 虛損	耳鳴 眼昏 久服 無內障昏暗 耳鳴 耳聾之證 又令精神爽快 飲食倍增 耳目聰明	益氣聰明湯
	鼻	鼻塞	鼻不聞香臭	溫肺湯
脇	悲哀傷肝	兩脇痛, 兩腋兩脇牽痛	枳殼煮散	
雜病	風	風寒	治行痺走注無定	防風湯
	寒	傷寒	解利四時傷寒	沃雪湯
	火	積熱	開三焦 利五藏 口瘡 重舌 喉閉 腸癰等證	紅雪通中散
	諸瘡	瘰癧	瘰癧及馬刀瘡 見而不潰 或潰出膿水	散腫潰堅湯

4. 葛根의 使用量에 대한 調査

葛根이 配伍된 方劑에서 葛根의 一回 使用量을 調査하여 分量別로 病症과 處方을 정리하였다. 丸

劑로 되어있는 경우에는 20貼 分量으로 나누어 換算하였고, 散劑는 原文에 標記된 每回 服用量 중에 실제 포함된 葛根의 分量을 換算하였다.

Table 10. 葛根이 君藥으로 配伍된 方劑內的 1회 사용량

用量	病症	處方	빈도수	백분률(%)
七分	面寒, 聲嘶	升麻附子湯, 柴胡升麻湯Ⅱ	2	7.14
一錢	膿血利, 寒上 傷寒表證, 陽明 形症用藥 癩疹, 骨蒸熱, 瘧疫治法, 諸傷發喘嗽	地榆散, 十神湯Ⅰ, 葛根解肌湯Ⅰ, 葛根橘皮湯, 人蔘清肌散, 柴胡升麻湯Ⅰ, 葶藶散	7	24.99
一錢半	面見五色, 口眼喎斜, 疫癘發黃	冲和順氣湯, 秦芫升麻湯, 茵陳瀉黃湯	3	10.71
二錢	寒下 傷寒及四時傷寒, 寒上 傷寒陽毒, 瘧疫治法, 醒酒令不醉, 醒酒令不醉, 慢驚風, 發熱三朝, 出痘三朝, 酒疸	升麻葛根湯, 葛根湯, 十神湯Ⅱ, 萬盃不醉丹*, 三豆解醒湯, 白朮散, 四物解肌湯, 連翹升麻湯, 葛朮湯	9	32.13
二錢半	嘔吐治法	葛根竹茹湯	1	3.57
三錢	瘧疫治法, 瘧疫治法	清熱解肌湯, 葛根解肌湯Ⅱ	2	7.14
五錢	醒酒令不醉, 霍亂後煩渴	醉鄉寶屑, 止渴湯	2	7.14
各등분	腦風證, 醒酒令不醉	神聖散, 神仙不醉丹	2	7.14
합계			28	100

註)萬盃不醉丹 :20첩을 한제 분량으로 하여 나누어 환산하였다.

Table 11. 葛根이 臣藥으로 配伍된 方劑內的 1회 사용량

用量	病症	處方	빈도수	백분률(%)
三分五厘	蟲蝕痛, 疥瘡	滋陰清胃丸, 一補一發丹	2	11.1
五分	歷節風治法, 女勞疸	靈仙除痛飲, 腎疸湯	2	11.1
六分	附癩疹	葛根麥門冬散	1	5.55
七分	崩漏, 鼻塞	全生活血湯, 麗澤通氣湯	2	11.1
一錢	嘔血吐血, 胃風證, 脣腫脣瘡, 瘧疫治法, 消渴有三, 酒疸	葛黃丸, 升麻胃風湯, 瀉胃湯, 調中湯, 麥門冬飲子, 當歸白朮湯	6	33.3
一錢半	外障, 口眼喎斜, 疔疽	神效明目湯, 清陽湯, 二活散	3	16.65
二錢	破傷風之治同傷寒三法	白朮湯	1	5.55
一兩二錢半	醒酒令不醉	解酒化毒散	1	5.55
합계			18	100

*註)滋陰清胃丸(七錢), 一補一發丹(七錢), 葛黃丸(二兩)

Table 12. 葛根이 佐使藥으로 配伍된 方劑內的 1회 사용량

用量	病症	處方	빈도수	백분률(%)
三分	腎膜, 三痺	撥雲湯, 防風湯	2	15.38
五分	便血, 腸風臟毒, 崩漏治法, 頭痛當分六經, 瘰癧	平胃地榆湯, 升陽補胃湯, 益智和中湯, 柴胡調經湯, 三陽湯, 散腫潰堅湯	6	46.14
六分	老人眼昏	益氣聰明湯	1	7.69
七分	脇痛, 寒下 感寒及四時傷寒	枳殼煮散, 沃雪湯	2	15.38
一錢	鼻塞	溫肺湯	1	7.69
一錢半	積熱	紅雪通中散	1	7.69
합계			13	100

5. 葛根이 配伍된 方劑의 構成內容調査

- 1) 葛根이 君藥으로 配伍된 方劑를 疾患別로 區分하고, 이에 대한 處方構成 內容을 分析하였다.
- 2) 葛根이 臣藥으로 配伍된 方劑를 疾患別로

- 區分하고, 이에 대한 處方構成 內容을 分析하였다.
- 3) 葛根이 佐使藥으로 配伍된 方劑를 疾患別로 區分하고, 이에 대한 處方構成 內容을 分析하였다.

Table 13. 葛根이 君藥으로 配伍된 方劑의 질환별 구분, 處方構成

病症	處方	構成內容	構成基本方
大便	地榆散	地榆 犀角 黃連炒 葛根 黃芩各一錢 梔子五分 右剉作一貼 入薤白五莖 同煎服(活人)	
寒	升麻葛根湯	葛根二錢 白芍藥 升麻 甘草各一錢 右剉作一貼 入薑三葱二 煎服(局方)	芍藥甘草湯
	十神湯 I	葛根 赤芍藥 升麻 白芷 川芎 陳皮 麻黃 紫蘇葉 香附子 甘草各一錢 爲右剉作一貼 入薑五葱白三 煎服(正傳)	升麻葛根湯 芎芷香蘇散
	葛根湯	葛根二錢 黃芩 大黃醋炒 梔子 朴硝 甘草各一錢五分 右剉作一貼 水煎服(海藏)	
	葛根解肌湯 I	葛根 柴胡 黃芩 芍藥 羌活 石膏 升麻 白芷 桔梗各一錢 甘草五分 右剉作一貼 入薑三棗二 水煎服(醫鑿) 一名 柴葛解肌湯(回春)	桔梗葛根湯, 升麻葛根湯, 小柴胡湯類
面	冲和順氣湯	葛根一錢半 升麻 白芷 防風各一錢 黃芪八分 人蔘七錢 甘草四分 白芍藥 蒼朮各三分 右剉作一貼 入薑三片棗二枚 水煎服 早飯後 午飯前(寶鑑)醫鑿 升麻白芷湯 同	
	升麻附子湯	升麻 附子炮 葛根 白芷 黃芪蜜炒各七分 人蔘 草豆寇 甘草炙各五分 益智仁三分 右剉作一貼, 入連鬚葱白三莖, 同煎服, 食前(入門)	升麻葛根湯
頭	神聖散	麻黃 細辛 葛根半生半炒 藿香葉各等分 右爲末 每取二錢 荊芥薄荷酒 調下(河間)	
皮	葛根橘皮湯	葛根 橘皮 杏仁 知母 黃芩 麻黃 甘草各一錢, 右剉作一貼 煎服(元戎)	
火	人蔘清肌散	人蔘 白朮 白茯苓 赤芍藥 當歸 柴胡 葛根 半夏麴各一錢 甘草五分 右剉作一貼 入薑三棗二 水煎服 一方 有黃芩(丹心)	四君子湯, 小柴胡湯類
風	秦艽升麻湯	升麻 葛根 白芍藥 人蔘 甘草各一錢半 秦艽 白芷 防風 桂枝各七分 右剉作一貼 入連根葱白三莖 水煎服 食後(寶鑑)	
瘟疫	十神湯 II	葛根二錢 赤芍藥 升麻 白芷 川芎 陳皮 麻黃 紫蘇葉 香附子 甘草各一錢 右剉作一貼 入薑五葱白三 煎服(正傳)	升麻葛根湯, 芎芷香蘇散

	柴胡升麻湯 I	柴胡 前胡 葛根 赤芍藥 荊芥 石膏 <small>各一錢</small> 桑白皮 黃芩 <small>各七錢</small> 升麻 <small>五分</small> 右剉作一貼 入薑三 豆豉十粒 水煎服(入門)	升麻葛根湯, 小柴胡湯二母散類
	清熱解肌湯	葛根 <small>三錢</small> 黃芩 赤芍藥 <small>各一錢半</small> 甘草 <small>一錢</small> 右剉作一貼 水煎服(丹心) 一名 解肌湯(得效)	
	葛根解肌湯 II	葛根 <small>三錢</small> 麻黃 黃芩 <small>各二錢</small> 芍藥 <small>一錢半</small> 桂枝 <small>一錢</small> 甘草 <small>八分</small> 右剉作一貼 入薑三 棗二 水煎服(入門)	升麻葛根湯
聲音	柴胡升麻湯 II	柴胡 黃芩 半夏 升麻 乾葛 枳實 桔梗 知母 貝母 玄參 桑白皮 甘草 <small>各七分</small> 右剉作一貼 薑三片 水煎服(醫鑿)	
小兒	白朮散	葛根二錢 人蔘 白朮 白茯苓 木香 藿香 甘草 <small>各一錢</small> 爲粗末 每二錢 水煎任意服 一名 錢氏白朮散(錢乙) 一名 清寧散(得效)	
	四物解肌湯	葛根二錢 白芍藥 升麻 黃芩 <small>各一錢</small> 爲右剉作一貼 入薑三葱二 煎服(綱目)	
	連翹升麻湯	葛根二錢 白芍藥 升麻 連翹 甘草 <small>各一錢</small> 爲右剉作一貼 入薑三葱二 煎服(局方)	升麻葛根湯
黃疸	葛朮湯	葛根 蒼朮 <small>各二錢</small> 枳實 梔子 甘草 <small>各一錢</small> 豆豉一合 右剉作一貼 水煎服(濟生)	
	茵陳瀉黃湯	葛根 <small>一錢半</small> 茵陳 黃連 <small>薑汁炒</small> 梔子 <small>炒</small> 白朮 赤茯苓 白芍藥 厚朴 木通 人蔘 <small>各一錢</small> 木香 <small>七分</small> 右剉作一貼 入薑三片 水煎服(節齋)	

Table 14. 葛根이 臣藥으로 配伍된 方劑의 질환별 구분, 處方構成 내용

病症	處方	構成內容	構成基本方
胞	全生活血湯	白芍藥 升麻 各一錢 防風 羌活 獨活 柴胡 當歸身 葛根 甘草 <small>各七分</small> 藁本 川芎 <small>各五分</small> 生地黃 熟地黃 <small>各四分</small> 蔓荊子 細辛 <small>各三分</small> 紅花 <small>一分</small> 右剉作一貼 水煎服(東垣)	升麻葛根湯 四物湯
血	葛黃丸	黃連 <small>四兩</small> 葛花 <small>二兩</small> 無卽 葛根代之 爲末 用大黃末 水熬成膏 和丸 梧子大 溫水下百丸(回春) 一名 葛連丸	
內傷	解酒化毒散	滑石四兩 葛根一兩二錢半 甘草七錢半 右爲末 冷水或熱湯調下二三錢 日二三服[回春]	益元散
面	升麻胃風湯	升麻二錢 白芷一錢二分 當歸 葛根 蒼朮 各一錢 甘草一錢半 麻黃不去節五分 柴胡 藁本 羌活 黃栢 草豆蔻 各三分 蔓荊子二分 右剉作一貼 入薑三片 棗二枚 水煎服食後[東垣]	升麻葛根湯
眼	神效明目湯	甘草二錢 葛根一錢半 防風一錢 蔓荊子五分 細辛二分 右剉作一貼 水煎食後服[東垣]	
鼻	麗澤通氣湯	黃芪一錢 蒼朮 羌活 獨活 防風 升麻 葛根 各七分 甘草灸五分 麻黃 川椒 白芷 各三分 右剉作一貼 入薑三片 棗二枚 葱白三寸 水煎服[河間]	升麻葛根湯
口舌	瀉胃湯	大黃二錢半 葛根一錢 桔梗 枳殼 前胡 杏仁 各五分 右剉作一貼 入生薑三片 水煎服[入門]	
牙齒	滋陰清胃丸	石膏煨醋淬二兩 當歸酒洗 生地黃酒洗 梔子鹽水炒 牡丹皮各一兩 黃連酒炒 知母 葛根 防風 各七錢 升麻 白芷 各五錢 生甘草節四錢 右爲末 蒸餅和丸 菉豆大米飲下百丸[回春]	
風	清陽湯	升麻 黃芪 當歸身 各二錢 葛根一錢半 甘草炙一錢 蘇木 甘草生 各五分 酒黃栢 紅花 桂枝 各二分 右剉作一服 酒三盞 煎至一盞 三分溫服[東垣]	升麻葛根湯類 當歸補血湯
	靈仙除痛飲	麻黃 赤芍藥 各一錢 防風 荊芥 羌活 獨活 威靈仙 白芷 蒼朮 片芩 酒炒 枳實 桔梗 葛根 川芎 各五分 當歸梢 升麻 甘草 各三分 右剉作一貼 水煎服[醫鑿] 一名 麻	桔梗葛根湯類

		黃芍藥湯	升麻葛根湯
	白朮湯	白芍藥三錢白朮葛根各二錢升麻黃芩各一錢甘草五分右剉作一貼水煎服[丹心]	升麻葛根湯
瘟 疫	調中湯	大黃一錢半黃芩芍藥葛根桔梗赤茯苓藁本白朮甘草各一錢右剉作一貼水煎服[活人]	桔梗葛根湯 回生散
消 渴	麥門冬飲子	麥門冬二錢知母天花粉人參五味子葛根茯神生地黃甘草各一錢右剉作一貼入竹葉十片水煎服[丹心]	生脈散

Table 15. 葛根이 佐使藥으로 配伍된 方劑의 질환별 구분, 處方構成 내용

病 症	處 方	構 成 內 容	構 成 基 本 方
血	平胃地榆湯	蒼朮升麻附子炮各一錢地榆七分葛根厚朴白朮陳皮赤茯苓各五分乾薑當歸神麴炒白芍藥益智仁人參甘草灸各三分右剉作一貼薑三棗二水煎服<寶鑑>	平胃散 四君子湯 升麻葛根湯 附子理中湯
後 陰	升陽補胃湯	白芍藥一錢半 升麻 羌活 黃芪各一錢 生地黃 熟地黃 獨活 柴胡 防風 牧丹皮 甘草灸各五分 當歸 葛根各三分 肉桂二分右剉作一貼 水煎服(東垣) 一名 升麻補胃湯, 升麻葛根湯	
	益智和中湯	白芍藥一錢半 當歸 黃芪 升麻 灸甘草各一錢 牧丹皮 柴胡 葛根 益智 半夏 桂枝各四分 肉桂 乾薑炮各二分 右剉作一貼 水煎服(東垣)	升麻葛根湯芍藥甘草湯
胞	柴胡調經湯	蒼朮一錢半柴胡一錢羌活獨活藁本升麻各七分葛根當歸甘草各五分紅花二分右剉作一貼水煎服<東垣>	
頭	三陽湯	羌活防風石膏白芷柴胡川芎各一錢荊芥升麻葛根芍藥細辛各五分右剉作一貼入連根葱白三莖水煎服[海藏]	升麻葛根湯
癰 疽	二活散	羌活獨活當歸烏藥赤芍藥金銀花天花粉連翹白芷甘草節各二錢紅花蘇木荊芥蟬蛻乾葛各一錢半檀香一錢右爲末每三錢蒼耳煎湯調下[正傳]	
黃 疸	當歸白朮湯	赤茯苓一錢半蒼朮枳實杏仁前胡葛根甘草各一錢半夏七分半當歸黃芩茵陳各五分右剉作一貼薑三水煎服[三因]	
	腎疸湯	蒼朮一錢升麻羌活防風藁本獨活紫胡葛根白朮各五分猪苓四分澤瀉神麴人參甘草各三分黃芩黃柏各二分右剉作一貼水煎服[正傳]	二妙散
痲 瘡	一補一發丹	赤茯苓一兩半夏陳皮柴胡黃芩蒼朮葛根各七錢常山三錢右爲末麩糊和丸梧子大白湯下七十丸[入門]	
小 兒	葛根麥門冬散	石膏一錢葛根麥門冬各六分人參升麻赤茯苓赤芍藥甘草各三分右剉水煎服[丹心]	升麻葛根湯

IV. 考 察

葛根은 辛涼解表의 대표적인 약으로 『神農本草經』²⁰⁻²²⁾에서 “主消渴, 身大熱, 嘔吐, 諸瘧, 起陰氣, 諸解毒.”, 『本草備要』^{23,24)}에서 “輕揚升發. 入

陽明經能鼓胃氣上行. 生津止渴”, 『本草綱目』²⁵⁾에 서는 “散鬱火”라 하였다. 『東醫寶鑑』²⁶⁾에 보면 葛根은 性平 味甘 無毒하며 “主風寒頭痛 解肌發表出汗 開腠理 解酒毒 止煩渴 開胃下食 治胸膈熱 通小腸 療金瘡한다고 하였다. 또한 足陽明經 行經의

藥으로 기재되어 있다. 『東醫寶鑑』에서 葛根이 配伍된 59개 처방에 대한 治療領域, 病症 및 主治, 病因·病理, 使用量, 處方構成 등을 君, 臣, 佐使로 나누어 調査 分析하였다.

葛根이 配伍된 方劑의 治療領域을 살펴보면 다음과 같다.

Table 1에서 君藥은 『東醫寶鑑』중 大便, 寒, 面, 頭, 皮, 火, 風, 溫疫, 聲音, 內傷, 霍亂, 嘔吐, 咳嗽, 小兒, 黃疸 등 15개 영역에서 사용되었으며, 그 중 寒, 溫疫, 內傷, 小兒 等門에서 사용된 빈도수가 가장 많았다.

Table 2에서 臣藥은 胞, 血, 內傷, 面, 眼, 鼻, 口, 舌, 牙齒, 風, 溫疫, 消渴, 黃疸, 疔瘡, 小兒, 癰疽 등 15개 영역에서 사용되고 있으며 그 중에서도 風에 사용된 빈도수가 가장 많았다.

Table 3에서 佐使藥은 血, 後陰, 胞, 頭, 眼, 鼻, 脇, 風, 寒, 火, 諸瘡 등 11개 영역에서 사용되었다.

葛根이 配伍된 方劑의 病症 및 主治를 조사해 보면 다음과 같다.

Table 4에서 君藥은 崩漏, 膿血利, 寒上 傷寒表證, 寒上 傷寒陽毒, 寒下 傷寒及四時傷寒, 陽明形證用藥, 面見五色, 面寒, 腦風證, 癩疹, 骨蒸熱, 口眼喎斜, 癩疫治法, 聲嘶, 醒酒令不醉, 霍亂後煩渴, 嘔吐治法, 諸傷發喘嗽, 慢驚風, 發熱三朝, 出痘三朝, 酒疸, 疫癘發黃 등의 病症에 사용되었다. 이들 病症 중 『東醫寶鑑』寒門 중에서 傷寒表證, 傷寒陽毒, 傷寒及四時傷寒, 陽明形證用藥의 病症과 溫疫門 중 癩疫治法의 病症에서 8개의 처방이 사용되어 사용된 빈도수가 가장 많았다.

Table 5에서 臣藥은 崩漏, 嘔血吐血, 醒酒令不醉, 胃風證, 外障, 鼻塞, 脣腫脣瘡, 蟲蝕痛, 口眼喎斜, 歷節風治法, 破傷風之治同傷寒三法, 癩疫治法, 消渴有三, 酒疸, 女勞疸, 疔瘡, 附癩疹, 疔疽 등의 病症에 사용하고 있었다. 이들 病症 중 『東醫寶鑑』風門의 口眼喎斜, 歷節風治法, 破傷風之治同傷寒三法 에서 사용된 빈도수가 가장 많았다.

Table 6에서 佐使藥은 便血, 腸風臟毒, 崩漏治

法, 頭痛當分六經, 腎膜, 老人眼昏, 鼻塞, 氣鬱脇痛, 三痹, 寒下 感寒及四時傷寒, 積熱, 癩癰 의 病症에 사용되었다. 이들 病症 中 『東醫寶鑑』眼門의 腎膜, 老人眼昏에 사용된 빈도수가 가장 많았다.

葛根이 配伍된 方劑의 病因·病理를 調査해 보면 다음과 같다.

Table 7에서 君藥은 虛, 血虛受熱, 面見五色, 陽明之氣不能上榮, 風氣循風府, 冬溫發斑, 傷寒及四時傷寒, 傷寒表證, 傷寒, 陽明經病, 虛火, 風中, 癩疫, 時行癩疫, 春疫, 酒食傷積, 霍亂, 胃熱, 過食, 煎炒及酒, 吐瀉日久不止, 毒, 酒疸, 癩黃 등에서 傷寒及四時傷寒, 傷寒表證, 傷寒, 陽明經病은 모두 雜病編의 寒門에서 사용된 빈도수가 가장 많았다.

Table 8에서 臣藥은 血暴亡, 飲酒多, 胃風, 積熱, 外障者 肺病也, 肺經有風熱, 胃實熱, 治陽明經血熱, 醒酒令不醉, 胃中火盛, 屬火腫屬濕兼受風寒而發動於經絡之中濕熱流注於肢節之間, 傷風, 夏發燥疫, 消渴, 酒疸, 腎疸, 久瘡內傷挾外感, 肺, 胃熱毒熏發於皮膚, 疔疽 등에서 사용되고 있다. 이 중 胃中火盛, 屬火腫屬濕兼受風寒而發動於經絡之中濕熱流注於肢節之間, 傷風은 모두 雜病編의 風門에서 사용된 빈도수가 가장 많았다.

Table 9에서 佐使藥은 血崩經血錯亂, 陰結, 濕毒腸澼, 內寒, 三陽合病, 足太陽膀胱爲命門相火煎熬逆行作寒水腎, 老人勞傷虛損, 鼻塞, 悲哀傷肝, 風寒, 傷寒, 積熱, 癩癰 에서 사용된 빈도수가 가장 많았다.

葛根의 使用量을 조사한 결과는 Table 10에서 보는 바와 같다. 즉, 一回 使用量으로 볼 때 君藥은 七分, 一錢, 一錢半, 二錢, 二錢半, 三錢, 五錢, 各等分 등이며, 이 중 二錢이 32.1%로 가장 많이 사용되었다. 臣藥은 三分五厘, 五分, 六分, 七分, 一錢, 一錢半, 二錢, 一兩二錢半 등이며 그 중 一錢이 33.3%로 가장 많이 사용되었다. 佐使藥은 三分, 五分, 六分, 七分, 一錢, 一錢半 등이며 그 중 五分이 46.14%로 가장 많이 사용되었다.

葛根이 配伍된 方劑의 構成內容을 조사해 보면

Table 13, 14, 15.과 같았다. 즉, Table 13를 보면 葛根이 君藥으로 사용되는 處方의 基本方은 升麻 葛根湯으로 볼 수 있다. 升麻葛根湯은 葛根, 白芍藥, 升麻, 甘草로 구성되었고 透疹의 효능을 가지며 發疹을 충분히 돋아나게 하여 경과를 단축하고 癩疹의 內攻에 의한 피해를 막는다. 白芍藥은 斂陰하면서 滋陰하고 升麻, 葛根의 發汗으로 인한 津液을 보충하고 과도한 發散을 억제해주는 작용도 있다. 따라서 升麻, 葛根으로 發疹을 충분하게 하며, 葱白과 生薑으로 이를 돕고 白芍藥은 滋陰和營 하면서 升麻, 葛根의 과도한 作用을 拮抗하고 甘草가 이러한 作用을 助하여 준다²⁷⁾. 升麻는 味가 甘辛하고 性이 微寒해서 發表透疹, 清熱解毒하는 효능이 있다. 葛根은 甘辛하고 性이 平하여 升陽發表, 解肌透疹, 生津止渴하는 作用이 있다. 두 약제는 모두 辛涼淸輕한 藥材로서 서로 配伍되면 辛味로 達表하고 輕함으로는 去實하여 解肌透津하는 作用이 배가 되므로 陽明肌腠의 邪를 散하는데 가장 적합하게 되며 임상에서는 痘疹을 發表시키는 기초적인 藥對로 상용된다^{28,29)}. 升麻葛根湯의 加減方에서 葛根이 君藥으로 配伍된 方제는 寒門의 十神湯 I, 葛根解肌湯 I, 冲和順氣湯, 升麻附子湯, 神聖散, 秦芫升麻湯, 十神湯 I, 柴胡升麻湯 I, 葛根解肌湯 II, 柴胡升麻湯 II, 四物解肌湯, 連翹升麻湯 등에서 사용되었다. 이는 寒, 面, 頭, 風, 癩疫, 聲音, 小兒 等門에서 사용되었다. 臣藥에서도 升麻葛根湯이 基本方으로 가장 많이 쓰이고 있는데 Table 14에서 보면 全生活血湯, 升麻胃風湯, 麗澤通氣湯, 淸陽湯, 靈仙除痛飲, 白朮湯, 葛根麥門冬湯 등에서 사용되었다. 이는 胞, 面, 鼻, 風, 小兒 等門에서 사용되었다. 또한 佐使藥에서도 사용되고 있는데 平胃地榆湯, 升陽補胃湯, 益智和中湯, 三陽湯, 益氣聰明湯, 紅雪通中散, 散腫潰堅湯 등에서 사용되었고, 이는 血, 後陰, 頭, 眼, 火, 諸瘡 等門에서 사용되었다.

이상을 종합해보면 葛根이 配伍되는 處方의 基本方은 升麻葛根湯이 가장 많았으며 이는 透疹發

散하는 效能을 基本으로 하는 것을 알 수 있었다. 따라서 本 論文은 葛根이 配伍된 方劑를 분석하고 構成藥材의 作用을 이해할 뿐만 아니라, 方劑構成에 대한 이론적 근거를 제시하는데 많은 도움이 될 수 있을 것으로 생각된다.

V. 結 論

『東醫寶鑑』에 葛根이 配伍되어 있는 59개 處方에 대한 治療領域, 病症 및 主治, 病因·病理, 使用量, 處方構成 등을 調査를 한 바 다음과 같은 결론을 얻었다.

1. 葛根의 治療領域은 君藥은 총 15개 영역으로, 그 중 寒, 溫疫, 內傷, 小兒 等門에서 가장 많은 빈도수로 사용되었고, 臣藥에서는 총 15개 영역으로, 그 중 風에서 가장 많은 빈도수로 사용되었다. 또한 佐使藥에서는 총 11개 영역으로 모두 비슷한 빈도수로 사용되었다.
2. 葛根의 病症은 君藥에서는 寒門 중에서 傷寒表證, 傷寒陽毒, 傷寒及四時傷寒, 陽明形證用藥의 病症과 溫疫門 중 癩疫治法의 病症에서 8개의 처방이 빈도수가 가장 높았고, 臣藥에서는 風門의 口眼喎斜, 歷節風治法, 破傷風之治同傷寒三法에서, 佐使藥은 眼門의 瞽膜, 老人眼昏에서 사용된 빈도수가 가장 높다.
3. 葛根이 配伍된 方劑의 病因 및 病理는 君藥에서는 寒門, 臣藥에서는 風門을 위주로 하고, 佐使藥은 여러 門의 病症에서 사용되었다.
4. 葛根의 1회 使用量은 君藥에서는 七分~五錢까지이며 그 중 二錢, 臣藥에서는 三分五厘~一兩二錢半까지이며 그 중 一錢, 佐使藥에서는 三分~一錢半까지이며 그 중 五分이 가장 많은 빈도수로 사용되었다.
5. 葛根이 配伍된 약제와 처방을 보면 葛根의 升陽發表, 解肌透疹, 生津止渴 등의 효능을 발휘

하고 있으며, 葛根이 배오된 방제의 基本方은 升麻葛根湯이다.

參考文獻

1. 全國 韓醫科大學 本草學 教授. 本草學. 서울: 永林社, 2004:185.
2. 朱榮丞. 耘谷 本草學 各論(上). 서울:서림재, 2004:85.
3. 申民教. 臨床本草學. 서울:영림사, 1997:341-3.
4. 申佶求. 申氏本草學. 서울:수문사. 1988:227.
5. 김재익. 臨床 本草學 講座. 서울:대성의학사. 2001:747.
6. 李載熙. 本草講座. 원주:의방서원. 2003:294.
7. 李相漸. 현대한방 약물학. 서울:의방서원. 1974:243.
8. 서부일, 변성희. 國譯本草備要. 서울:일중사. 2003:158.
9. 서부일, 정국영. 알기 쉬운 本草學. 대구:대구한 의대학교출판부. 2007:40.
10. 서부일, 김봉헌. 쉽게 읽는 본초학. 대구:대구 한의대학교출판부. 2007:27.
11. 張仲景. 傷寒論. 원주:醫方出版社. 2004:181.
12. 孟永利 外2人. 傷寒論現代研究與臨床應用. 北京: 學院出版社. 1998:148, 155.
13. 孟雄在. 傷寒論概說. 익산:圓光大學校出版局. 1996:66, 96.
14. 蔡仁植. 傷寒論譯註. 서울:高文社. 1974: 287, 328, 331.
15. 張仲景. 傷寒論. 北京:一中社. 1991:70, 114.
16. 錢乙. 小兒藥證直結. 江蘇省:江蘇科學技術出版社. 1983:49.
17. 錢乙. 小兒藥證直結. 서울:醫聖堂. 2002:115.
18. 閻孝忠. 閻氏小兒方論. 서울:醫聖堂. 2002:221.
19. 許浚. 湯證으로 보는 『東醫寶鑑』. 서울:오비 기획. 2003:24, 26, 217, 309, 323, 336, 436, 439, 440, 450, 460, 468, 489, 492, 609, 637, 640, 654, 669, 822, 823, 838, 844, 876, 877, 883, 901, 903, 913, 915, 922, 925, 926.
20. 孫星衍 외2인. 神農本草經. 北京:文光圖書有限公司印行. 1990:138.
21. 馬斷興. 神農本草經輯注. 北京:人民衛生出版社. 1995:123.
22. 吳普. 神農本草經. 서울:醫聖堂, 2003:160.
23. 汪認庵. 本草備要. 서울:高文社, 1974:26.
24. 汪認庵. 本草備要. 北京:洪業書局, 1992:22.
25. 李時珍. 本草綱目 6권. 서울:도서출판 여일, 2007:219.
26. 許浚. 『東醫寶鑑』. 서울:법인분화사, 1999:217, 224, 271, 341, 369, 370, 451, 502, 512, 513, 514, 547, 552, 557, 590, 592, 593, 605, 621, 676, 721, 792, 733, 837, 938, 951, 960, 961, 964, 974, 983, 989, 1006, 1029, 1065, 1066, 1072,1108, 1111, 1116, 1120, 1137, 1138, 1139, 1165, 1205, 1211, 1258, 1283, 1291, 1331, 1339, 1341, 1348, 1350, 1352, 1356, 1370, 1374, 1379, 1384, 1385, 1478, 1515, 1529, 1531, 1544, 1548, 1549, 1566, 1616, 1682, 1759, 1777, 1782, 1785, 1931, 1975.
27. 尹用甲. 東醫方劑와 處方解說. 서울:醫聖堂, 2002:813-26.
28. 陳維華 외 4人. 藥對論. 서울:一中社, 1996:56.
29. 이승혁. 臨床藥對論. 서울:醫聖堂. 2003:35.