

동의신경정신과 학회지
J. of Oriental Neuropsychiatry
Vol. 20, No. 1, 2009

『方藥合編』에 수록된 神經精神科 관련 주요 處方에 대한 研究

김지훈, 구병수, 김근우
동국대학교 한의과대학 신경정신과학교실

Analysis of the Important Herb Medications Corresponded with Neuropsychiatry of 『Bang-Yak-Hap-Pyun』

Jee-Hoon Kim, Byung-Soo Koo, Geun-Woo Kim

Dept. of Neuropsychiatry, College of Oriental Medicine DongGuk University

Abstract

Objectives :

The purpose of this study is to analysis of the herb medications corresponded with neuropsychiatry of 『Bang-Yak-Hap-Pyun』.

Methods :

The herb medications of 『Bang-Yak-Hap-Pyun』 Sang · Jung · Ha-Tong(上 · 中 · 下統) and 『Enlargement side prescriptions』(增補方) are selected by comment on the chief virtue including reference word of corresponded with neuropsychiatry.

Results and Conclusion :

『Bang-Yak-Hap-Pyun』 is a book most people who have a background or career in Han Medicine(韓醫學) would pore over. They corresponded with neuropsychiatry among the herb medications of 『Bang-Yak-Hap-Pyun』 Sang · Jung · Ha-Tong(上 · 中 · 下統) are 55 prescriptions that Sang-Tong(上統) is 8 prescriptions, Jung-Tong(中統) is 23 prescriptions and Ha-Tong(下統) is 24 prescriptions. And the herb medications corresponded with neuropsychiatry of 『Enlargement side prescriptions』(增補方) are 40 prescriptions. And then the herb medications corresponded with neuropsychiatry of 『Bang-Yak-Hap-Pyun』 received much influence from 『Dong-Eui-Bo-Gam』. Incidentally the herb medications corresponded with neuropsychiatry of 『Bang-Yak-Hap-Pyun』 Sang · Jung · Ha-Tong showed the high percentage in Neurosis. And the herb medications corresponded with neuropsychiatry of 『Enlargement side prescriptions』 showed the high percentage in Psychosis.

투고일 : 2/11 수정일 : 3/2 채택일 : 3/7

교신저자 : 김근우, 경기도 성남시 분당구 수내동 87-2번지 동국대학교 분당한방병원 신경정신과
Tel : 031-710-3740, Fax : 031-710-3780, E-mail : kgwoo86@hanmail.net

Besides not only put 『Enlargement side prescriptions,』 a premium on 『Dong-Eui-Bo-Gam』, but also made it the herb medications which were recorded on books flowed after 『Dong-Eui-Bo-Gam』 known. It was entered up books quoted from 『Bang-Yak-Hap-Pyun』 Sang · Jung · Ha-Tong but the herb medications were that were not succeeded from 『Bang-Yak-Hap-Pyun』 Sang · Jung · Ha-Tong . Therefore 『Enlargement side prescriptions,』 shows the efforts for supplement of 『Bang-Yak-Hap-Pyun』 Sang · Jung · Ha-Tong.

Key Words :

Bang-Yak-Hap-Pyun, Neuropsychiatry, Dong-Eui-Bo-Gam, Han Medicine

I. 서 론

『方藥合編』은 1869년 惠菴 黃度淵先生이 완성한 『醫方活套』를 기반으로 『損益本草』을 합하고 ‘用藥綱領’ 및 ‘救急禁忌’ 등의 十數種을 보충하여 1885년에 그 아들 黃必秀가 정리하여 編述한 것이다. 이후 몇 차례에 걸쳐 개정 및 증보판들이 출판되어 국내외로 널리 보급되었다. 여러 가지 증보판 중에 임상가에서 널리 사용되고 있는 남산당의 『對譯證脈 · 方藥合編』은 1887년 黃度淵先生의 首弟子인 美隱 玄公廉先生이 간행한 『新增證脈 · 方藥合編』 上 · 中 · 下統에 1927년 李尙和 先生이 발간한 『辨證方藥合編』의 增補方을 곁들여 발간한 처방집이다.

처방이 수록된 부분인 醫方活套의 目錄은 處方을 上統, 中統, 下統으로 분류하여 上統에는 補劑를, 中統에는 和劑를, 下統에는 攻劑를 수록하고 있다. 이러한 분류는 神農本草經에서 藥物을 上品, 中品, 下品, 三品으로 분류한 것과 비슷한 것으로써 上, 中, 下統으로 處方을 분류한 점은 우리나라에서 최초로 시도된 독창성이 있는 처방분류방법이다.

『方藥合編』은 『東醫寶鑑』 이후 발간된 국내 서적 중 현대에 가장 많이 사용되고 있는 임상서적이다. 또한 『東醫寶鑑』 이후 발간된 국내외 서적의 빈용 처방을 수재하고 있다.

이에 저자는 이 논문을 통해 『方藥合編』 上 · 中 · 下統 및 增補方에 있는 신경정신과 관련 주요 처방의 전사 과정을 고찰하였다. 또한 처방을 證候별로 재분류하여 上 · 中 · 下統에서 나타난 주요 證候의 비율을 살펴 보았다. 이러한 고찰을 바탕으로 『東醫寶鑑』을 비롯한 『方藥合編』의 형성에 영향을 준 서적을 분석하였으며 이를 통해 『方藥合編』의 처방을 보다 잘 이해하고 정확한 임상적 활용을 위한 자료로 사용하고자 한다.

II. 본 론

1. 자료 및 연구방법

1) 주요 연구자료

1990년 남산당에서 출간한 『對譯證脈 · 方藥合編』을 기본자료로 하였다.

2) 연구방법

(1) 『方藥合編』上 · 中 · 下統 및 增補方に 있는 처방 중 主治解説에서 신경정신과 관련 단어의 언급이 있는 모든 처방을 신경정신과 처방으로 선정하였다.

『方藥合編』 上統 原方 123方 附方 32方, 中統 原方 181方 附方 33方, 下統 原方 163方 附方 38方을 합한 原方 467方과 附方 103方的 合計 570方과 雜方 14方 解毒 2方 諸傷 8方을 합한 594方に 增補方 363方을 더한 총 957方 중에서 신경정신과에 관련된 처방의 主治를 方藥合編에서 調査하여 이를 계통별로 분류하여 정리하였다.

(2) 신경정신과 관련 證候 및 용어의 선정은 다음을 참고로 하였다.

- ① 한의신경정신과학¹⁾에 있는 증후편 및 질병편
 - ② 標準疾病死因分類(韓醫)²⁾
- (呆病, 老妄, 健忘, 癡狂, 氣鬱症, 怔忡, 驚悸,

臟燥症, 脫營失精症, 언어장애, 수면장애, 성기능장애, 신경근육계질환, 癲癇, 眩暈, 心身症)

③ 한의진단명과 진단요건의 표준화연구³⁾ (痴呆, 癲證, 狂證, 氣鬱, 氣逆, 心悸, 邪祟, 不眠, 癲癇, 眩暈의 10가지를 다루었다.)
주치가 아니더라도 원인 및 병리가 신경정신과에 해당하면 처방에 포함하였다.

(3) 『方藥合編』에 있는 신경정신과 관련 證候 및 용어 목록은 다음과 같다. 의미가 유사한 용어는 동일 범주에 포함시켰으며 이를 바탕으로 『方藥合編』 신경정신과 관련 처방을 선정하였다(Table I, II).

- ① 鬱(肝鬱, 火鬱, 熱鬱), 氣證(九氣, 痞氣等), 七情, 痰(痰盛, 痰鬱, 五積六聚等)
- ② 驚悸, 怔忡, 健忘, 心悸(心下動悸), 不眠, 不安
- ③ 癲癇狂瘖(擗擗), 神昏譫語(神昏, 譫語, 人事不省), 驚風, 呆病
- ④ 眩暈(眩, 暈)
- ⑤ 遺精(遺精白濁, 白物如精)

Table I. 『方藥合編』上 · 中 · 下統 신경정신과 관련 처방 및 핵심 용어

上統		中統		下統	
37	究原心腎丸 怔忡	14	藿香正氣散 痰厥	3	導痰湯 眩暈
44	仁熟散 心膽虛恐	28	陶氏升陽散火湯 譫語 神昏	10	五苓散 譫語
57	四獸飲 七情聚痰	40	醒心散 怔忡不眠	11	梔豉湯 虛煩不眠
63	秘元煎 遺精 帶濁	64	清心蓮子飲 隨洩白物如精	12	黃連解毒湯 不得眠
66	歸脾湯 憂思, 健忘 怔忡	80	黃連清心飲 精泄	13	桃仁承氣湯 譫語 癲狂
81	滋陰健脾湯 眩暈	81	七氣湯 七情鬱結	16	益元散 狂證
98	加味歸脾湯 怒鬱	82	四七湯 七氣凝結 梅核	38	六鬱湯 鬱火氣鬱痰鬱
100	復元養榮湯 心神恍惚 虛暈	83	分心氣飲 七情痞滯	40	消積正元散 痰飲 氣血鬱結
		84	正氣天香湯 九氣作痛	41	大七氣湯 五積六聚
		86	橘皮一物湯 氣結	53	加味二陳湯 遺精

- 「方藥合編」에 수록된 神經精神科 관련 주요 處方에 대한 研究 -

87	蘇子降氣湯	上氣	54	神保元	諸氣注痛
88	三和散	氣鬱滯	55	追風祛痰丸	風痰發癇
89	交感丹	氣鬱滯	56	清心滾痰丸	癲癇 驚狂
90	蘇合香元	一切氣疾	57	龍腦安神丸	癲癇
91	加味溫膽湯	心膽虛怯 氣鬱	58	當歸承氣湯	陽狂奔走
92	四物安神湯	怔忡 跳動	68	小調中湯	一切痰火
94	溫膽湯	心膽虛怯	69	瓜蒌枳實湯	痰結
112	消風散	頭目昏眩	70	加味四七湯	痰氣鬱結
114	清暈化痰湯	眩暈	71	正傳加味二陳湯	食積及痰
168	小兒清心元	驚熱 煩燥	72	控涎丹	痰飲 流注作痛
175	抱龍丸	驚風	105	芎辛導痰湯	眩暈
176	牛黃抱龍丸	急慢驚風	106	瀉清丸	驚搐
177	紫霜丸	食癇	131	開結舒經湯	婦人七情六鬱
			157	羚羊角湯	子癇

Table II. 「方藥合編」增補方 신경정신과 관련 처방 및 핵심 용어

增補方					
6	三生飲	不省人事 痰壅 氣厥	225	開鬱種玉湯	肝氣鬱結
27	加味逍遙散	肝經鬱火	249	利氣泄火湯	易怒
54	桂枝甘草湯	心下動悸	277	秘旨安神丸	驚
64	三一承氣湯	瘕	278	團蔘散	驚
75	大橘皮湯	虛煩 不安	281	桂枝防風湯	發瘕
76	桂枝紅花湯	譫語	282	桂枝葛根湯	發瘕
95	加減地黃湯	痰壅	283	柴胡防風湯	發瘕
107	火鬱湯	火鬱	284	瓜蒌桂枝湯	發瘕
121	達鬱湯	肝鬱	285	羚羊角散	發瘕
124	救肝開鬱湯	肝鬱	286	附子散	發瘕
126	金鼎湯	怔忡驚悸	287	當歸四逆散	發瘕
127	去癲湯	重陰癲症	288	防風當歸散	發瘕
128	薑附龍骨湯	重陰癲症	294	消風散	癇
129	柴胡犀角湯	熱極發狂	301	安神丸	驚悸
130	化狂湯	重陽狂症	313	開鬱導氣湯	譫語
131	定癇丸	五癇	335	祛風定眩湯	頭痛眩暈
132	却病延壽丹	痰飲頭痛眩暈甚至發癇	339	宣風散	搐搦
148	防眩湯	眩暈	342	金粟丹	搐搦
160	柴胡疎肝散	怒火傷肝	350	三解散	狂燥
211	開鬱止血湯	鬱結	355	逐呆湯	呆症

(4) 특허청 산하 한국전통지식포탈 (<http://www.koreantk.com>)의 데이터베이스에 특허출원이 되거나 관련 논문이 있는 처방을 응용빈도가 높은 것으로 보고 문헌고찰을 수록하였다. 처방의 인용 문헌은 각 처방의 상단부에 표시되어 있는 引用醫書의 약자를 조사하여 신경정신과 관련 처방 중 『東醫寶鑑』에서 인용되고 있는 것은 『東醫寶鑑』 각 편의 내용 중에서 다시 조사하여 인용 빈도수 별로 醫書의 종류와 인용된 醫書의 시대적 배경을 고찰하고자 하였다.

2. 주요 처방 분석

- 上統 44 仁熟散

	내용
方藥合編	治心膽虛 恐畏 不能獨臥 【用法】 或末 溫酒調二錢服 柏子仁 熟地黃 各一錢 人參 枳殼 五味子 桂心 山茱萸 甘菊 白茯苓 枸杞子 各七分半
醫學入門	治膽虛常多畏恐 不能獨臥 頭目不利. 人參 枳殼 五味子 桂心 山茱萸 甘菊花 茯苓 枸杞子 各三分 柏子仁 熟地 各一兩 爲末 每二錢 溫酒調服
해설	『醫學入門』의方が『東醫寶鑑』을 통해 『方藥合編』으로 전사되었다. 전사과정에서 약물 종류는 모두 같으나 용량의 차이가 있다.

- 上統 66 歸脾湯

	내용
方藥合編	治憂思 勞傷心脾 健忘 怔忡 ○ 又治 每觸遺精 【活套】 氣不升降 加便香附 ○ 虛火吐血加 熟地黃五七錢 乾薑炒黑一二錢 ○ 崩帶日久倍參 加地榆荊防升麻之類 不眠加 熟地五七錢 當歸 龍眼肉 酸棗仁(炒) 遠志 人參 黃芪 白朮 白茯苓 各一錢 木香 五分 甘草 三分 姜五片 棗二枚
濟生方	治憂思 過度勞傷心脾 健忘 怔忡 白朮 茯苓去木 黃芪去蘆 龍眼肉 山棗仁炒去殼 各

	一兩人參 木香不見火 各半兩 甘草炙 二錢半 右吹咀每四錢水一盞半生薑五片棗一枚煎至七分去滓溫服不拘時候
해설	『醫學入門』의方が『東醫寶鑑』을 거쳐 『方藥合編』으로 전사되었다. 원출전은 宋代 또는 宋代以前으로 추측된다. 현재까지 전해지는 최초의 서적은 『濟生方』이다. 전사과정 중 『濟生方』에 비해 약물용량이 전체적으로 감량되었다.

- 上統 81 滋陰健脾湯

	내용
方藥合編	治臨事不審眩暈 此心脾虛怯也 此治氣血虛損 有痰飲 作眩之仙劑 【活套】 氣虛 倍參三五錢 ○ 頭風加 天麻 防風 荊芥 ○ 自汗加 桂枝 黃芪 白朮 一錢半 陳皮(鹽水洗去白) 半夏 白茯苓 各一錢 當歸 白芍藥 生乾地黃 各七分 白茯苓 麥門冬 遠志 各五分 川芎 甘草 各三分 姜三片 棗二枚
萬病回春	此治氣血虛損, 有痰作眩暈之仙劑也. 當歸酒洗 一錢 川芎 五分 白芍 生地黃酒洗 八分 人參 七分 白朮 一錢五分 白茯苓去皮 一錢 陳皮鹽水洗 去白 一錢 半夏薑製 白茯苓去皮木 麥門冬去心 遠志去心 各七分 甘草炙 四分 右銜一劑 薑棗水煎 早晚服
해설	『萬病回春』의方が『東醫寶鑑』을 통해 『方藥合編』으로 전사되었다. 전사과정에서 약물 종류는 모두 같으나 용량의 차이가 있다.

- 上統 98 加味歸脾湯

	내용
方藥合編	治肝脾怒鬱 月經不通 【活套】 加便香附 尤妙 歸脾湯(當歸 龍眼肉 酸棗仁 人參 黃芪 白朮 白茯苓 遠志 木香 甘草)加 山梔 柴胡 各一錢
東醫寶鑑	治肝脾怒鬱 月經不通 歸脾湯 加 柴胡 山梔仁 各一錢 右挫 水煎服之[良方]
해설	『婦人大全良方』을 인용한 『東醫寶鑑』을 전사되었다. 그러나 현재 전해지는 『婦人大全良方』에서는 이方が 전해지지 않으며 『校註婦人良方大全』에서만方が 전해진다. 活套의 내용은 『醫方活套』의 내용이 그대로 첨가된 것이다.

- 中統 14 藿香正氣散

	내용
方藥合編	<p>治傷寒陰症 與身痛 不分表裏 以此導引經絡 不致變動</p> <p>【活套】 加南星木香 名[星香正氣散] 凡中氣中風痰厥食厥并先用此一二貼以 正其氣後隨症治之</p> <p>○ 茯苓厚朴陳皮半夏 并作一錢 甚妙 ○ 暑加香薷二錢 白扁豆一錢 名[茹霍湯] ○ 食傷挾滯加 山查肉 神麩 檳榔 枳實 砂仁 ○ 外感加 乾葛 便香附 羌活 頭痛加 川芎 肢節痛加 木瓜 惡寒加 桂枝 ○ 子懸及臨產加 砂仁 亦好 ○ 浮腫合[四苓散]名[藿苓湯] 氣喘加 蘇梗 亦可</p> <p>藿香 一錢半 蘇葉 一錢 白芷 大腹皮 白茯苓 厚朴 白朮 陳皮 半夏(製) 桔梗 甘草(炙) 各五分 姜三片 棗二枚</p>
和劑局方	<p>治外感風寒 內傷濕滯 惡寒發熱 頭痛 胸膈滿悶 腹痛嘔吐 腸鳴泄瀉 口淡 舌苔白膩方 大腹皮 白芷 紫蘇 茯苓各一兩 半夏麩 白朮 陳皮 厚朴(去皮 薑汁炙) 桔梗各二兩 藿香二兩 炙甘草二兩半 爲細末 每服二錢 加生薑三片 大棗一枚 水煎服</p>
해설	<p>『和劑局方』의 方이 『古今醫鑑』 『東醫寶鑑』을 통해 『方藥合編』으로 전사되었다. 전사 과정에서 약물 종류와 용량의 차이가 있다.</p>

- 中統 64 清心蓮子飲

	내용
方藥合編	<p>治心火上炎 口乾 煩渴 小便赤澀 ○ 又治隨瀉白物如精 宜降心火 ○ 亦治赤白濁 ○ 此治不能食 而渴</p> <p>【活套】 能食 而渴[人參白朮湯](下統7)</p> <p>蓮子 人參 黃芪 赤茯苓 各一錢 黃芩 車前子 麥門冬 地骨皮 甘草 各七分</p>
和劑局方	<p>治心中蓄積 抑鬱煩燥 思慮勞力 小便白濁 遺精澀瀝 便赤如血 或上盛下虛 心火炎上 肺金受克 口舌乾燥 漸成消渴 睡臥不安 四肢倦怠 五淋帶下 及病後氣不收斂 陽浮于外 五心煩熱方 黃芩 麥門冬 地骨皮 車前子 炙甘草各五錢 石蓮肉 茯苓 炙黃芪 人參各七錢五分 爲粗末 每服三錢 加麥門冬 十粒 水煎 食前冷服</p>
해설	<p>『和劑局方』의 方이 『東醫寶鑑』을 통해 『方藥合編』으로 전사되었다. 전사 과정에서 약물 종류와 용량의 차이가 있다.</p>

- 中統 80 黃連清心飲

	내용
方藥合編	<p>治君火動 相火隨之 而精泄</p> <p>黃連 生地黃 當歸 甘草 白茯苓 酸棗仁(炒) 遠志 人參 蓮肉 各等分</p>
醫學入門	<p>治心有所慕而遺者</p> <p>黃連 生地黃 當歸 甘草 茯苓 酸棗仁 遠志 川楝子 蓮子肉 水煎服</p>
해설	<p>『醫學入門』의 方이 『東醫寶鑑』을 통해 『濟衆新編』 『方藥合編』으로 전사되었다.</p>

- 中統 81 七氣湯

	내용
方藥合編	<p>治七情鬱結 心腹絞痛</p> <p>半夏 三錢 人參 官桂 甘草(炙) 各七分 姜五片</p>
備急千金要方	<p>治虛冷上逆 勞氣等方 半夏一升 人參 炙甘草 肉桂 生薑各一兩 爲粗末 水煎服</p>
해설	<p>『備急千金要方』의 方이 『和劑局方』을 통해 『東醫寶鑑』을 거쳐 『方藥合編』으로 전사되었다.</p>

- 中統 82 四七湯

	내용
方藥合編	<p>治七氣凝結 狀如破絮 或如梅核 嚥不出 嚥不下 胸痞</p> <p>半夏 二錢 赤茯苓 一錢六分 厚朴 一錢二分 蘇葉 八分 姜七片 棗二枚</p>
和劑局方	<p>治喜怒哀思憂恐驚之氣 結成痰涎 狀如破絮 或如梅核 在咽喉之間 咯不出 咽不下 此七氣所爲也. 或中脘痞滿 氣不舒快 或痰涎壅盛 上氣喘急 或因痰飲中結 嘔逆惡心 並宜服之. 出《易簡方》</p> <p>半夏五兩 茯苓四兩 紫蘇葉二兩 厚朴三兩 爲粗末 每服四錢 加生薑七片 大棗一枚 水煎服</p>
해설	<p>『和劑局方』의 方이 『東醫寶鑑』을 통해 『濟衆新編』 『方藥合編』으로 전사되었다.</p>

- 中統 83 分心氣飲

	내용
方藥合編	治七情痞滯 通利大小便 清而疎快 蘇葉 一錢二分 甘草(炙) 七分 半夏 枳殼 各六分 青皮 陳皮 木通 桑白皮 木香 赤茯苓 檳榔 蓬朮 麥 門冬 桔梗 桂皮 香附子 藿香 各五分 姜三片 棗二枚 燈心十莖
和劑局方	治男子 婦人一切氣不和, 多因憂愁思慮, 怒氣傷 神, 或臨食憂戚, 或事不隨意, 使鬱抑之氣留滯不 散, 停於胸膈之間, 不能流暢, 致心胸痞悶, 脅肋虛 脹, 噎塞不通, 噯氣吞酸, 嘔噦惡心, 頭目昏眩, 四 肢倦怠, 面色萎黃, 口苦舌幹, 飲食減少, 日漸羸瘦, 或大腸虛秘, 或因病之後, 胸膈虛痞, 不思飲食, 並 皆治之 木香 炒桑白皮 炮大腹子 炒桔梗 麥門冬(去心) 草 果仁 炙大腹皮 厚朴(去粗皮 薑汁制) 白朮 人參各 半兩 丁香皮 炙甘草 各一兩 炒香附 紫蘇葉 陳皮 (去白) 藿香各一兩半 爲粗末 每服二錢 加生薑三片 大棗一枚 燈心十莖 水煎服 治同上證方 木通(去節) 白芍藥 赤茯苓 肉桂(去粗 皮) 半夏(湯洗) 炒桑白皮 大腹皮 陳皮(去瓢) 青皮 (去白) 炙甘草 羌活各一兩 蘇葉四兩 爲粗末 每服 三錢 加生薑三片 大棗二枚 燈心五莖 水煎服
해설	『和劑局方』의 方이 『東醫寶鑑』을 통해 『濟 衆新編』, 『方藥合編』으로 전사되었다.

- 中統 87 蘇子降氣湯

	내용
方藥合編	治上氣喘促 【活套】 氣虛加 人參 三五錢 麥門冬二錢 五味子 一錢 ○ 陰虛加 熟地黃五七錢 半夏麩 蘇子 各一錢 官桂 陳皮(去白) 各七分半 當歸 前胡 厚朴 甘草(炙) 各五分 蘇五片 姜三片 棗 二枚
和劑局方	治痰涎壅盛 咳喘氣短 胸膈滿悶 咽喉不利等症方 蘇子 半夏(湯洗)各二兩半 肉桂 當歸 各一兩半 炙 甘草二兩 前胡 厚朴(姜汁炒)各一兩 爲粗末 加生薑 二片 大棗一枚 紫蘇五葉 每服二錢 水煎 去渣熱服
해설	『和劑局方』의 方이 『東醫寶鑑』을 통해 『濟 衆新編』, 『方藥合編』으로 전사되었다.

- 中統 88 三和散

	내용
方藥合編	治諸氣鬱滯 或脹 或痛 川芎 一錢 沈香 蘇葉 大腹皮 羌活 木瓜 各五分 木香 白朮 檳榔 陳皮 甘草(炙) 各三分
和劑局方	治五臟不調 三焦不和 心腹痞悶 脇肋脹 風氣壅滯 肢節煩痛 頭面虛浮 手足微腫 腸胃燥澀 大便秘難 雖年高氣弱 並可服之 又治背痛 脅痛 有妨飲食 及 穀氣上攻 胸腹滿悶 大便不通 羌活 紫蘇 沈香 木瓜 大腹皮各一兩 川芎 炒甘草 橘皮 木香 煨檳榔 白朮各三分 爲粗末 每服二大錢 水煎服
해설	『和劑局方』의 方이 『醫學入門』을 통해 『東 醫寶鑑』, 『方藥合編』으로 전사되었다.

- 中統 89 交感丹

	내용
方藥合編	治諸氣鬱滯 能水火升降 ○ 加香附子 茯神 甘草 各 一錢 名[降氣湯] 【用法】 左末 蜜丸彈子大 每一丸 以降氣湯嚼下 香附子 一斤 茯神 四兩
萬病回春	治一切諸氣 公私拂情 名利失志 抑鬱煩惱 七情所 傷 不思飲食 面黃形羸 胸膈諸症極有神效 香附米(一斤 長流水浸三日 撈起炒幹 忌鐵器) 白茯 苓(去皮木 爲淨末 四兩) 上二味爲 末攪勻 煉蜜爲 丸 如彈子大 每清晨細嚼一丸 白滾湯送下 或陳皮 湯亦可 抑氣湯尤妙
해설	『萬病回春』의 方이 『東醫寶鑑』을 통해 『方 藥合編』으로 전사되었다.

- 中統 90 蘇合香元

	내용
方藥合編	治一切氣疾 【用法】 左末 用安息香膏 并煉蜜和丸 每一兩作 四十丸 每二三丸 井水或溫水溫酒薑湯化服 ○ 有 龍腦 名[龍腦蘇合元] 無龍腦 名[麝香蘇合元] ○ 安息香乾則 不必作膏 白朮 木香 沈香 麝香 丁香皮 安息香 白檀香 朱砂

- 『方藥合編』에 수록된 神經精神科 관련 주요 處方에 대한 研究 -

	(半爲衣) 犀角 訶子皮 香附子 藜撥 各二兩 蘇合油 入安息香膏內 乳香 龍腦 各一兩
和劑局方	療傳屍骨蒸 癘瘵肺痿 疰竹鬼氣卒心痛 霍亂吐利 時氣鬼魅瘴癘 赤白暴利 瘀血月閉 癩癬疔腫癰瘤 鬼忤中人 小兒吐乳 大人狐狸等病 白朮 青木香 犀角 炒香附 朱砂(研 水飛)煨訶子 檀 香 安息香(爲末 用無灰酒一升熬膏) 沈香 麝香(研) 丁香 藜撥各二兩 冰片 薰陸香(研細) 蘇合香油(入 安息香膏內)各一兩 爲細末 煉蜜和丸 梧桐子大 每 服四丸(老人 小兒每服一丸)空腹井水或溫酒化服
해설	『和劑局方』의 方이 『東醫寶鑑』을 통해 『方藥合編』으로 전사되었다.

- 中統 91 加味溫膽湯

	내용
方藥合編	治心膽虛怯 觸事易驚 【活套】 氣鬱加 蘇葉 ○ 不眠加 當歸 酸棗仁 香附子 二錢四分 橘紅 一錢二分 半夏 枳實 竹茹 各 八分 人參 白茯苓 柴胡 麥門冬 桔梗 各六分 甘草 四分 姜三片 棗二枚
東醫寶鑑	治 心膽虛怯 觸事易驚 涎與氣搏變生諸證. 香附子二錢四分 橘紅一錢二分 半夏 竹茹 枳實各八 分 人參 白茯苓 柴胡 麥門冬 桔梗各六分 甘草四分 右剉作一貼 生薑三片 大棗二枚 水煎服 入門 名 參胡溫膽湯.
해설	『東醫寶鑑』이전의 출전을 알 수 없으며 이후 『方藥合編』으로 전사되었다.

- 中統 92 四物安神湯

	내용
方藥合編	治心中無血 如魚無水 怔忡 跳動 當歸 白芍藥 生地黃 熟地黃 人參 白朮 白茯苓 酸棗 仁(炒) 黃連(炒) 梔子(炒) 麥門冬 竹茹 各七分 棗二枚 米炒一撮 梅一枚 辰砂五分調服
萬病回春	治心中無血養 故作怔忡 兼服辰砂安神丸 當歸(酒洗) 白芍(酒炒) 生地黃(酒洗) 熟地黃 人參

	(去蘆) 白術(去蘆)茯神(去皮木) 酸棗仁(炒) 黃連 (姜炒) 梔子(炒) 麥門冬(去心) 竹茹 辰砂(研末,臨服 調入) 烏梅(一個)上銑一劑 棗二枚 炒米一撮 水煎食 遠服
해설	『萬病回春』의 方이 『東醫寶鑑』을 통해 『方藥合編』으로 전사되었다.

- 中統 94 溫膽湯

	내용
方藥合編	治心膽虛怯 夢寐不祥 虛煩不眠 【活套】 血虛合[歸脾湯](上統)六十六 半夏 陳皮 白茯苓 枳實 各二錢 竹茹 一錢 甘草 五分 姜五片 棗二枚
備急千金要方	治大病後虛煩得眠 此膽寒故也 半夏 竹茹 枳實各二 兩 橘皮三兩 生薑四兩 甘草一兩 爲粗末 水煎 分三 次服
해설	『備急千金要方』의 方이 『東醫寶鑑』을 통해 『方藥合編』으로 전사되었다.

- 中統 112 消風散

	내용
方藥合編	治諸風上攻 頭目昏眩 鼻塞耳鳴 麻痺 及婦人血風 頭痒 【活套】 眼赤 腫痛 生翳 合[四物湯](上統六十七) 代入沙參 加杞菊 青箱子 木賊之類 ○ 頭風加 天麻 藜蘆 ○ 耳痛加 蔓荊子 菖蒲 細辛 【用法】 或末 每二錢 茶清下 荊芥 甘草 各一錢 人參 白茯苓 白僵蠶 川芎 防風 藿香 蟬退 羌活 各 五分 陳皮 厚朴 各三分 細茶一撮
和劑局方	治諸風上攻 頭目昏眩 項背拘急 肢體煩疼肌肉蠕目 眩旋運耳鳴蟬鳴眼溢好睡鼻塞多嚏皮膚頑麻癢痒 又治婦人血風頭皮腫痒眉稜骨痛旋運欲到痰逆惡 心 白茯苓去皮 芎藭 羌活去蘆 人參去蘆 荊芥穗 防風 去蘆 藿香葉 蟬退去土微炒 白僵蠶炒去絲 甘草剉 炒 各二兩 厚朴去皮薑汁炙 陳皮去白焙 各半兩 右 爲細末每服二錢茶清調下
해설	『醫學入門』의 方이 『東醫寶鑑』을 통해 『方藥合編』으로 바로 전사되었다. 원출전은 『和劑局方』이다. 전사과정 중 약물 용량의 차이가 발생하였다.

- 中統 114 清暈化痰湯

	내용
方藥合編	治風火痰 眩暈 【用法】 或末 薑糊丸 亦可 陳皮 半夏 白茯苓 各一錢 枳實 白朮 各七分 川芎 黃芩 白芷 羌活 人參 南星(炮) 防風 各五分 細辛 黃連 甘草 各三分 姜三片
古今醫鑑	橘紅 一錢五分 半夏制 一錢半 白茯苓一錢 甘草三分 川芎八分 白芷七分 羌活七分 枳實麩炒一錢 南星制 六分 防風六分 細辛六分 黃芩酒炒八分 氣虛加人參 七分 白朮一錢 有熱加黃連六分 血虛培川芎可當歸 一錢五分 上挫一劑 生薑三片 水煎 以此作丸亦可
해설	『古今醫鑑』의 方이 『東醫寶鑑』을 통해 『方藥合編』으로 바로 전사되었다. 전사과정 중 약물 용량의 차이가 발생하였다.

- 中統 175 抱龍丸

	내용
方藥合編	治驚風 潮搐 身熱 昏睡 能下痰熱 乃心肺肝藥也 ○ 內局去天竺黃 以鈞鉤藤 代用 【用法】 左末 煮 甘草膏丸 如皂子 溫水化下 百日內 一丸作三次服 五歲兒 一二丸服 臘雪水煮 甘草 尤佳 牛膽南星 一兩 天竺黃 五錢 石雄黃 朱砂 各二錢半 麝香 一錢
小兒藥證直訣	治傷風瘟疫 身熱昏睡 氣粗 風熱痰塞壅嗽 驚風潮搐 及蠱毒中暑 沐浴後並可服,壯實小兒宜時與服之. 天竺黃(一兩), 雄黃(水飛一錢), 辰砂, 麝香(各別研半兩) 天南星(四 兩臘月釀牛膽中陰乾百日如無只將生者去皮臍 炒乾 用)右爲細末 煮甘草水與圓皂子大 溫水化下服之 百 日小兒 每圓分作三四服 五錢一二圓 大人三五圓 亦 治室女白帶 伏暑用鹽少許 嚼一二圓 新水送下
해설	『小兒藥證直訣』의 方이 『東醫寶鑑』을 거쳐 『方藥合編』으로 바로 전사되었다. 전사과정 중 약물 용량의 변화가 있다.

- 中統 176 牛黃抱龍丸

	내용
方藥合編	治急慢驚風 痰嗽 潮搐 【用法】 丸法同上 金箔爲衣 去天竺黃 代以鈞鉤

	藤 與上同 ○ 薄荷湯化下 抱龍丸(中統 175)加 珍珠 琥珀 各一錢 牛黃 五分 金箔 十片
古今醫鑑	治小兒急慢驚風 痰嗽潮搐 及傷風溫疫 身熱昏睡 氣粗風熱痰實 壅嗽喘急 一切發熱 并宜腹之 并痘 疹首尾可服 此藥能鎮驚安神 寧心定智 除諸熱 住 痰涎 止嗽定喘 壯實小兒 宜時少與服之 則免痰熱 驚風之證 神效無比 南星爲末 臘月納牛膽中陰乾 百日取研 一兩 天竺 黃五錢 雄黃二錢半 辰砂二錢半 麝香一錢 珍珠一 錢 琥珀一兩 牛黃五分 金箔十片爲衣 上爲細末 水煮甘草膏和爲丸 如災實大 金箔爲衣 每三歲兒服一丸 五歲兒服二丸 十歲兒服三五丸 滾 水得溫磨化服 驚風薄荷湯磨化下
해설	『古今醫鑑』의 方이 『醫學入門』, 『東醫寶鑑』을 거쳐 『方藥合編』으로 전사되었다. 전사과정 중 약물 용량의 변화는 없다.

- 下統 3 導痰湯

	내용
方藥合編	治中風 痰盛 語澁 眩暈 ○ 加 黃芩 黃連 名[清熱導 痰湯] ○ 加 羌活 白朮 名[祛風導痰湯] ○ 加 遠志 菖蒲 黃芩 朱砂 名[寧神導痰湯] ○ 加 人蔘 菖蒲 竹茹 各五分 名[滌痰湯] 【活套】 氣虛加 白朮 全蝎 白附子 培入人蔘 名 [導痰君子湯] 半夏 二錢 南星(炮) 橘皮 枳殼 赤茯苓 甘草 各一錢 姜五片
世醫得效方	一切痰頭目旋暈 或痰飲有積不散 胸膈痞塞 脇肋脹 滿 頭痛吐逆 喘急痰嗽 涕唾稠粘 坐臥不安 可思飲 食 半夏洗七次四兩 天南星炮去皮 橘皮 枳實去穢麩炒 赤茯苓去皮各一兩 甘草炙半兩 上剉散 每服四錢 水二盞 生薑十片 煎八分 食後溫服
해설	『世醫得效方』의 方이 『醫學入門』, 『東醫寶鑑』을 거쳐 『方藥合編』으로 전사되었다. 전사과정 중 약물 용량에 변화가 있다.

- 下統 10 五苓散

	내용
方藥合編	治太陽入裏 煩渴 小便不利 ○ 去桂加人蔘 名[春澤 湯] 治暑熱 煩渴 ○ 腳氣加 蒼朮 陳皮 ○ 濕瀉加 羌活 蒼朮 ○ 加辰砂五分 名[辰砂五苓散] 治傷寒 發熱 譫語 及產後虛煩 ○ 去桂 名[四苓散] 治火泄 【活套】 合 [四君子湯] 名[君苓湯] 治陰虛浮腫

- 『方藥合編』에 수록된 神經精神科 관련 주요 處方에 대한 研究 -

	○ 暑熱加 香薷 白扁豆 陳皮 白檀香 烏梅之類 ○ 濕瀉 合[平胃散] 名[胃苓湯] 或稱[平苓散] 【用法】 左末每二錢 白湯下或作一貼煎服 澤瀉 二錢半 赤茯苓 白朮 猪苓 各一錢半 肉桂 五分
傷寒論	治太陽病 發汗後 汗出脈浮 小便不利 微熱消渴 中風發熱 六七日不解而煩 有表裏症 渴欲飲水 水入即吐之水逆證方 猪苓(去皮) 白朮 茯苓各十八銖 澤瀉一兩六銖 桂枝(去皮)半兩 爲末 每服一方寸匕 白開水衝服 日三次 多飲暖水 汗出愈
해설	『傷寒論』의 方이 『醫學入門』 『東醫寶鑑』을 거쳐 『方藥合編』으로 전사되었다. 전사과정 중 藥물 용량에 변화가 있다.

- 下統 12 黃連解毒湯

	내용
方藥合編	治傷寒 大熱 虛煩 不得眠 差後飲酒 及一切熱毒 ○ 腸風 脈洪大 合[四物湯] 【活套】 癰疹 丹毒 內外實熱 合[升麻葛根湯]加玄參 荊防蟬退之類 黃連 黃芩 黃柏 梔子 各一錢二分半
外臺秘要	引崔氏治三焦熱盛 大熱煩狂 口燥咽乾 錯語不眠 或吐衄發斑 癰腫疔毒 舌紅苔黃 脈數有力方 黃連 三兩 黃柏 黃芩 各二兩 梔子 十四枚 水煎 分二次服
해설	『外臺秘要』의 方이 『東醫寶鑑』을 거쳐 『方藥合編』으로 전사되었다. 전사과정 중 藥물 용량에 변화가 있다.

- 下統 13 桃仁承氣湯

	내용
方藥合編	治血結膀胱 小腹結急 便黑 譫語 【用法】 水煎後 入芒硝溫服 【活套】 熱結腸胃 便秘 檳榔 郁李仁末 調服 ○ 癲狂實熱 青礞石 調服 大黃 三錢 桂心 芒硝 各二錢 甘草 一錢 桃仁(留尖) 十枚
傷寒論	太陽病不解 熱結膀胱 其人如狂 血自下 下者愈 其外不解者 尚未可攻 當先解其外 外解已 但小腹急結者 乃可攻之 宜桃核承氣湯 桃仁五十箇去皮尖 大黃四兩 桂枝二兩去皮 甘草二兩炙 芒硝二兩

해설	『傷寒論』의 方이 『丹溪心法』 『東醫寶鑑』을 거쳐 『方藥合編』으로 전사되었다. 전사과정 중 藥물 용량에 변화가 있다.
----	---

- 下統 40 消積正元散

	내용
方藥合編	治痰飲 氣血鬱結 食積 氣不升降 ○ 一名[開鬱正元散]無枳實 有桔梗 白朮 一錢半 神麩 香附子 枳實 玄胡索 海粉 各一錢 赤茯苓 陳皮 青皮 砂仁 麥芽 山楂肉 甘草 各七分 姜三片
醫學入門	治積聚方 白朮一錢 茯苓 陳皮 青皮 砂仁 麥芽 山楂 甘草 各三分 神麩 香附 枳實 延胡索 海蛤粉各五分 加生薑 水煎服
해설	『醫學入門』의 方이 『東醫寶鑑』을 거쳐 『方藥合編』으로 전사되었다. 전사과정 중 藥물 용량에 변화가 있다.

- 下統 41 大七氣湯

	내용
方藥合編	治五積六聚 心腹疼痛 二便不利 三稜 蓬朮 青皮 陳皮 桔梗 藿香 益智仁 香附子 官桂 甘草 各一錢 姜三片 棗二枚
醫學入門	稜莪真橘藿梗桂益智仁甘青香附煎白水一切氣積白舒伸 三稜 莪朮 青皮 陳皮 藿香 桔梗 官桂 益智仁 各一錢 甘草 七分半 香附一錢半 姜棗煎服 治七情相干陰陽不得升降氣道壅滯攻衝作疼一方無三稜有半夏麩
해설	『醫學入門』의 方이 『東醫寶鑑』을 거쳐 『方藥合編』으로 전사되었다.

- 下統 53 加味二陳湯

	내용
方藥合編	治濕痰滲爲遺精 半夏(薑製) 赤茯苓(鹽水炒) 梔子(炒黑) 各一錢半 陳皮 白朮 桔梗 升麻(酒炒) 柴胡(酒炒) 甘草 各一錢 石菖蒲 七分 知母 黃柏 各三分 姜三片

古今醫鑑	治遺精 陳皮一錢 半夏一錢半姜泡 茯苓一錢半 鹽水炒 白朮一錢 桔梗一錢 石菖蒲七分 黃柏二分 知母三分 梔子炒黑一錢半 升麻一錢酒炒 柴胡一錢酒炒 甘草一錢 上銼一劑 生薑煎服
해설	『古今醫鑑』의 方이 『東醫寶鑑』을 거쳐 『方藥合編』으로 전사되었다.

- 下統 58 當歸承氣湯

	내용
方藥合編	治陽狂奔走 當歸 大黃 各三錢半 芒硝 二錢半 甘草 一錢 姜五片 棗十枚
素問病機氣宜保命集	當歸 大黃各一兩 甘草 半兩 芒硝九錢 上剉如麻頭大 每服二兩 水一大碗 入生薑五片 棗十枚 同煎至半碗 去滓熱服
해설	『素問病機氣宜保命集』의 方이 『東醫寶鑑』을 거쳐 『方藥合編』으로 전사되었다.

- 下統 69 瓜蒌枳實湯

	내용
方藥合編	治痰結 胸滿 氣急 瓜蒌仁 枳實 桔梗 赤茯苓 貝母 陳皮 片苓 梔子 各一錢 當歸 六分 縮砂 木香 各五分 甘草 三分 竹瀝五匙 薑汁半匙調服
萬病回春	治痰結 咯吐不出 胸膈作痛 不能轉側 或痰結胸滿 悶作寒熱氣急 并痰迷心竅不能言語者 并皆治之 瓜蒌去殼 枳實麩炒 桔梗去蘆 茯苓去皮 貝母去心 陳皮 片苓去朽 山梔各一錢 當歸六分 砂仁 木香各五分 甘草三分 右銼一劑 生薑煎 入竹瀝 薑汁少許 同腹 痰迷心竅不能言語 加石菖蒲 去木香 氣喘 加桑白皮 蘇子 外用薑渣揉撮痛處
해설	『萬病回春』의 方이 『東醫寶鑑』을 거쳐 『方藥合編』으로 전사되었다.

- 下統 70 加味四七湯

	내용
方藥合編	治痰氣鬱結 窒碍咽喉之間 咯之不出 嚥之不下 調之梅核氣 半夏 陳皮 赤茯苓 各一錢 神麩 枳實 南星(炮) 各七分 青皮 厚朴 蘇葉 檳榔 縮砂 各五分 白豆寇 益智仁 各三分 姜五片
世醫得效方	治心氣鬱滯 豁痰散驚 半夏製二兩半 茯苓 厚朴 各兩半 薑汁炒 茯神 紫蘇葉各一兩 遠志 薑汁炒溫取 肉焙乾 甘草炙各半兩 右挫散 每服四錢 薑七片 石菖蒲半寸 棗二枚煎服
해설	『世醫得效方』의 方이 『古今醫鑑』 『東醫寶鑑』을 거쳐 『方藥合編』으로 전사되었다.

- 下統 71 正傳加味二陳湯

	내용
方藥合編	治食積及痰 補脾 消食 行氣 山查肉 一錢半 香附子 半夏 各一錢 川芎 白朮 蒼朮 各八分 橘紅 白茯苓 神麩(炒) 各七分 砂仁 麥芽(炒) 各五分 甘草(炙) 三分
醫學正傳	導痰補脾 消食行氣 橘皮 茯苓各七分 半夏湯泡洗一錢 甘草炙三分 川芎 蒼朮 白朮各八分 山查肉一錢五分 砂仁五分 神麩炒七分 香附子一錢 麥麩面炒五分 上件 除神麩 麥麩面細研炒另包 餘細切 作一服 加生薑三片 大棗一枚 水二盞 煎至一盞 調神麩 麥麩 入內服
해설	『醫學正傳』의 方이 『東醫寶鑑』을 거쳐 『方藥合編』으로 전사되었다.

- 下統 106 瀉清丸

	내용
方藥合編	治肝實 ○ 痘毒 驚搐 心肝熱瀉 肝風自去[瀉青丸] 利小便 熱不炎[導赤散](下統七十八) ○ 痘後餘毒 入眼生翳大效 每一二丸 以竹葉煎湯化 砂糖調下 【用法】 左末 蜜丸 芡實大

	【活套】 少陽風癰 三五丸 薑茶化下 神效 ○ 春傷風 至夏暴瀉 三五丸 薑本煎湯化下 當歸 草龍膽 川芎 梔子 大黃 羌活 防風 各等分
丹溪心法	治中風自汗 昏冒 發熱不惡寒 不能安臥 此是風熱煩燥之故也 當歸 川芎 梔子 羌活 大黃 防風 草龍膽 等分 上末 蜜丸彈子大 每服一丸 竹葉湯化下
해설	『丹溪心法』의 方이 『東醫寶鑑』을 거쳐 『方藥合編』으로 전사되었다.

- 下統 131 開結舒經湯

	내용
方藥合編	治婦人七情六鬱 氣滯經絡 手足麻木 【活套】 手足痺痛加 威靈仙 牛膝 木瓜 少加附子 【用法】 入竹瀝 薑汁 調服 蘇葉 陳皮 香附子 烏藥 川芎 蒼朮 羌活 南星 半夏 當歸 各八分 桂枝 甘草 各四分 姜三片
古今醫鑑	治七情六鬱 氣滯經絡 手足麻痺 紫蘇 八分 陳皮 八分 香附醋炒 八分 烏藥 八分 川芎 八分 蒼朮米泔浸三日銼碎炒 八分 羌活 八分 南星 八分 八分制 半夏 八分制 當歸 八分 桂枝 四分 甘草 四分
해설	『古今醫鑑』의 方이 『東醫寶鑑』을 통해 『方藥合編』으로 전사되었다. 龔廷賢의 創方으로 추정된다.

- 下統 157 羚羊角湯

	내용
方藥合編	治子癇 羚羊角 獨活 酸棗仁(炒) 五加皮 各一錢二分 防風 薏苡仁 當歸 川芎 白茯苓 杏仁 各七分 木香 甘草 各五分 姜三片
婦人大全良方	治血風, 身體疼痛, 手足無力, 心神壅悶. 羚羊角屑 酸棗仁(炒) 生乾地黃 檳榔(各一兩) 五加皮 防風 赤芍藥 當歸 骨碎補(炒, 去毛) 海桐皮 川芎(各三分) 甘草(半兩) 上為末. 每服二錢, 溫酒調下.
해설	『婦人大全良方』의 方이 『東醫寶鑑』을 통해 『方藥合編』으로 전사되었다. 龔廷賢의 創方으로 추정된다.

- 增補方 27 加味逍遙散

	내용
方藥合編	治肝經鬱火 胸脇脹痛 或作寒熱甚 至生風 眩暈振搖 咬牙發癎 目斜 水搐 又或怒動 肝氣不和 木鬱達之 是也 柴胡 甘草 白茯苓 白朮 當歸 白芍藥 牡丹皮 山梔子(炒黑) 各一兩 薄荷 五分
和劑局方	治血虛勞倦 五心煩熱 肢體疼痛 頭目昏重 心忪 頰赤 口燥咽幹 發熱盜汗 減食嗜臥 及血熱相搏 月水不調 臍腹脹痛 寒熱如瘧. 又瘵女血弱陰虛, 榮衛不和, 痰嗽潮熱, 肌體羸瘦, 漸成骨蒸. 甘草微炙赤, 半兩 當歸去苗銼微炒 茯苓去皮白者 芍藥白 白朮 柴胡去苗各一兩 上為粗末. 每服二錢水一大盞 燒生薑一塊切破 薄荷少許 同煎至七分去渣熱服 不拘時候.
해설	『和劑局方』의 方이 『方藥合編』으로 전사되었다.

- 增補方 160 柴胡疎肝散

	내용
方藥合編	治怒火傷肝 左脇作痛 【用法】 水煎服 唇焦口渴乍痛乍止 加山梔 黃芩 肝經一條扛起者 加麥芽 青皮 山查 痛有定處而不移 日輕夜重 血也 加當歸 南星 紅花 桃仁 牡丹皮 乾嘔 咳引 脇下痛 停飲 加半夏 白茯苓 喜熱畏寒 欲得熱手重按 加肉桂 吳茱萸 柴胡 陳皮 各一錢二分 川芎 赤芍 枳殼 香附子(醋炒) 各一錢 甘草 五分
景岳全書	治脇肋疼痛, 寒熱往來. 陳皮 醋炒 柴胡 各二錢 川芎 枳殼 麩炒 芍藥 各一錢半 甘草 炙, 五分 香附 一錢半 水一鍾半, 煎八分. 食前服.
해설	『景岳全書』의 方이 『方藥合編』으로 전사되었다.

- 增補方 294 消風散

	내용
方藥合編	治諸癩 【用法】 為末 煉蜜丸兩作十丸 每日一丸 薄荷 蘇葉煎湯化服 薄荷 羌活 防風 獨活 天麻 荊芥 川芎 細辛 各一錢 膽南星 二錢

和劑局方	治諸風上攻,頭目昏痛,項背拘急,肢體煩疼,肌肉蠕動,目眩旋暈,耳鳴蟬鳴,眼澀好睡,鼻塞多嚏,皮膚頑麻,癢癢癢疹. 又治婦人血風,頭皮腫癢,眉棱骨痛,旋暈欲倒,痰逆惡心. 荊芥穗 甘草(炒) 芎藭 羌活 白僵蠶(炒) 防風(去蘆) 茯苓(去皮用白底) 蟬殼(去土,微炒) 藿香葉(去梗) 人參(去蘆)各二兩 厚樸(去粗皮,薑汁塗,炙熟) 陳皮(去瓢,洗,焙,各半兩) 上爲細末,每服二錢,茶清調下. 如久病偏風,每日三服,便覺輕減. 如脫著沐浴,暴感風寒,頭痛身重,寒熱倦疼,用荊芥茶清調下,溫酒調下亦得,可並服之. 小兒虛風,目澀昏困,及急 慢驚風,用乳香荊芥湯調下半錢,並不計時候.
해설	『和劑局方』의 方이 『方藥合編』으로 전사되었다.

- 增補方 301 安神丸

	내용
方藥合編	治心神虛 驚悸 夜啼 【用法】左爲細末 煉蜜丸 實大 每一丸 燈心湯下 人參 白茯苓 麥冬 山藥 龍齒 各二錢 鏡面草 寒水石 甘草 各五分 龍腦 一分 金箔 十片
萬病回春	治癩病,常服. 當歸(酒洗) 人參(去蘆) 茯苓(去皮) 酸棗仁(炒) 生地黃(酒洗) 黃連(酒炒) 陳皮(去白) 南星(姜制,各一兩) 天竺黃(五錢) 牛黃(二錢) 珍珠(二錢) 琥珀(二錢) 朱砂(五錢,爲(爲)衣)上爲(爲)極細末,煉蜜爲(爲)丸,如梧桐子大.每服五十九,清米湯下.忌母猪肉,牛羊犬馬等肉,胡椒,葱,蒜.
해설	『萬病回春』의 方이 『東醫實鑑』을 거쳐 『方藥合編』으로 전사되었다.

- 增補方 313 開鬱導氣湯

	내용
方藥合編	治消痰後 燥渴 譫語 【用法】水煎服 蒼朮 香附子 白芷 川芎 白茯苓 滑石 梔子(炒研) 神麩 各一錢 乾薑 陳皮 各五分 甘草 三分 生薑 三片 大棗 二枚

古今醫鑑	治諸般肚腹疼痛 一服立止 蒼朮米泔浸制 一錢 陳皮 五分 香附童便浸炒 一錢 白芷一錢 川芎一錢 茯苓一錢 乾薑炒五分 滑石一錢 山梔子炒一錢 神麩 炒一錢 甘草少許 上銑一劑 水煎 溫服
해설	『古今醫鑑』의 方이 『方藥合編』으로 전사되었다.

III. 고찰

1. 『方藥合編』上·中·下統 및 增補方에 있는 신경정신과 관련 처방의 證候에 따른 분류 증상의 輕重과 併發 가능성이 높은 것을 묶어서 다음과 같이 분류하였다.

『仁濟直指』에서 ‘人有七情 病生七氣 氣結則生痰 痰盛則氣愈結’이라 한 것을 비롯하여 七情氣鬱痰은 서로 轉變되는 밀접한 관련을 맺고 있으므로 한 범주로 보았다. 또한 驚悸, 健忘, 不安 등은 神經症(neurosis)으로, 癲狂癩, 呆病 등은 精神症(psychosis)으로 보고한 범주로 분류하였다. 그밖에 眩暈과 遺精은 독립적으로 발생하는 경우가 많으므로 따로 분류하였다(Table III, IV).

- 1) 鬱(肝鬱, 火鬱, 熱鬱), 氣證(九氣, 痞氣 等), 七情, 痰(痰盛, 痰鬱, 五積六聚 等)
- 2) 驚悸, 怔忡, 健忘, 心悸(心下動悸), 不眠, 不安
- 3) 癲癩狂瘖(搗搦), 神昏譫語(神昏, 譫語, 人事不省), 驚風, 呆病
- 4) 眩暈(眩, 暈)
- 5) 遺精(遺精白濁, 白物如精)

『方藥合編』上·中·下統과 增補方을 비교해 보면 上·中·下統에는 七情氣鬱痰과 神經症에 관련된 處방의 비율이 55개 處방 중 36개로 많은 비중을 차지하고 增補方에서는 癲癇狂瘈과 같은 精神症에 관련된 處방의 비율 40개 處방 중 24개로 높았다. 이는 『方藥合編』上·中·下統에서 부족한 부분인 경련성 질환에 관한 處방과 소아과와 부인과 관련 處방을 『幼幼集成』, 『傳靑註女科』 등에서 增補方으로 보충하는 과정에서 생긴 것으로 보인다.

Table III. 「方藥合編」上·中·下統의 神經精神科 관련 處방의 證候에 따른 분류

證候	處방 및 주요용어
鬱, 氣證, 七情, 痰	仁熟散(心膽虛), 四獸飲(七情聚痰), 加味歸脾湯(怒鬱), 藿香正氣散(痰厥), 七氣湯(七情鬱結), 四七湯(七氣凝結 梅核), 分心氣飲(七情痞滿), 正氣天香湯(九氣作痛), 橘皮一物湯(氣結), 蘇子降氣湯(上氣), 三和散(氣鬱滯), 交感丹(氣鬱滯), 蘇合香元(一切氣疾), 加味溫膽湯(心膽虛怯氣鬱), 六鬱湯(鬱火 氣鬱), 消積正元散(痰飲 氣血鬱結), 大七氣湯(五積六聚), 神保元(諸氣注痛), 小調中湯(一切痰火), 瓜蒌枳實湯(痰結), 加味四七湯(痰氣鬱結), 正傳加味二陳湯(食積及痰), 控涎丹(痰飲流注作痛), 開結舒經湯(婦人七情六鬱) 총 24개
驚悸, 怔忡, 健忘, 心悸, 不眠, 不安	究原心腎丸(怔忡), 歸脾湯(健忘 怔忡), 醒心散(怔忡不眠), 四物安神湯(怔忡), 小兒清心元(驚熱), 抱龍丸(驚風), 梔豉湯(不眠), 黃連解毒湯(不得眠), 瀉清丸(驚搖) 총 9개
癲癇狂瘈, 神昏譫語, 驚風, 呆病	陶氏升陽散火湯(譫語 神昏), 溫膽湯(心膽虛怯), 牛黃抱龍丸(急慢驚風), 紫霜丸(食癇), 五苓散(譫語), 桃仁承氣湯(譫語 癲狂), 益元散(狂譫), 追風祛痰丸(風痰發癇), 清心滾痰丸(癲癇 驚狂), 龍腦安神丸(癲癇), 當歸承氣湯(陽狂奔走), 羚羊角湯(子癇) 총 12개
眩暈	滋陰健脾湯(眩暈), 復元養榮湯(虛暈), 導痰湯(眩暈), 消風散(頭目昏眩), 清暈化痰湯(眩暈), 芎辛導痰湯(眩暈) 총 6개
遺精	秘元煎(遺精 帶濁), 清心蓮子飲(隨洩白物如精), 黃連清心飲(精洩), 加味二陳湯(遺精) 총 4개

Table IV. 「方藥合編」增補方의 神經精神科 관련 處방의 證候에 따른 분류

證候	處방 및 주요용어
鬱, 氣證, 七情, 痰	三生飲(氣厥), 加味逍遙散(肝經鬱火), 加減地黃湯(痰壅), 火鬱湯(火鬱), 達鬱湯(肝鬱), 救肝開鬱湯(肝鬱), 柴胡疎肝散(怒火傷肝), 開鬱止血湯(鬱結), 開鬱種玉湯(肝氣鬱結), 利氣泄火湯(易怒) 총 10개
驚悸, 怔忡, 健忘, 心悸, 不眠, 不安	桂枝甘草湯(心下動悸), 大橘皮湯(不安), 金鼎湯(怔忡驚悸), 安神丸(驚悸) 총 4개
癲癇狂瘈, 神昏譫語, 驚風, 呆病	三一承氣湯(瘈), 桂枝紅花湯(譫語), 去癲湯(重陰癲症), 薑附龍骨湯(重陰癲症), 柴胡犀角湯(熱極發狂), 化狂湯(重陽狂症), 定癇丸(五癇), 却病延壽丹(癇), 秘旨安神丸(驚), 團蔘散(驚), 桂枝防風湯(發瘈), 桂枝葛根湯(發瘈), 柴胡防風湯(發瘈), 瓜蒌桂枝湯(發瘈), 羚羊角散(發瘈), 附子散(發瘈), 當歸四逆散(發瘈), 防風當歸散(發瘈), 消風散(癇), 開鬱導氣湯(譫語), 宣風散(搖擗), 金粟丹(搖擗), 三解散(狂燥), 逐呆湯(呆症) 총 24개
眩暈	防眩湯(眩暈), 祛風定眩湯(眩暈) 총 2개
遺精	별무

2. 「方藥合編」上·中·下統 神經精神科 관련 處방의 전사과정에 대한 고찰

『方藥合編』上統 神經精神科 관련 處방은 총 8개로 上統 37 究原心腎丸, 44 仁熟散, 57 四獸飲, 63 秘元煎, 66 歸脾湯, 81 滋陰健脾湯, 98 加味歸脾湯, 100 復元養榮湯이다.

『方藥合編』中統 神經精神科 관련 處방은 총 23개로 中統 14 藿香正氣散, 28 陶氏升陽散火湯, 40 醒心散, 64 清心蓮子飲, 80 黃連清心飲, 81 七氣湯, 82 四七湯, 83 分心氣飲, 84 正氣天香湯, 86 橘皮一物湯, 87 蘇子降氣湯, 88 三和散, 89 交感丹, 90 蘇合香元, 91 加味溫膽湯, 92 四物安神湯, 94 溫膽湯, 112 消風散, 114 清暈化痰湯, 168 小兒清心元, 175 抱龍丸, 176 牛黃抱龍丸, 177 紫霜丸이다.

『方藥合編』下統 神經精神科 관련 處방은 총 24개로 下統 3 導痰湯, 10 五苓散, 11 梔豉湯, 12 黃連解毒湯, 13 桃仁承氣湯, 16 益元散,

38 六鬱湯, 40 消積正元散, 41 大七氣湯, 53 加味二陳湯, 54 神保元, 55 追風祛痰丸, 56 清心滾痰丸, 57 龍腦安神丸, 58 當歸承氣湯, 68 小調中湯, 69 瓜蒌枳實湯, 70 加味四七湯, 71 正傳加味二陳湯, 72 控涎丹, 105 芎辛導痰湯, 106 瀉清丸, 131 開結舒經湯, 157 羚羊角湯이다.

이상 총 55개의 처방 중 上統 63 秘元煎(出典: 『景岳全書』)과 上統 100 復元養榮湯(出典: 『壽世保元』)을 제외한 나머지 53개 처방은 모두 『東醫寶鑑』을 거쳐 전사 되었다. 『東醫寶鑑』이전의 출전은 본문에서 서술한 바와 같으며 다음과 같다(Table V).

Table V. 『方藥合編』 上·中·下統의 신경정신과 관련 처방의 출전

上統		中統		下統	
37	究原心腎丸 醫學入門	14	藿香正氣散 太平惠民和劑局方	3	導痰湯 世醫得效方
44	仁熟散 醫學入門	28	陶氏升陽散火湯 醫學入門	10	五苓散 傷寒論
57	四獸飲 東醫寶鑑	40	醒心散 東醫寶鑑	11	梔朮湯 傷寒論
63	秘元煎 景岳全書	64	清心蓮子飲 太平惠民和劑局方	12	黃連解毒湯 外臺秘要
66	歸脾湯 濟生方	80	黃連清心飲 醫學入門	13	桃仁承氣湯 傷寒論
81	滋陰健脾湯 萬病回春	81	七氣湯 醫學入門	16	益元散 宣明方論
98	加味歸脾湯 婦人大全良方	82	四七湯 太平惠民和劑局方	38	六鬱湯 丹溪心法
100	復元養榮湯 壽世保元	83	分心氣飲 太平惠民和劑局方	40	消積正元散 醫學入門
		84	正氣天香湯 醫學正傳	41	大七氣湯 醫學入門
		86	橘皮一物湯 醫學入門	53	加味二陳湯 古今醫鑑
		87	蘇子降氣湯 太平惠民和劑局方	54	神保元 太平惠民和劑局方
		88	三和散 太平惠民和劑局方	55	追風祛痰丸 醫學入門
		89	交感丹 萬病回春	56	清心滾痰丸 萬病回春
		90	蘇合香元 太平惠民和劑局方	57	龍腦安神丸 醫學正傳
		91	加味溫膽湯 東醫寶鑑	58	當歸承氣湯 素門病機氣宜保命集
		92	四物安神湯 萬病回春	68	小調中湯 醫學入門
		94	溫膽湯 備急千金要方	69	瓜蒌枳實湯 萬病回春
		112	消風散 太平惠民和劑局方	70	加味四七湯 世醫得效方
		114	清暈化痰湯 古今醫鑑	71	正傳加味二陳湯 醫學正傳
		168	小兒清心元 東醫寶鑑	72	控涎丹 三因極一病證方論
		175	抱龍丸 小兒藥證直訣	105	芎辛導痰湯 證治準繩
		176	牛黃抱龍丸 古今醫鑑	106	瀉清丸 丹溪心法
		177	紫霜丸 備急千金要方	131	開結舒經湯 古今醫鑑
				157	羚羊角湯 婦人大全良方

3. 『方藥合編』 增補方 신경정신과 관련 처방의 전사과정에 대한 고찰

『方藥合編』 增補方은 『方藥合編』 上·中·下統에 이미 기재되었던 처방을 기재하기도 하였으며 『傳靑註男女科』, 『幼幼集成』의 方이 중요도와는 관계없이 순차적으로

이용되었다. 따라서 처방을 엄선하여 전사한 것이 아니라 경련성질환 등에 대한 처방을 보충하고 이전에 소개된 적이 없는 清代 서적을 소개하고자 하는 의도를 가졌던 것으로 추측된다.

『方藥合編』 增補方 신경정신과 관련 처방

은 총 40개로 6 三生飲, 27 加味逍遙散, 54 桂枝甘草湯, 64 三一承氣湯, 75 大橘皮湯, 76 桂枝紅花湯, 95 加減地黃湯, 107 火鬱湯, 121 達鬱湯, 124 救肝開鬱湯, 126 金鼎湯, 127 去癩湯, 128 薑附龍骨湯, 129 柴胡犀角湯, 130 化狂湯, 131 定癩丸, 132 却病延壽丹, 148 防眩湯, 160 柴胡疎肝散, 211 開鬱止血湯, 225 開鬱種玉湯, 249 利氣泄火湯, 277 秘旨安神丸, 278 團

蔘散, 281 桂枝防風湯, 282 桂枝葛根湯, 283 柴胡防風湯, 284 瓜蒌桂枝湯, 285 羚羊角散, 286 附子散, 287 當歸四逆散, 288 防風當歸散, 294 消風散, 301 安神丸, 313 開鬱導氣湯, 335 祛風定眩湯, 339 宣風散, 342 金粟丹, 350 三解散, 355 逐呆湯이다. 『方藥合編』 增補方の 출전은 본론에서 서술한 바와 같으며 다음과 같다 (Table VI).

Table VI. 『方藥合編』 增補方の 신경정신과 관련 처방의 출전

增補方					
6	三生飲	太平惠民和劑局方	225	開鬱種玉湯	傳靑註男女科
27	加味逍遙散	太平惠民和劑局方	249	利氣泄火湯	傳靑註男女科
54	桂枝甘草湯	傷寒論	277	秘旨安神丸	幼幼集成
64	三一承氣湯	宣明方論	278	團蔘散	幼幼集成
75	大橘皮湯	雜病源流犀燭	281	桂枝防風湯	幼幼集成
76	桂枝紅花湯	婦人大全良方	282	桂枝葛根湯	傷寒論
95	加減地黃湯	小兒藥證直訣	283	柴胡防風湯	東醫寶鑑
107	火鬱湯	蘭室秘藏	284	瓜蒌桂枝湯	金匱要略
121	達鬱湯	출전을 찾을 수 없다.	285	羚羊角散	世醫得效方
124	救肝開鬱湯	石室秘錄	286	附子散	張氏醫通
126	金鼎湯	醫學摘粹	287	當歸四逆散	傷寒論
127	去癩湯	石室秘錄	288	防風當歸散	醫學正傳
128	薑附龍骨湯	출전을 찾을 수 없다.	294	消風散	太平惠民和劑局方
129	柴胡犀角湯	醫學金針	301	安神丸	萬病回春
130	化狂湯	傳靑主男科	313	開鬱導氣湯	古今醫鑑
131	定癩丸	醫學心悟	335	祛風定眩湯	출전을 찾을 수 없다.
132	却病延壽丹	醫學入門	339	宣風散	小兒藥證直訣
148	防眩湯	石室秘錄	342	金粟丹	幼幼集成
160	柴胡疎肝散	景岳全書	350	三解散	幼幼集成
211	開鬱止血湯	傳靑註男女科	355	逐呆湯	石室秘錄

IV. 결 론

『方藥合編』에 수재된 신경정신과 관련처방에 대한 연구를 통해 다음과 같은 결론을 얻었다.

1. 『方藥合編』 上 · 中 · 下統처방 중 신경정신과 관련 처방은 上統 8개 · 中統 23개 · 下統 24개로 모두 55개이며, 增補方 처방 중 신경정신과 관련 처방은 40개다.
2. 『方藥合編』 上 · 中 · 下統에 수재된 신경정신과 관련 처방은 신경증의 비율이 높

고, 『方藥合編』 增補方に 수재된 신경정신과 관련 처방은 정신증의 비율이 높았다.

3. 『方藥合編』 上·中·下統 처방 중 신경정신과 관련 처방에 영향을 준 서적을 살펴본 결과 55개의 처방 중 53개의 처방이 『東醫寶鑑』을 통하여 전사되었다. 그러므로 『方藥合編』의 신경정신과 처방은 『東醫寶鑑』의 영향을 가장 많이 받았다.
4. 『方藥合編』 增補方은 『東醫寶鑑』을 중시하면서도 『東醫寶鑑』 以後에 국내에 유입된 서적에 수재된 처방을 소개하였고, 『方藥合編』 上·中·下統의 인용서적에 기재되었으나 『方藥合編』 上·中·下統으로 전사되진 않았던 처방을 기재하였다. 따라서 『方藥合編』 增補方은 『方藥合編』 上·中·下統을 보충하기 위해 노력하였던 것으로 사료된다.

참 고 문 헌

1. 대한한방신경정신과학회편. 한의신경정신과학. 서울:집문당. 2005:206-14, 227-40, 256-97, 303-33, 386-95.
2. 이형구, 송병기, 최용태, 송효정, 채병윤, 송일병, 이경섭, 류기원, 김병운, 두호경, 이운호, 박동원, 정규만, 황의완, 강성길, 김창환, 류봉하, 박동석, 배형섭, 신현대, 김성수, 이경섭, 고희균, 김덕곤, 안병철, 우홍정, 김영석, 박영배, 정승기, 김재규, 고병희, 김중호, 김지혁, 최도영, 이종수, 정석희, 조동현, 조기호, 오태환. 標準疾病死因分類(韓醫). 서울:대한한 의사협회. 1994:205-10.
3. 신순식, 최선미, 신민규, 양기상, 최승훈, 박경모, 박종현, 심범상, 김성우, 이인선, 노석선, 정진홍, 이진용, 김달래, 임형호, 김윤범, 박성식, 송태원, 김중우, 최윤정, 이승기. 한의진단명과 진단요건의 표준화연구Ⅲ. 서울:한국한의학회. 1997:449-86.
4. 黃度淵原著. 方藥合編. 서울:南山堂. 1998:120, 129-33, 136-8, 154, 157, 160-2, 165, 171-6, 184-9, 194, 197-9, 201-10, 218-9, 224-9, 241, 268, 271, 277-9, 296, 300, 305-11, 314, 317-21, 324, 334, 336, 340, 345-8, 350, 352-3, 355-6.
5. 許浚著. 對譯東醫寶鑑. 서울:法人文化社. 1999:163-5, 169-70, 172, 174, 186, 189-90, 193-4, 198, 204, 238, 277, 279, 281, 283, 285, 306, 313, 336, 489, 492-3, 499, 735, 922, 953, 965, 978, 1016, 1018, 1022, 1036, 1038, 1040, 1045, 1052, 1079, 1111, 1180, 1211, 1278, 1285-6, 1332, 1369, 1680, 1692, 1704.
6. 신재용편저. 방약합편해설. 서울:전통의학연구소. 1993; 43, 48, 54, 57, 60-61, 74-75, 82-83, 108-109, 120-121, 126-127, 137-138, 142-150, 162-163, 168, 199-202, 207, 213-218, 227-229, 233-235, 239-241, 254-255, 263-264, 275, 282, 287, 293, 295, 297, 303-308, 310, 313, 322, 324-325, 328, 333-337, 343-344, 346-347.
7. 程國彭著. 醫學心悟. 北京:人民衛生出版社. 2006:201.
8. 虞搏著. 醫學正傳. 서울:成輔社. 1986:69, 87, 199, 263, 268, 364.
9. 龔廷賢著. 壽世保元. 北京:人民衛生出版社. 1996:228, 469, 494.
10. 龔廷賢著. 古今醫鑑. 江西:江西科學技術出版社. 1990:127, 160, 191, 193, 201, 259, 266, 464.
11. 李梴著. 醫學入門. 北京:中國中醫藥出版社.

- 1999:293, 302, 316, 318, 491, 525, 532, 541, 543, 546, 570, 557, 600, 604, 612-4.
12. 朱震亨著. 丹溪心法. 北京:人民衛生出版社. 2005:25, 98, 105, 211.
13. 劉完素著. 素門病機氣宜保命集. 北京:中醫古籍出版社. 1998:111.
14. 孫思邈著. 備急千金要方. 北京:人民衛生出版社. 1996:217, 310.
15. 陳師文等奉敕撰. 四庫全書741 中國醫學大系9 太平惠民和劑局方. 서울:鼎談. 1990:486, 493-4, 519-21, 527-8, 532, 537-8, 563, 588-9, 653, 695.
16. 陳自明著. 四庫全書742 中國醫學大系10 婦人大全良方. 서울:鼎談. 1990:505-6, 542.
17. 곽금화. 方藥合編 婦人科 관련 處方에 대한 研究. 동국대학교 일반대학원 석사학위. 2001:89.
18. 李杲著. 四庫全書745 中國醫學大系13 蘭室秘藏. 서울:鼎談. 1990:566.
19. 陳言著. 四庫全書743 中國醫學大系11 三因極一病證方論. 서울:鼎談. 1990:336-7.
20. 陳言著. 四庫全書743 中國醫學大系11 濟生方. 서울:鼎談. 1990:487.
21. 楊士瀛著. 四庫全書744 中國醫學大系12 仁齋直指. 서울:鼎談. 1990:372.
22. 張機著. 四庫全書734 中國醫學大系2 傷寒論注釋. 서울:鼎談. 1990:240, 242-3, 248, 289, 304.
23. 劉完素著. 四庫全書744 中國醫學大系12 宣明方論. 서울:鼎談. 1990:785, 813.
24. 危亦林著. 世醫得效方. 上海:上海科學技術出版社. 1997:199, 204, 827.
25. 陣士鐸. 石室秘錄. 서울:書苑堂. 2000:24-5, 68-9, 190, 197-8.
26. 周命新. 國譯韓醫學大系1 醫門寶鑑1. 서울:海東. 1999:79, 81.
27. 周命新. 國譯韓醫學大系2 醫門寶鑑2. 서울:海東. 1999:95.
28. 慶云閣. 醫學摘粹. 上海:上海科學技術出版社. 1983:163.
29. 張機著. 四庫全書734 中國醫學大系2 金匱要略論注. 서울:鼎談. 1990:19.
30. 王肯堂著. 證治準繩. 上海:上海科學技術出版社. 1995:257.
31. 張介賓. 景岳全書. 서울:한미의학. 2006:2611, 2744, 2847, 2824.
32. 錢乙著. 小兒藥證直訣. 서울:醫聖堂. 2002:111, 129, 136, 154.
33. 張璐著. 張氏醫通. 上海:上海科學技術出版社. 1995:983.
34. 傅山著. 傅青註男女科. 北京:中國醫藥出版社. 1999:18, 43, 61.
35. 沈金鰲著. 雜病源流犀燭. 北京:中國中醫藥出版社. 1994:273.
36. 王伯岳主編. 中醫兒科學. 서울:醫聖堂. 1996:914.
37. 江克明編著. 校訂方劑學大辭典. 서울:醫聖堂. 1991:70, 426, 663, 867, 900, 982.
38. 龔廷賢著. 對譯萬病回春. 서울:法人文化社. 2007:181, 260, 378, 499, 511-513, 521, 856.
39. 하기태. 景岳全書가 朝鮮後期 주요의서에 미친 영향에 대한 연구. 동국대학교 일반대학원 석사학위. 2001:13-6.
40. 윤용갑, 강무수. 方藥合編에 收錄된 處方的 主治別 系統分類와 引用文獻에 對한 考察. 원광한의대논문집. 1986;4(1):192-5.
41. 권보형, 이상용. 전광의 증상에 관한 동서의학적 고찰. 동의신경정신과학회지. 1993;4(1):27-46.