

東醫寶鑑 中 芍藥甘草湯이 配伍된 方劑의 活用に 대한 考察

국윤범

상지대학교 한의과대학 방제학교실

ABSTRACT

Applications of Prescriptions Including Paeoniae Radix and Glycyrrhizae Radix Decoction in Dongeuibogam

Yoon-Bum Kook

Dept. of Formula Science, College of Oriental Medicine, Sangji University

This report describes 57 prescriptions including Paeoniae Radix and Glycyrrhizae Radix in Dongeuibogam. Paeoniae Radix and Glycyrrhizae Radix have been used separately or concurrently in Oriental Medicine for a long time as a treatment for various disease.

The following conclusions are reached through investigations on the applications of prescriptions including Paeoniae Radix and Glycyrrhizae Radix in Dongeuibogam.

1. 7 times(12.3%) prescriptions are recorded in women chapter, 6 times(10.5%) in cold chapter, 5 times(8.8%) in stool chapter and fatigue chapter each, 4 times(7.0%) in psychiatry chapter, which are arranged in order of frequency.

2. Anxiety, Yin-Yang deficiency, stroke, treating blood, cataract, fever floating due to Yin deficiency, weak and fatigue, pregnancy, abortion, women accessory disease, cold-feeling heart pain, stiffness,

-
- 교신저자 :국윤범
 - 강원도 원주시 우산동 660번지 상지대학교 한의과대학 방제학교실
 - Tel : 033-730-0661 E-mail : kook@sangji.ac.kr
 - 접수 : 2010/ 10/ 26 수정 : 2010/ 11/ 01 채택 : 2010/ 11/ 03

etc, among 51 symptoms in prescriptions including *Paeoniae Radix* and *Glycyrrhizae Radix*.

3. The dosage of *Paeoniae Radix* and *Glycyrrhizae Radix* are from 5 pun:2.5 pun to 2 nyang:1 nyang. 1 jeon:5 pun is recored 39 times(68.4%), 2 jeon:1 jeon and 1 nyang:5 jeon is 6 times (3.21%), 2 nyang:1 nyang is 2 times(1.8%) used among 57 prescriptions including *Paeoniae Radix* and *Glycyrrhizae Radix*.

4. 57 prescriptions including *Paeoniae Radix* and *Glycyrrhizae Radix* are mostly composed of Samooltang and Sagoonjatang, Gyejitang, Gamgiltang, Bowontang, Goongguitang, Jeongwoneum, Bojoongikgitang, Jigoongsan, Ijintang, Pyeongwuisan, Oryungsan, etc, according to the usage.

Key word : *Paeoniae Radix*, *Glycyrrhizae Radix*, Dongeuibogam, nyang(兩), pun(分)

1. 緒 論

芍藥은 미나리아재비과(毛茛科:Ranunculaceae)에 속한 多年生 草本인 작약 *Paeonia latiflora* Pall.의 뿌리를 건조한 것으로 재배종은 3~4년생, 야생종은 5~10년생을 여름과 가을철에 뿌리를 캐어, 根莖과 수염뿌리를 제거하고 깨끗이 씻어 粗皮를 벗겨내고 끓는 물에 넣어 잠깐 삶아 내어 햇볕에 말린다. 대한약전에서는 참작약 *Paeonia albiflora* Pallas var. *trichocarpa* Bunge 의 뿌리로 규정하고 있다¹⁻⁴⁾.

芍藥의 性味는 苦酸, 微寒하고, 肝 脾經으로 歸經한다. 養血柔肝, 緩中止痛, 斂陰收汗 등의 효능이 있어 胸腹脇肋疼痛, 瀉痢腹痛, 自汗盜汗, 陰虛發熱, 月經不調, 崩漏, 帶下 등의 치료에 使用된다¹⁻⁴⁾.

芍藥은 paeoniflorin, paeonol, paeonin, 安息香酸 약 1.7%, 精油, 脂肪油, 樹脂, tannin, 糖, 澱粉, 粘液質, 蛋白質, paeoniflorin을 함유한다.

甘草는 콩과(豆科:Leguminosae)에 속한 多年生 草本인 光果甘草(유럽감초) *G. glabra* L. 甘草(만

주감초) *Glycyrrhiza uralensis* Fisch. 또는 기타 동속식물의 根 및 根莖으로, 봄과 가을에 채취하여 鬚根을 제거하고 曬乾한다.

甘草의 性味는 甘,平하고, 心 肺 脾 胃經으로 歸經한다. 和中緩急, 潤肺, 解毒, 調和諸藥 등의 효능이 있어 炙用하면 脾胃虛弱, 食少, 腹痛便溏, 勞倦發熱, 肺痿咳嗽, 心悸, 驚癇 등을, 生用하면 咽喉腫痛, 消化性潰瘍, 癰疽瘡瘍, 解藥毒, 食物中毒 등의 치료에 使用된다. 甘草는 triterpene系 saponin, glycyrrhizin 등이 함유되어 있다¹⁻⁴⁾.

芍藥은 甘草와 配伍되면 腹痛의 通治에 使用되는 基本方인 芍藥甘草湯이 된다. 張仲景의 『傷寒論』에 “若厥愈足溫者 更作芍藥甘草湯與之 其脚則伸”이라 기록⁵⁾된 이래 諸家에서 肝脾不和 및 營血不和로 인한 痛症에 대한 鎮痛, 鎮痙의 基本方으로 使用⁶⁻⁷⁾하여 왔다. 芍藥은 入肝經하며 平肝止痛, 養血斂陰하고 甘草는 入脾經하며 緩急止痛하는 약으로 두 약이 配伍되면 肝脾不和로 인한 痛症을 緩和시켜주는 효과가 있다⁷⁾.

芍藥과 甘草에 관련된 최신의 연구는 국⁸⁾ 등의

‘芍藥甘草湯 및 構成藥物이 氣管支平滑筋에 미치는 影響’, 이⁹⁾ 등의 ‘芍藥甘草湯 및 構成藥物이 鎮痛에 미치는 影響’ 이¹⁰⁾의 ‘芍藥甘草湯의 效能에 관한 연구’ 등이 있었으나 芍藥과 甘草가 配伍된 方劑의 活用に 대한 연구는 없었다.

芍藥과 甘草는 方劑構成의 基本的인 配合를 이루며 또한 여러 方劑 內에서 다양한 效능을 發揮하는 바 著者는 『東醫寶鑑』에서 芍藥과 甘草가 配伍된 57개 方劑를 조사하여 治療領域, 病症 및 主治, 使用量 등의 資料分析을 통한 方劑學的 知見을 얻었기에 보고하는 바이다.

II. 本 論

調査方法은 『東醫寶鑑』¹¹⁻¹⁵⁾ 中 芍藥과 甘草가

配伍된 57개의 方劑를 조사하여 文獻的 資料分析 및 研究內容을 整理하였다. 『東醫寶鑑』본문 內容 中の 白芍藥은 芍藥으로 看做하여 研究를 進행하였으 며, 藥材의 使用量은 一貼 또는 一回 服用量을 基準으로 換算하여 기록하였다.

1. 芍藥甘草湯이 配伍된 方劑의 治療領域에 대한 調査

芍藥甘草湯이 配伍된 方劑의 治療領域에 대해 調査하고, 頻度數가 높은 順序대로 整理하였다 (Table 1). 『東醫寶鑑』의 總 57方 中 「內景篇」¹¹⁾에 16方, 「外形篇」¹²⁾에 8方, 「雜病篇」¹³⁻¹⁵⁾에 33方이 수록되어 있다. 治療領域은 『東醫寶鑑』의 病門區分과 同一한 것으로 看做하였다.

Table 1. 芍藥甘草湯이 配伍된 方劑의 治療領域

病 門	處 方	頻度數	百分率
婦人 ¹⁵⁾	勝金丹, 芍歸補中湯, 百合散, 紫蘇飲, 芍蘇散, 熟乾地黃散, 逍遙散	7	12.3
寒 ¹³⁾	麻黃桂枝湯, 桂枝湯, 葛根解肌湯, 當歸四逆湯, 香葛湯, 甘李根湯	6	10.5
大便 ¹¹⁾	胃苓湯, 萬病四苓散, 香砂六君子湯, 固腸湯, 黃芩芍藥湯	5	8.8
虛勞 ¹³⁾	參芪健中湯, 人參養榮湯, 補益養榮湯, 補腎養脾丸, 大建中湯	5	8.8
神 ¹¹⁾	清心補血湯, 益榮湯, 滋陰寧神湯, 加味寧神丸	4	7.0
血 ¹¹⁾	人參救肺散, 補榮湯, 保命生地黃散	3	5.3
疔瘡 ¹⁴⁾	柴胡桂枝湯, 散邪湯, 鱉甲飲子	3	5.3
胞 ¹¹⁾	通經四物湯, 清白散	2	3.5
眼 ¹²⁾	滋腎明目湯, 當歸湯	2	3.5
前陰 ¹²⁾	膾臍補天丸, 洗濁湯	2	3.5
暑 ¹³⁾	清氣飲, 參薹飲	2	3.5
咳嗽 ¹⁴⁾	知母湯, 滋陰清化膏	2	3.5
癰疽 ¹⁴⁾	托裏益氣湯, 托裏消毒飲	2	3.5
消渴 ¹⁴⁾	生津養血湯, 滋飲養榮湯	2	3.5
津液 ¹¹⁾	桂枝附子湯	1	1.8
聲音 ¹¹⁾	人參平補湯	1	1.8
腹 ¹²⁾	芍藥甘草湯	1	1.8
脇 ¹²⁾	芍葛湯	1	1.8
脈 ¹²⁾	人參黃芪湯	1	1.8
皮 ¹²⁾	冲和補氣湯	1	1.8
內傷 ¹³⁾	瑞蓮丸	1	1.8

風 ¹³⁾	參歸養榮湯	1	1.8
黃疸 ¹⁴⁾	秦艽飮子	1	1.8
小兒 ¹⁵⁾	黃芪湯	1	1.8
合計		57	100

2. 芍藥甘草湯이 配伍된 方劑의 病症 및 主治 調査한 후, 類型別로 分類하였다(Table 2-1, Table 2-2, Table 2-3).

芍藥甘草湯이 配伍된 方劑의 病症 및 主治를

Table 2-1. 「內景篇」¹¹⁾ 에 芍藥甘草湯이 配伍된 方劑의 病症 및 主治

病 門	病 症	處 方	主 治
神 ¹¹⁾	驚悸	清心補血湯	勞心思慮 損傷精神 頭眩目昏 心虛氣短 驚悸煩熱
	怔忡	益榮湯	思慮過度 耗傷心血 怔忡恍惚
	癲癩	滋陰寧神湯	癲疾 及不時暈倒 痰壅搖蕩
	神病通治藥餌	加味寧神丸	心血不足 驚悸怔忡 健忘恍惚 一切痰火之證
血 ¹¹⁾	嘔血吐血	人參救肺散	虛勞吐血
	通治血病藥餌	補榮湯	諸失血
		保命生地黄散	鬱熱衄 吐 便 尿諸失血 無寒證者
聲音 ¹¹⁾	聲音出於腎	人參平補湯	腎虛 聲不出
津液 ¹¹⁾	亡陽證	桂枝附子湯	傷寒發汗過多 隧漏不止 四肢拘急 難以屈伸
胞 ¹¹⁾	調血治法	通經四物湯	經水過期不行 乃血虛有寒
	帶下治法	清白散	白帶
大便 ¹¹⁾	泄證有五	胃苓湯	脾胃濕盛 泄瀉腹痛 水穀不化
	火泄	萬病四苓散	熱瀉
	脾泄	香砂六君子湯	脾泄
	赤白痢	固腸湯	赤白痢 及諸痢
	膿血痢	黃芩芍藥湯	下痢膿血 身熱腹痛 脈洪數

Table 2-2. 「外形篇」¹²⁾ 에 芍藥甘草湯이 配伍된 方劑의 病症 및 主治

病 門	病 症	處 方	主 治
眼 ¹²⁾	內障	滋腎明目湯	血少 神勞 腎虛眼病
		當歸湯	補肝腎 益瞳子光明
腹 ¹²⁾	腹痛通治	芍藥甘草湯	腹痛 多屬血滯, 四時腹痛
脇 ¹²⁾	風寒脇痛	芍葛湯	風寒脇痛
皮 ¹²⁾	麻木	冲和補氣湯	合目則麻作 開目則不麻 四肢痿厥 目昏頭眩
脈 ¹²⁾	脉病藥餌	人參黃芪湯	滋養血氣 調和榮衛 和順三焦 通行血脉 治雜病脉代
前陰 ¹²⁾	陰痿	臘肭補天丸	虛損陰痿
	陰腫陰痒陰瘡陰冷交接出血	洗滌湯	婦人陰蝕瘡

Table 2-3. 「雜病篇」¹³⁻⁵⁾ 에 芍藥甘草湯이 配伍된 方劑의 病症 및 主治

病 門	病 症	處 方	主 治
風 ¹³⁾	破傷風治法	參歸養榮湯	風痰瘥 陰瘥
寒 ¹³⁾	太陽病	麻黃桂枝湯	太陽病八九日 發熱惡寒 往來如瘥狀.
		桂枝湯	太陽傷風 自汗 惡風寒
	陽明病	葛根解肌湯	陽明經病 目疼 鼻乾 不得臥 宜解肌.
	厥陰病	當歸四逆湯	厥陰證 手足厥冷 脉微欲絕.
	傷寒表證	香葛湯	傷寒 不問陰陽兩感 頭痛 寒熱
傷寒動氣	甘李根湯	動氣誤發汗 氣上衝 正在心端	
暑 ¹³⁾	夏暑宜補氣	清氣飲	發熱 汗大泄 無氣力 脉虛細而遲
		參藟飲	驅暑 清熱 壯元氣 免霍亂吐利 等疾
內傷 ¹³⁾	內傷調補藥	瑞蓮丸	內傷脾胃虛弱 少飲食 或泄瀉
虛勞 ¹³⁾	陽虛用藥	參芪健中湯	四肢倦怠 飲食少進
	陰陽俱虛用藥	人參養榮湯	虛勞成損 氣血不足 消瘦倦怠 氣短食少 或寒熱自汗.
		補益養榮湯	五勞七傷
	腎虛藥	補腎養脾丸	虛勞諸證
虛勞通治藥	大建中湯	諸虛不足 小腹急痛 潮熱 盜汗 痰多咳嗽 多臥少起	
咳嗽 ¹⁴⁾	勞嗽	知母湯	虛勞咳嗽 唾膿血 心肺有熱
	火嗽	滋陰清化膏	止咳嗽 清痰火 滋化源
消渴 ¹⁴⁾	消渴有三	生津養血湯	上消
	消渴通治	滋飲養榮湯	消渴亡津液 口燥咽乾
黃疸 ¹⁴⁾	黃汗	秦艽飲子	女勞疸
瘵瘡 ¹⁴⁾	六經瘵	柴胡桂枝湯	少陽瘵 寒熱乍往乍來
	瘵瘡	散邪湯	風瘵初起
		鱉甲飲子	老瘵 腹中結癥瘕
癰疽 ¹⁴⁾	癰疽五發證	托裏益氣湯	癰疽 肉色不變 或潰而不斂 一切虛證
	癰疽排膿生肌法	托裏消毒飲	癰疽潰後 元氣虛弱 久未收斂
婦人 ¹⁵⁾	求嗣	勝金丹	月水愆期 久無嗣息 及血癖 其痛 百般諸疾
	半產	芍歸補中湯	懷孕 氣血虛弱 不能榮養 以致胎漏 每數月而墮
	子嗽	百合散	子嗽
	子懸	紫蘇飲	子懸 及臨產驚惶 氣結難產
	感寒	芍蘇散	妊婦感冒風寒 頭痛煩熱
	產後虛勞	熟乾地黃散	產後氣血未復 而有房事勞損 下血頭目沈重
	婦人雜病	逍遙散	月經不調 及血虛五心煩熱 寒熱如瘧
小兒 ¹⁵⁾	慢驚風	黃芪湯	慢驚風 大便泄青色

3. 芍藥甘草湯이 配伍된 方劑의 病因·病理

芍藥甘草湯이 配伍된 方劑의 病因·病理가 기록된 내용을 調査하여 分類하였다(Table 3).

Table 3. 芍藥甘草湯이 配伍된 方劑의 病因·病理

區分	病因·病理		症狀	處方
內因	七情	勞心思慮	損傷精神 頭眩目昏 心虛氣短 驚悸煩熱	清心補血湯
		思慮過度	耗傷心血 怔忡恍惚	益榮湯
外因	傷寒		隧漏不止 四肢拘急 難以屈伸	桂枝附子湯
	風寒		風寒脇痛	芍葛湯
	風痰		風痰瘥 陰瘥	參歸養榮湯
	太陽病		太陽病八九日 發熱惡寒 往來如瘧狀	麻黃桂枝湯
			太陽傷風 自汗 惡風寒	桂枝湯
	陽明病		陽明經病 目疼 鼻乾 不得臥 宜解肌	葛根解肌湯
	厥陰病		厥陰證 手足厥冷 脉微欲絕	當歸四逆湯
	傷寒表證		傷寒 不問陰陽兩感 頭痛 寒熱	香葛湯
	傷寒動氣		動氣誤發汗 氣上衝 正在心端	甘李根湯
	夏暑		發熱 汗大泄 無氣力 脉虛細而遲	清氣飲
		驅暑 清熱 壯元氣 免霍亂吐利 等疾	參薺飲	
感寒		妊婦感冒風寒 頭痛煩熱	芍蘇散	
不內外因	血	心血不足	驚悸怔忡 健忘恍惚 一切痰火之證	加味寧神丸
		鬱熱失血	諸失血	補榮湯
			鬱熱衄 吐 便 尿諸失血 無寒證者	保命生地黃散
	血虛有寒		經水過期不行	通經四物湯
	痰壅		癲疾 及不時暈倒 搯搦	滋陰寧神湯
	腎虛		聲不出	人參平補湯
	脾泄		脾泄	香砂六君子湯
	脾胃濕盛		泄瀉腹痛 水穀不化	胃苓湯
	虛勞		吐血	人參救肺散
	血少		血少 神勞 腎虛眼病	滋腎明目湯
	肝腎虛		補肝腎 益瞳子光明	當歸湯
	血澁		腹痛 多屬血澁, 四時腹痛	芍藥甘草湯
	血氣虛		滋養血氣 調和榮衛 和順三焦 通行血脉 治雜病脉代	人參黃芪湯
	虛損		虛損陰痿	膾肭補天丸
	陰腫陰痒陰瘡		婦人陰蝕瘡	洗滌湯
	內傷		內傷脾胃虛弱 少飲食 或泄瀉	瑞蓮丸
	陽虛		四肢倦怠 飲食少進	參芪健中湯
	虛勞		虛勞成損 氣血不足 消瘦倦怠 氣短食少 或寒熱自汗	人參養榮湯
			五勞七傷	補益養榮湯
			虛勞諸證	補腎養脾丸
			諸虛不足 小腹急痛 潮熱 盜汗 痰多咳嗽 多臥少起	大建中湯
			虛勞咳嗽 唾膿血 心肺有熱	知母湯
		產後氣血未復 而有房事勞損 下血頭目沈重	熟乾地黃散	
	痰火		止咳嗽 清痰火 滋化源	滋陰清化膏
	消渴		上消	生津養血湯
			消渴亡津液 口燥咽乾	滋飲養榮湯
	黃汗		女勞疸	秦苳飲子

瘡	少陽瘡 寒熱乍往乍來	柴胡桂枝湯
	風瘡初起	散邪湯
癰疽	老瘡 腹中結癥瘕	鱉甲飲子
	癰疽 肉色不變 或潰而不斂 一切虛證	托裏益氣湯
求嗣	癰疽潰後 元氣虛弱 久未收斂	托裏消毒飲
半產	月水愆期 久無嗣息 及血癖 其痛 百般諸疾	勝金丹
婦人雜病	懷孕 氣血虛弱 不能榮養 以致胎漏 每數月而墮	芍歸補中湯
	月經不調 及血虛五心煩熱 寒熱如瘡	逍遙散

4. 芍藥과 甘草의 使用量에 대한 調査 錢:二錢의 比率로 配合 使用되어 『東醫寶鑑』內에
 芍藥과 甘草 使用量에 따른 方劑를 分類하였다 서도 2:1의 比率로 配合된 方劑를 위주로 拔萃하
 (Table 3). 芍藥甘草湯이 芍藥과 甘草가 각각 四 여 分類하였다.

Table 4. 芍藥甘草湯이 配合된 方劑의 芍藥과 甘草의 使用量에 대한 調査

白芍藥:甘草	處 方	個 數	百分率
五分:二分半	熟乾地黃散	1	1.8
六分:三分	人參平補湯	1	1.8
一錢:五分	滋腎明目湯, 當歸湯, 芍葛湯, 沖和補氣湯, 人參黃芪湯, 清心補血湯, 滋陰寧神湯, 人參救肺散, 補榮湯, 通經四物湯, 胃苓湯, 香砂六君子湯, 參歸養榮湯, 葛根解肌湯, 香葛湯, 甘李根湯, 參芪健中湯, 補益養榮湯, 大建中湯, 知母湯, 生津養血湯, 滋飲養榮湯, 柴胡桂枝湯, 散邪湯, 托裏益氣湯, 芍歸補中湯, 黃芪湯, 保命生地黃散, 清白散, 萬病四苓散, 清氣飲, 參薺飲, 秦艽飲子, 鱉甲飲子, 托裏消毒飲, 百合散, 紫蘇飲, 芍蘇散, 逍遙散	39	68.4
一錢半:七分半	固腸湯	1	1.8
二錢:一錢	桂枝附子湯, 黃芩芍藥湯, 麻黃桂枝湯, 桂枝湯, 當歸四逆湯, 人參養榮湯	6	10.5
四錢:二錢	芍藥甘草湯	1	1.8
一兩:五錢	益榮湯, 加味寧神丸, 瑞蓮丸, 補腎養脾丸, 滋陰清化膏, 勝金丹	6	10.5
二兩:一兩	洗湯湯, 膈肭補天丸	2	3.5
合 計		57	100

5. 芍藥甘草湯이 配伍된 方劑의 構成內容調査 고 이에 대한 構成基本處方の 내용을 조사하여 분
 芍藥甘草湯이 配伍된 方劑를 병증별로 구분하 석하였다(Table 5-1, Table 5-2, Table 5-3).

Table 5-2. 「外形篇」¹²⁾ 에 芍藥甘草湯이 配伍된 方劑의 構成內容

病 症	處 方	處方構成	構成基本處方
內障	滋腎明目湯	當歸 川芎 白芍藥 生地黃 熟地黃各一錢 人參 桔梗 梔子 黃連 白芷 蔓荊子 甘菊 甘草各五分.右剉 作一貼 入細 茶一撮 燈心一團 水煎 食後服.<回春>	四物湯
	當歸湯	柴胡二錢 生地黃一錢半 當歸 白芍藥各一錢 黃芩 黃連並酒浸各七分半 甘草灸五分. 右剉 作一貼 水煎 空心服.<醫林>	四物湯類

腹痛通治	芍藥甘草湯	白芍藥 四錢 甘草 炙 二錢. 右剉作一貼 水煎服 稼穡作甘 甘者已也. 曲直作酸 酸者甲也. 甲已化土 此仲景妙法也. 酸以收之 甘以緩之.<東垣>	芍藥甘草湯
風寒脇痛	芍葛湯	川芎 乾葛 桂枝 細辛 枳殼 人參 芍藥 麻黃 防風各一錢 甘草 五分. 右剉作一貼 入薑三片水煎服.<本事>	枳芍散, 桂枝湯
麻木	沖和補氣湯	黃芪二錢 蒼朮 陳皮各一錢半 人參 白朮 白芍藥 澤瀉 豬苓各一錢 羌活七分 升麻 甘草各五分 獨活 當歸 黃柏各三分 柴胡 神麴 木香 草豆蔻 麻黃 黃連各二分. 右剉分作二貼 水煎服之.<東垣>	補中益氣湯
脉病藥餌	人參黃芪湯	陳皮二錢 黃芪 白芍藥 桔梗 天門冬 半夏 當歸各一錢 人參 白茯苓 熟地黃 地骨皮 甘草各五分. 右剉作一貼 薑七片 煎服.<脉訣>	四物湯, 四君子湯類
陰痿	膾臍補天丸	胡桃肉三兩 白朮二兩半 白芍藥 黃芪 熟地黃 杜沖 牛膝 破故紙 川練肉 遠志各二兩 膾臍臍 人參 白茯苓 枸杞子 當歸 川芎 茴香 各一兩半 木香 茯神 甘草蜜炙各一兩 沈香五錢. 右爲末 用膾臍製酒 煮麴糊和丸如梧子大 空心 溫酒或鹽湯下五七十丸.<入門>	四物湯, 四君子湯
陰腫陰痒陰瘡 陰冷交接出血	洗濕湯	龜甲五兩 黃芩 乾地黃 當歸 芍藥各二兩 乾漆 甘草各一兩. 右剉 水七升煮取一半 去滓 以綿帛蘸湯 以濕瘡處 日二度 濕後拭乾 取疔濕散 糝付瘡上.<得效>	黃芩芍藥湯, 四物湯類

Table 5-3. 「雜病篇」¹³⁻⁵⁾ 에 芍藥甘草湯이 配伍된 方劑의 構成內容

病症	處方	處方構成	構成基本處方
破傷風治法	參歸養榮湯	人參 當歸 川芎 白芍藥 熟地黃 白朮 白茯苓 陳皮 各一錢 甘草 五分. 右剉作一貼 入薑三片棗 二枚 水煎服.<回春>	四物湯, 四君子湯
太陽病	麻黃桂枝湯	桂枝 芍藥 各二錢 麻黃 一錢二分 甘草 一錢 杏仁 八分. 右剉作一貼 入薑五片 棗二枚 水煎服.<入門>	麻黃湯, 桂枝湯
	桂枝湯	桂枝 三錢 白芍藥 二錢 甘草 一錢. 右剉作一貼 入生薑三片 大棗二枚 水煎溫服 須臾啜稀粥一盞 以助藥力 令遍身絳微汗 爲佳 得汗勿再服.<入門>	桂枝湯
陽明病	葛根解肌湯	葛根 柴胡 黃芩 芍藥 羌活 石膏 升麻 白芷 桔梗 各一錢 甘草 五分. 右剉作一貼 入薑三棗二 水煎服.<醫鑑> 一名 柴葛解肌湯.<回春>	清熱解肌湯, 甘桔湯
厥陰病	當歸四逆湯	當歸 白芍藥 各二錢 桂枝 一錢半 細辛 通草 甘草 各一錢. 右剉作一貼 入棗二枚 水煎服.<入門>	桂枝湯
傷寒表證	香葛湯	蒼朮 紫蘇葉 白芍藥 香附子 升麻 乾葛 陳皮 各一錢 川芎 白芷 甘草 各五分. 右剉作一貼 入薑三片 葱白二莖 豉七粒 水煎服.<得效>	香蘇散
傷寒動氣	甘李根湯	李根皮五錢 桂枝一錢半 當歸 芍藥 茯苓 黃芩各一錢 半夏 甘草 各五分. 右剉 作一貼 入薑三片 水煎服.<入門>	桂枝湯
夏暑宜補氣	清氣飲	白朮 一錢二分 人參 黃芪 麥門冬 白芍藥 陳皮 白茯苓 各一錢 知母 香薷 各七分 黃連炒 甘草 各五分 黃柏 三分. 右剉 入薑三 水煎服.<必用>	補虛湯, 四君子湯, 坎離丸
	參薷飲	白朮 一錢半 人參 一錢二分 麥門冬 白芍藥 白茯苓 各一錢 知母炒 陳皮 香薷 各七分 甘草 炙五分 黃芩炒 三分 五味子 十粒. 右剉 入薑三 水煎服.	四君子湯, 生脈散

內傷調補藥	瑞蓮丸	山藥炒 白朮土炒 蓮肉 芡仁各二兩 白茯苓 橘紅 白芍藥酒炒各一兩 人參 甘草各五錢. 右爲末 獐猪肚一箇 洗淨煮爛 搗和藥末爲丸 梧子大 每百丸 空心米飲下 兼服白雪糕.<回春>	四君子湯
陽虛用藥	參芪健中湯	當歸身一錢半 人參 黃芪 白朮 陳皮 白茯苓 白芍藥 生乾地黃酒炒各一錢 甘草五分 五味子三分. 右剉作一貼 入薑三棗二 水煎服.<集略>	補虛湯, 四君子湯
陰陽俱虛用藥	人參養榮湯	白芍藥酒炒二錢 當歸 人參 白朮 黃芪蜜炒 肉桂 陳皮 甘草各一錢 熟地黃 五味子 防風各七分半 遠志五分. 右剉 作一貼 薑三棗二 水煎服.	貞元飲, 玉屏風散
	補益養榮湯	熟地黃一錢半 當歸身一錢二分 白芍藥 白茯苓 白朮 陳皮各一錢 川芎 人參 知母各八分 黃栢七分 甘草五分 五味子九粒. 右剉 作一貼 入薑三片 水煎服.<集略>	四物湯, 四君子湯, 坎離丸
腎虛藥	補腎養脾丸	熟地黃薑汁浸二兩 肉蓯蓉 人參 黃芪蜜灸 白朮 當歸酒洗 白茯苓 山藥各二兩 杜冲炒 破故紙炒 牛膝酒洗 五味子各一兩半 知母 黃栢並酒炒 白芍藥各一兩 肉桂 沈香各七錢半 甘草灸五錢. 右爲末 蜜丸梧子大 溫酒或米飲下百丸.<北窓>	四物湯, 坎離丸
虛勞通治藥	大建中湯	黃芪 附子炮 鹿茸酒蒸 地骨皮 續斷 石斛 白芍藥 人參 川芎 當歸 小草各一錢 甘草灸五分. 右剉 作一貼 入薑五棗二 水煎服.<得效>	四逆湯, 保元湯
勞嗽	知母湯	黃芪蜜灸一錢半 白芍藥 生乾地黃 黃芩 麥門冬 人參 白茯苓 桔梗 知母各一錢 甘草五分. 右剉作一貼 入薑三片 竹葉三片 小麥一撮水煎服.<丹心>	甘桔湯, 保元湯
火嗽	滋陰清化膏	生地黃 熟地黃並酒浸 天門冬 麥門冬各二兩 黃栢鹽酒炒一兩半 白茯苓 山藥 枸杞子 白芍藥酒炒 知母鹽酒炒 玄參 薏苡仁炒各一兩 五味子七錢 甘草生五錢 右爲末 蜜丸彈子大 每一丸 空心嚙化嚥下	坎離丸, 人蔘固本丸 (人蔘代玄參)
消渴有三	生津養血湯	當歸 白芍藥 生地黃 麥門冬各一錢 川芎 黃連各八分 天花粉七分 知母 黃栢 並蜜炒 蓮肉 烏梅 薄荷 甘草各五分. 右剉 作一貼 水煎服.<醫鑑>	四物湯, 坎離丸
消渴通治	滋飲養榮湯	當歸二錢 人參 生地黃各一錢半 麥門冬 白芍藥 知母 黃栢並蜜水炒 各一錢 甘草五分 五味子十五粒. 右剉 作一貼 水煎服.<入門>	生脈散, 坎離丸
黃汗	秦艽飲子	秦艽 當歸 芍藥 白朮 桂皮 赤茯苓 陳皮 熟地黃 川芎 小草各一錢 半夏 甘草各五分. 右剉 作一貼 薑五片 水煎服.<得效>	四物湯, 二陳湯
六經瘧	柴胡桂枝湯	柴胡二錢 桂枝 黃芩 人參 芍藥 半夏各一錢 甘草五分. 右剉一貼 入薑三 棗二 水煎服.<入門>	小柴胡湯, 桂枝湯
瘧瘧	散邪湯	川芎 白芷 麻黃 白芍藥 防風 荊芥 紫蘇葉 羌活各一錢 甘草五分. 右剉作一貼 入薑三葱白三莖 煎露一宿 早晨溫服.<醫鑑>	古防風湯
	鯨甲飲子	鯨甲二錢 白朮 黃芩 草果 檳榔 川芎 陳皮 厚朴 白芍藥各一錢 甘草五分. 右剉作一貼 入薑三棗二梅一 水煎服.<綱目>	平胃散
癰疽五發證	托裏益氣湯	白朮二錢 人參 白茯苓 貝母 陳皮 香附子 白芍藥 熟地黃 當歸各一錢 桔梗 甘草各五分. 右剉 作一貼 水煎服.<入門>	四君子湯
癰疽排膿生肌法	托裏消毒飲	人參 黃芪 白芍藥 當歸 白朮 白茯苓 陳皮 連翹 金銀花各一錢 白芷 甘草各五分. 右剉 作一貼 水煎服.<入門>	四君子湯
求嗣	勝金丹	牡丹皮 藜蘆 人參 當歸 白茯苓 赤石脂 白芷 肉桂 白薇 川芎	四君子湯, 芍歸湯

		玄胡索 白芍藥 白朮各一兩 沈香 甘草各五錢. 右爲末 蜜丸彈子大 每一丸 空心 溫酒嚙下 服二十丸 當有孕.<得效>	
半 産	芍歸補中湯	黃芪 當歸 白朮 杜冲 白芍藥各一錢 乾薑 阿膠珠 川芎 五味子 木香 人參 甘草各五分. 右剉 作一貼 水煎服.<入門>	芍歸湯, 理中湯
子 嗽	百合散	百合 紫菀茸 貝母 白芍藥 前胡 赤茯苓 桔梗各一錢 甘草五分. 右剉 作一貼 入薑五 水煎服.<得效>	甘桔湯
子 懸	紫蘇飲	紫蘇葉二錢半 人參 大腹皮 川芎 陳皮 白芍藥 當歸各一錢 甘草五分. 右剉 作一貼 入薑四片 葱白三莖 水煎服.<良方>	芍歸湯
感 寒	芍蘇散	川芎 紫蘇葉 白芍藥 白朮 麥門冬 陳皮 乾葛各一錢 甘草五分. 右剉 作一貼 入薑五 葱白三莖 水煎服.<濟生>	二賢散
産後虛勞	熟乾地黄散	熟地黄一錢半 當歸 蟹爪微炒 鹿角膠珠 男子 襪布燒存性各一錢 伏龍肝七分半 蒲黃炒 白茯苓 白芍藥各五分 桂心 甘草各二分半. 右剉作一貼 入青竹茹一錢 水煎服.<正傳>	貞元飲
婦人雜病	逍遙散	白朮 白芍藥 白茯苓 柴胡 當歸 麥門冬各一錢 甘草 薄荷各五分. 右剉作一貼 入薑三片 水煎服.<入門>	三白湯
慢驚風	黃芪湯	黃芪二錢 人參一錢 甘草灸五分. 右作一貼 水煎服 加白芍藥一錢 尤妙. 此證 風木旺 必剋脾土 宜先實其土 後瀉其木 是爲神治之法	保元湯

III. 考 察

芍藥과 甘草가 2:1로 配合된 『東醫寶鑑』의 總 57 方 中 「內景篇」¹¹⁾에 16方, 「外形篇」¹²⁾에 8方, 「雜病篇」¹³⁻¹⁵⁾에 33方이 수록되어 있다.

芍藥甘草湯이 配伍된 方劑의 治療領域에 대하여 조사한 결과, 總 57方 中 「內景篇」16方이 神, 血, 聲音, 津液, 胞, 大便門 等 6개, 「外形篇」8方이 眼, 腹, 脇, 皮, 脈, 前陰門 等 6개, 「雜病篇」33方이 風, 寒, 暑, 內傷, 虛勞, 咳嗽, 消渴, 黃疸, 痲瘡, 癰疽, 婦人, 小兒門 等 12개 總 24개 領域에서 活用됨을 알 수 있었다(Table 1).

이 중 婦人門에 使用된 頻度數가 7回(12.3%)로 가장 많았고, 寒門은 6回(10.5%), 大便과 虛勞門에 각 5回(8.8%), 神門에 4回(7.0%), 그 다음은 血, 痲瘡, 胞, 眼, 前陰, 暑, 咳嗽, 癰疽, 消渴 等の 질 환에 活用되고 있음을 알 수 있었으며, 그 밖의 治療領域의 處方引用 頻度數는(Table 1)과 같았다.

芍藥甘草湯이 配伍된 方劑의 病症을 조사해 보

면(Table 2)에서 보는 바와 같았다.

「內景篇」의 各 門을 보면 神에 驚悸, 怔忡, 癩癩, 神病通治藥餌 等이, 血에 嘔血吐血, 通治血病藥餌, 聲音에 聲音出於腎, 津液에 亡陽證, 胞에 調血治法, 帶下治法 等, 大便에 泄證有五, 火泄, 脾泄, 赤白痢, 膿血痢 等이 使用되었다(Table 2-1).

「外形篇」의 各 門을 보면 眼에 內障, 腹에 腹痛通治, 脇에 風寒脇痛, 皮에 麻木, 脈에 脉病藥餌, 前陰에 陰痿, 陰腫陰痒陰瘡陰冷交接出血 等に 使用하였다(Table 2-2).

「雜病篇」의 各 門을 보면 風에 破傷風治法, 寒에 太陽病, 陽明病, 厥陰病, 傷寒表證, 傷寒動氣 等に, 暑에 夏暑宜補氣, 內傷에 內傷調補藥, 虛勞에 陽虛用藥, 陰陽俱虛用藥, 腎虛藥, 虛勞通治藥 等に, 咳嗽에 勞嗽, 火嗽 等に, 消渴에 消渴有三, 消渴通治 等に, 黃疸에 黃汗, 痲瘡에 六經瘡, 痲瘡 等に, 癰疽에 治癰疽大法, 癰疽內托法, 癰疽五發證, 癰疽排膿生肌法 等に, 婦人에 求嗣, 半産, 子嗽, 子懸, 感寒, 産後虛勞, 婦人雜病 等に, 小兒의 慢驚風 等に 活用되고 있음을 알 수 있었다(Table 2-3).

芍藥甘草湯이 配伍된 方劑의 病因·病理를 조사해 보면(Table 3)에서 보는 바와 같았다.

內因으로는 七情에 勞心思慮, 思慮過度 등이, 外因으로는 傷寒, 風寒, 風痰, 太陽病, 陽明病, 厥陰病, 傷寒表證, 傷寒動氣, 夏暑, 感寒 등이 조사되었고, 不內外因으로는 血(心血不足, 鬱熱失血, 血虛有寒), 痰壅, 腎虛, 脾泄, 脾胃濕盛, 虛勞, 血少, 肝腎虛, 血澁, 血氣虛, 虛損, 陰腫陰痒陰瘡, 內傷, 陽虛, 虛勞, 痰火, 消渴, 黃汗, 瘡, 癰疽, 求嗣, 半產, 婦人雜病 등이 조사되어 芍藥甘草湯이 配伍된 方劑는 주로 內傷과 관련된 질환에 많이 응용된 것을 알 수 있었다(Table 3).

芍藥과 甘草 使用量에 따른 方劑를 조사한 결과는(Table 4)와 같았다.

57개의 方劑에서 芍藥과 甘草 使用量은 五分:二分半, 六分:三分, 一錢:五分, 一錢半:七分半, 二錢:一錢, 四錢:二錢, 一兩:五錢, 二兩:一兩 등으로 조사되었다(Table 4). 그 중 一錢:五錢의 使用量이 39회(68.4%)로 가장 많았으며, 그 다음은 二錢:一錢과 一兩:五錢이 각 6회(10.5%), 二兩:一兩이 2회(3.5%), 五分:二分半, 六分:三分, 一錢半:七分半, 四錢:二錢 등이 각 1회(1.8%) 등으로 調査되었다.

39회(68.4%)로 가장 많이 사용된 芍藥과 甘草가 一錢:五錢의 方劑는 滋腎明目湯, 當歸湯, 芍葛湯, 冲和補氣湯, 人參黃芪湯, 清心補血湯, 滋陰寧神湯, 人參救肺散, 補榮湯, 通經四物湯, 胃苓湯, 香砂六君子湯, 參歸養榮湯, 葛根解肌湯, 香葛湯, 甘李根湯, 參芪健中湯, 補益養榮湯, 大建中湯, 知母湯, 生津養血湯, 滋飲養榮湯, 柴胡桂枝湯, 散邪湯, 托裏益氣湯, 芍歸補中湯, 黃芪湯, 保命生地黃散, 清白散, 萬病四苓散, 清氣飲, 參薏飲, 秦芫飲子, 鱉甲飲子, 托裏消毒飲, 百合散, 紫蘇飲, 芍蘇散, 逍遙散 등이 있고, 6회(10.5%) 사용된 二錢:一錢의 方劑는 桂枝附子湯, 黃芩芍藥湯, 麻黃桂枝湯, 桂枝湯:當歸四逆湯, 人參養榮湯 등이, 一兩:五錢이 사용된 方劑는 益榮湯, 加味寧神丸, 瑞蓮丸, 補腎養脾丸, 滋陰清化膏, 勝金丹 등이, 2회(3.5%) 사용된 二兩:一兩

의 方劑는 洗滌湯, 膈膈補天丸 등이, 各 1회(1.8%) 사용된 五分:二分半의 方劑는 熟乾地黃散, 六分:三分이 사용된 方劑는 人參平補湯, 一錢半:七分半이 사용된 方劑는 固腸湯, 四錢:二錢이 사용된 方劑는 芍藥甘草湯 등이었다(Table 4).

芍藥甘草湯이 配伍된 方劑의 構成內容을 조사해 보면(Table 5)에서 보는 바와 같다.

「內景篇」¹¹⁾에 芍藥甘草湯이 配伍된 方劑의 構成內容을 보면 芍藥甘草湯을 基本方으로 驚悸 怔忡 癩癩 등에 活用하는 清心補血湯은 生脈散과 四物湯이, 益榮湯은 當歸補血湯과 保元湯이, 滋陰寧神湯은 四物湯과 四君子湯이, 加味寧神丸은 四物湯 등과 또한 모두에 安神之製가 배합되어 補血, 安神, 滋陰 등의 작용을 하는 것을 알 수 있다. 嘔血 吐血에 活用하는 人參救肺散은 補中益氣湯과 貞元飲이, 補榮湯은 貞元飲이, 保命生地黃散은 河間生地黃散과 동일한 구성을 하며 清熱滋陰하는 藥材가 배합되어 있다. 聲音出於腎에 活用하는 人參平補湯은 四物湯, 二陳湯과 四君子湯類가 배합되어 氣血의 不足과 痰症이 있는 것을 알 수 있다. 亡陽證에 活用하는 桂枝附子湯은 桂枝湯에 附子를 加하여 營衛不足에 陽氣不足을 치료한다. 調血治法에 活用하는 通經四物湯은 四物湯에 桃仁 紅花 蘇木 등을 加하여 瘀血을 除去하며 通經한다. 帶下治法에 活用하는 清白散은 四物湯이 배합되어 理血한다. 泄證有五, 火泄, 脾泄에 活用하는 胃苓湯은 平胃散과 五苓散이, 萬病四苓散은 四苓散이, 香砂六君子湯은 平胃散이 배합되어 濕으로 인한 腹痛泄瀉를 治療하고 赤白痢와 膿血痢에 活用하는 固腸湯은 芍藥甘草湯에 鎮痛하는 罌粟殼을 加하고 黃芩芍藥湯은 痢疾을 치료하는 基本方이 된다. 이 상과 같이 「內景篇」의 方劑는 芍藥甘草湯과 함께 四物湯이 주로 배합되었고 그 밖에 병증에 따라 四君子湯, 二陳湯, 貞元飲, 平胃散, 五苓散 등이 配伍된 것을 알 수 있었다(Table 5-1).

「外形篇」¹²⁾에 芍藥甘草湯이 配伍된 方劑의 構成內容을 보면 芍藥甘草湯을 基本方으로 內障에 活

용하는 滋腎明目湯과 當歸湯은 四物湯類를 配伍하여 血行障礙로 인하여 생기는 병증을 치료하였다. 腹痛通治에 활용하는 芍藥甘草湯은 芍藥 四錢과 甘草 二錢을 사용하여 腹痛을 치료하는 基本方이다. 風寒脇痛의 芎藭湯은 枳芎散과 桂枝湯을 배합하여 風寒으로 인한 氣血凝滯를 치료한다. 麻木에 활용하는 沖和補氣湯은 補中益氣湯이 배오되어 氣虛로 인한 麻木을 치료한다. 脉病藥餌에 활용하는 人參黃芪湯과 陰痿에 활용하는 腦朮補天丸은 四物湯과 四君子湯類가 배오되어 氣血虛로 인한 病症에 사용한다. 陰腫陰痒陰瘡에 활용하는 洗湯湯은 黃芩芍藥湯과 四物湯類가 배합되어 理血과 清熱除濕하며 瘙痒을 治療한다. 이상과 같이 「外形篇」의 方劑는 芍藥甘草湯과 함께 四物湯이 주로 배합되었고 그 밖에 병증에 따라 四君子湯, 補中益氣湯, 枳芎散 등이 配伍된 것을 알 수 있었다 (Table 5-2).

「雜病篇」¹³⁻¹⁵⁾에 芍藥甘草湯이 配伍된 方劑의 構成內容을 보면 芍藥甘草湯을 基本方으로 破傷風治法에 활용하는 參歸養榮湯은 四物湯과 四君子湯이 配伍되어 氣血虛로 인한 病症을 치료하고, 太陽病에 활용하는 麻黃桂枝湯과 桂枝湯은 麻黃湯과 桂枝湯이, 陽明病에 활용하는 葛根解肌湯은 清熱解肌湯과 甘桔湯이, 厥陰病에 활용하는 當歸四逆湯은 桂枝湯이, 傷寒表證에 활용하는 香葛湯은 香蘇散이, 傷寒動氣에 활용하는 甘李根湯은 桂枝湯이 配伍되어 傷寒病에 使用되었다. 夏暑宜補氣의 清氣飲과 參蒿飲은 補虛湯, 四君子湯, 坎離丸과 生脈散이, 內傷調補藥의 瑞蓮丸은 四君子湯이, 陽虛用藥의 參芪健中湯은 補虛湯과 四君子湯이, 陰陽俱虛用藥의 人參養榮湯과 補益養榮湯은 貞元飲, 玉屏風散과 四物湯, 四君子湯, 坎離丸이, 腎虛藥의 補腎養脾丸은 四物湯, 坎離丸이, 虛勞通治藥의 大建中湯은 四逆湯, 保元湯이 配伍되어 氣虛와 陰虛로 인한 病症을 치료하였다. 勞嗽의 知母湯은 甘桔湯과 保元湯이 配伍되어 氣虛로 인한 咳嗽를 치료하였고, 火嗽의 滋陰清化膏은 坎離丸과 人參代玄蔘

한 人蔘固本丸이 배오되어 心身陰虛로 인한 咳嗽를 治療하였다. 消渴의 生津養血湯과 滋飲養榮湯은 四物湯, 坎離丸, 生脈散이 배오되어 陰虛血虛有火로 인한 消渴을 治療하였다. 黃汗의 秦艽飲子은 四物湯, 二陳湯이 배오되어 血虛痰飲으로 汗出을 치료하였고 痲瘡의 柴胡桂枝湯, 散邪湯, 鱉甲飲子은 小柴胡湯, 桂枝湯, 古防風湯, 平胃散을 배오하여 瘡을 치료하였다. 癰疽의 托裏益氣湯과 托裏消毒飲은 四君子湯이 배오되어 氣虛로 인한 癰疽를 치료하였고 求嗣의 勝金丹은 四君子湯, 芍歸湯을, 半產의 芍歸補中湯은 芍歸湯, 理中湯이 子嗽의 百合散은 甘桔湯이 子懸의 紫蘇飲은 芍歸湯이 感寒의 芍蘇散은 二賢散이 배오되었다. 產後虛勞의 熟乾地黃散은 貞元飲이 배오되어 陰血虛를 치료하였고 婦人雜病의 逍遙散은 四逆散類가 배오되어 健脾作用을 한다. 慢驚風의 黃芪湯은 保元湯이 배오되어 氣虛로 인한 驚風에 활용하였다. 이상과 같이 「雜病篇」의 方劑는 芍藥甘草湯과 함께 四物湯이 주로 배합되었고 그 밖에 병증에 따라 四君子湯, 桂枝湯, 甘桔湯, 保元湯, 芍歸湯, 貞元飲 등이 配伍된 것을 알 수 있었다(Table 5-3). 전체적으로 芍藥甘草湯이 配伍된 方劑는 四物湯이 주로 배합되었고 병증에 따라 四君子湯, 桂枝湯, 甘桔湯, 保元湯, 芍歸湯, 貞元飲, 補中益氣湯, 枳芎散, 二陳湯, 平胃散, 五苓散 등이 配伍된 것을 알 수 있었다(Table 5-1, Table 5-2, Table 5-3). 이는 處方에서 芍藥甘草湯이 配伍된 方劑는 주로 內傷疾患의 基本方으로 配合된 것을 알 수 있다.

이상과 같은 結果는 芍藥甘草湯이 配伍된 方劑를 分析하고 病因 病理를 이해하는 것뿐만 아니라 方劑構成에 대한 理論的 根據를 제시할 수 있을 것으로 생각된다.

IV. 結 論

『東醫寶鑑』에서 芍藥甘草湯이 配伍된 方劑 57개

에 대하여 治療領域, 病症·主治, 病因·病理, 各 처방별 一貼當 使用量, 處方構成 等の 資料調査를 통해 다음과 같이 要約할 수 있었다.

1. 芍藥甘草湯이 配伍된 方劑는 총 24개 영역에 사용되었으며, 婦人門에 使用된 頻度數가 7회(12.3%)로 가장 많았고, 寒門은 6회(10.5%), 大便과 虛勞門에 각 5회(8.8%), 神門에 4회(7.0%)로 그 다음을 차지하였다.
2. 芍藥甘草湯이 配伍된 方劑는 총 51病症으로 驚悸, 怔忡, 調血治法, 帶下治法, 泄證, 赤白痢, 腹痛通治, 風寒脇痛, 陰痿, 傷寒表證, 傷寒動氣, 內傷, 陽虛, 陰陽俱虛, 虛勞通治, 痰瘧, 癰疽, 求嗣, 半產, 子嗽, 子懸, 產後虛勞, 婦人雜病 慢驚風 등에서 다양하게 使用되었다.
3. 芍藥甘草湯이 配伍된 方劑의 病因·病理는 內因으로는 七情에 勞心思慮, 思慮過度 등이, 外因으로는 傷寒, 風寒, 風痰, 太陽病, 陽明病, 厥陰病, 傷寒表證, 傷寒動氣, 夏暑, 感寒 등이 조사되었고, 不內外因으로는 血, 痰壅, 腎虛, 脾泄, 脾胃濕盛, 虛勞, 血少, 肝腎虛, 血澁, 血氣虛, 虛損, 陰腫陰痒陰瘡, 內傷, 陽虛, 虛勞, 痰火, 消渴, 黃汗, 瘧, 癰疽, 求嗣, 半產, 婦人雜病 등이 조사되었다.
4. 57개의 方劑에서 芍藥과 甘草 使用量은 五分:二分半, 六分:三分, 一錢:五分, 一錢半:七分半, 二錢:一錢, 四錢:二錢, 一兩:五錢, 二兩:一兩 等이며 그 중 一錢:五分の 使用量이 39回(68.4%)로 가장 많이 사용되었다.
5. 方劑의 構成內容은 四物湯이 주로 配合되었고 病症에 따라 四君子湯, 桂枝湯, 甘桔湯, 保元湯, 芎歸湯, 貞元飲, 補中益氣湯, 枳芍散, 二陳湯, 平胃散, 五苓散 등이 配伍되어 芍藥甘草湯이 配伍된 方劑는 주로 內傷疾患의 基本方으로 配合된 것을 알 수 있었다.

감사의 글

이 논문은 2009년도 상지대학교 연구비 지원(연구년제)에 의한 것임

參考文獻

1. 全國韓醫科大學 本草學教授 共編著. 本草學. 서울:永林社. 2007:583-5, 634-5.
2. 辛民教. 臨床本草學. 서울:永林社. 2000:172-5, 240-44.
3. 申佶求. 申氏本草學(各論). 서울:高文社. 1988:16-20, 85-8.
4. 康秉秀, 金永坂 編著. 臨床配合本草學. 서울:永林社. 1996:94-7, 154-7.
5. 蔡仁植. 傷寒論譯註. 서울:高文社. 1991:33-34.
6. 尹用甲. 東醫方劑와 處方解說. 서울:醫聖堂. 2002:61-2.
7. 康舜洙. 바른 方劑學. 서울:大星文化社. 1996:67-7.
8. 국윤범, 이장천, 김희수. 芍藥甘草湯 및 構成藥物이 氣管支平滑筋에 미치는 影響. 大韓韓醫學方劑學會誌. 2002;제10권 제2호:143-58.
9. 이기옥, 국윤범, 윤용갑. 芍藥甘草湯 및 構成藥物이 鎮痛에 미치는 影響. 大韓韓醫學方劑學會誌. 2003;제11권 제1호:161-70.
10. 이윤석. 芍藥甘草湯의 效能에 관한 연구. 동의생리병리학회지. 2003;제17권 제2호:493-8.
11. 許浚. 『東醫寶鑑』:內景篇. 서울:大星文化社. 1990:108, 121, 147, 169-73, 176, 183, 198, 213, 216-7, 222, 226, 232, 235-6, 255, 276-9, 281, 283, 300, 312, 319, 368-9, 404-5, 408-12, 418-9, 422-3, 447, 450, 484, 506-8, 510, 512-3, 519, 525, 528-33, 539, 543, 551, 553.
12. 許浚. 『東醫寶鑑』:外形篇. 서울:大星文化社. 1990:66, 92, 94, 115, 118, 122, 142, 148, 151, 157-8,

- 189, 195, 212, 218, 244, 265, 272, 303-4, 313-5, 343, 358, 382, 392, 399, 426, 446, 461, 463, 473, 499, 502, 513, 516-7, 520, 524, 539-42, 549.
13. 許浚. 『東醫寶鑑』:雜病編 卷之一~四. 서울:大星文化社. 1990:65-6, 68, 71, 167, 169-70, 172, 179-80, 182-4, 186-7, 194-5, 198, 202, 205-6, 210, 222, 226-7, 244-6, 250, 261, 264-7, 269-70, 273, 288, 294, 296, 310, 315, 319, 329-30, 340-2, 358, 366, 373, 406, 414-6, 421, 440, 447, 454, 459-60, 462, 467, 469-70, 477-8, 497, 503-7, 513-4, 518, 524-5, 527, 529-30.
14. 許浚. 『東醫寶鑑』:雜病編 卷之五~八. 서울:大星文化社. 1990:52, 61, 71, 74, 94, 100-1, 109, 113, 145, 166, 168, 176, 226, 244, 248, 270, 290, 296, 303-4, 308, 312, 319, 321, 330, 364, 369-70, 377, 381-2, 385, 397-8, 405, 425, 451, 459, 461, 463, 488, 499.
15. 許浚. 『東醫寶鑑』:雜病編 卷之九~十一. 서울:大星文化社. 1990:60, 148-51, 163, 168, 173, 177, 186, 194, 196-201, 206, 223, 227-9, 235-7, 295-6, 298, 335, 342-3, 363, 384, 389, 405-6.