

『東醫寶鑑』 外用膏에 대한 考察

홍윤정¹ · 송지창^{1,2} · 심현아¹ · 금경수^{1,2,3} · 이시형^{1,3,4}

¹원광대학교 한의학전문대학원 · ²원광대학교 한의과대학 원전학교실

³한국전통의학연구소 · ⁴원광대학교 익산한방병원

A Study of external ointment treatment in 『Dongeuibogam』

*Hong Yun-jung · Song Ji-chung · Shim Hyun-ah
Keum Kyung-soo · Lee Si-hyeoung*

Objective : The study was performed to investigate prescriptions, herbal drugs, how to make of external ointment treatment in 『Dongeuibogam』 .

Method : I will try to find out external ointment treatment in 『Dongeuibogam』 using a word, Go(膏).

Result : 1. The external ointment has been widely used medical diseases as well as sugical diseases.
2. The same prescription name to have different information was written by other people.
3. Various kinds of medicinal herbs, minerals, animals were used and type of oil or juice was used to dissolve these.
4. Methods to make the external ointment were to grind medicines or melt medicine.
5. The external ointment was used to put in eyes or to push into wound and rubbed the skin.

Conclusion : Go(膏) In 『Dongeuibogam』 are external ointment treatment when they are used at skin. However, they are used as internal medicine in other side so we might be careful to use Go(膏) for medicine.

Key words : Dongeuibogam, ointment, external treatment

1. 서 론

특정 질환이나 개인의 특성에 따라 內服藥을 복용하지 못하거나 기피하는 경우가 있는데, 外用藥은 內服藥으로 인해 발생하는 부작용이 상대적으로 낮고 부작용이 발생하더라도 신속하게 대처할 수 있는 장점이 있다¹⁾. 外用藥은 외치요법에 사용

교신저자 : 이시형. 전북 익산시 신용동 344-2 원광대학교 익산한방
병원(Tel : 063-850-2806, Fax : 063-842-4328,
E-mail: lsh@wku.ac.kr)

• 접수 2010/10/12 • 수정 2010/11/20 • 채택 2010/12/09

하는 약을 말하는데, 피부에 직접 발라 치료하는 약 즉, 소독(消毒), 세정(洗淨), 관장(灌腸) 따위를 하기 위하여 도포·양치질·습포·점안·산포·분무·주입·삽입하는 약품을 모두 포함하고 있다²⁾.

한방에서는 주로 구강을 통한 內服藥의 투여와 鍼灸治療가 시행되고 있는데, 최근에는 약침요법, 훈증요법, 향기요법 등 다양한 방법이 시도되고 있다.

한약의 劑型에는 湯, 膏, 丸, 散, 丹, 酒 등이 있으며 內服과 外用에 두루 쓰이고 있다. 외용약은 단순히 외과 질환에만 국한되어 사용된 것이 아니고 내과 질환에도 쓰인다. 外用藥중에서 膏劑는 자주 사용하고 중요하게 쓰이는 제형이다. 膏劑는 상온에서 고체, 반고체 혹은 반유체 상태의 제품으로 크게 內服膏와 外用膏로 나눈다. 內服膏는 통상 膏滋라 하며 장기간 저장하여 복용하며 흔히 만성질환 혹은 신체 허약자에게 보양하기 위해 쓴다. 外用膏는 膏藥과 藥膏로 구분하는데 膏藥은 배지가 부착된 외집고체의 일종이고, 藥膏는 흔히 軟膏라 하는데 적당한 기초제와 혼합하여 만들며 피부에 직접적으로 작용하게 한다³⁾.

옛날에는 膏劑를 만드는 방법이 까다로워 사용을 기피했으나 요즘에는 제약기술이 발달하여 쉽게 만들 수 있기 때문에 대량생산을 통해 간편하고 편리하게 치료에 사용할 수 있다. '외치법의 宗師'라는 吳尙先은 湯과 丸은 하루에 여러 약을 바

꾸어 여러 번 복용하기 어렵지만 膏를 만들어 붙이면 하루에도 여러 번 바꾸어 붙일 수 있다⁴⁾고 하면서 膏를 이용한 외치요법은 內服藥에 비하여 비교적 광범위한 증상에 사용할 수 있고 증상에 따라 서로 다른 부위에 고약을 사용하여 치료할 수 있기 때문에 치료효과가 좋다고 하였다⁵⁾. 뿐만 아니라 일반적인 內服藥을 이용한 치법보다 간단하고 경제적이라고 하였다⁶⁾.

지금까지 外用藥에 관련된 연구들은 외치요법에 어떤 종류가 있는지를 고찰한 연구⁷⁾와 外治療法의 시대적 고찰에 대한 연구⁸⁾가 있다. 문헌고찰을 통한 연구는 주로 중국의 외치요법을 연구하였고 우리나라의 치료법에 대한 연구는 미비한 실정이다. 따라서 우리나라에서 시행된 외치요법을 알아보기 『東醫寶鑑』을 대상으로 외치요법 중 膏劑와 관련된 내용을 조사하였다. 『東醫寶鑑』은 조선시대 의서이기는 하지만 당시까지 처방과 이론을 종합 정리해 놓은 의서이며, 여기에 수록된 처방은 현재 까지 널리 사용하고 있다. 『東醫寶鑑』에 나오는 膏劑 관련 내용을 처방, 주치병증, 구성약재, 제조 방법, 사용법, 출전별로 고찰해 보고자 한다.

II. 연구 방법

1. 법인문화사에서 간행한 『新對譯 東醫寶鑑』을

- 1) 신광호. 한의외치료법학, 서울:대성출판사. 서울. 2000:3~5.
- 2) 2010년 10월 8일 <http://100.naver.com/100.nhn?docid=117777>.
- 3) 신민교. 임상본초학. 서울:영림사. 2002:119~120.
- 4) 정명용, 김은배, 안상우, 이병욱. 理論駢文의 학술사상에 관한 연구(1). 한국의사학회지. 한국의사학회. 2005;18(1):69
- 5) 정명용, 김은배, 안상우, 이병욱. 理論駢文의 학술사상에 관한 연구(1). 한국의사학회지. 한국의사학회. 2005;18(1):75
- 6) 정명용, 김은배, 안상우, 이병욱. 理論駢文의 학술사상에 관한 연구(1). 한국의사학회지. 한국의사학회. 2005;18(1):75
- 7) 특정 요법에 관한 연구로는 ① 이진아, 김현아, 이원철. 點眼藥에 대한 문헌적 고찰. 한방안이비인후피부과학회지. 대한한방안이비인후피부과학회. 1993;6(1) ② 이병욱, 김상찬, 변성희, 김한균, 지선영. 千金要方에 기재된 藥浴療法에 관한 연구. 대한한의학원전학회지. 대한한의학원전학회. 2004;17(1) ③ 신상문, 노석선. 外科疾患에 사용하는 膏藥의 처방내용에 대한 고찰. 한방안이비인후피부과학회지. 대한한방안이비인후피부과학회. 1994;7(1) 등이 있다.
- 8) 외치요법에 대한 史的 고찰로는 ① 박태열, 고우신. 馬王堆醫書·黃帝內經·金匱要略에 나타난 중국 고대 外治療法. 동의생리학회지. 대한동의생리학회·대한동의병리학회. 2002;16(4) ② 문우상, 김은하, 이병욱. 위진시대의 외치요법에 관한 연구. 대한한의학원전학회지. 대한한의학원전학회. 2005;18(3) ③ 문우상, 이병욱, 안상우, 김은하. 外治療法의 이론과 적용증에 대한 사적 고찰. 한국한의학연구원논문집. 2004;10/2 등이 있다.

저본으로 조사하였다.

2. 원문에서 ‘膏’字가 들어간 문장을 선택하였다.
3. 膏梁厚味, 經穴名(膏肓輸 등), 기름(脂)과 같은 의미로 쓰인 문장은 제외하였다.
4. 膏劑가 內服으로 쓰이거나 散劑나 丸劑는 해당하는 내용은 제외하였다.
5. 주치병증, 구성약재, 제조방법, 사용법, 출전을 중심으로 정리하였다.
6. 동일 처방명에서 처방내용이 다른 경우는 ‘001’, ‘002’ 등으로 구분하였다.
7. 처방명이 없는 경우는 새롭게 이름을 붙이고 처방명에 *로 구분하였다.

Ⅲ. 본 론

1. 洪寶膏

治衄血不止 取藥冷水 調塗後 頂上最絕血路(方見回春)(p.307.)⁹⁾

治一切腫毒 散血消膿 天花粉三兩 白芷 赤芍藥 各二兩 鬱金一兩 右爲末 茶調塗患處 乾則換新[回春](p.1494.)

2. 天南星草烏膏*

痰塊 宜開氣消痰湯 又天南星草烏等分爲末 薑汁調如膏 敷核上 立消[醫鑑](p.378.)

3. 貼臍膏

治大小便不通 甘遂爲末 麩調作糊 貼臍中 及臍下硬處 別煎甘草湯 服之 以通爲度[類聚](p.558.)

治小便癱閉不通 宜貼臍膏(方見大便) 通關散(p.494.)

4. 納臍膏

治噤口痢 危重者 用之立愈 王瓜藤連莖葉經霜者 晒

乾燒灰 香油調納臍中 卽效[醫鑑](p.537.)

5. 迴生神膏

治陰證 大小便不通 數日危急者 用之 非急 勿用牡蠣 陳粉 乾薑炮 各一兩 右爲細末 男病 用女人唾 調手內擦熱 緊掩二卵上 得汗出愈 女病 用男子唾 調手內擦熱 緊掩二乳上 得汗出愈 蓋卵與乳 乃男女之根蒂 坎离之分屬也[海藏](p.558.)

6. 蝸牛膏¹

治大小便不通 蝸牛三枚 連殼搗爲泥 加麝香少許 貼臍中 以手揉按之 立通 無蝸牛 則用田螺壓 試殊效[回春](p.559.)

7. 蝸牛散²

治痔瘡腫脹 作熱如火 蝸牛一箇 入片腦 麝香 各少許 同入瓦器內盛 頓半日 自化成水 取塗痔上 痛止腫消 立愈[得效] ○一名 蝸牛膏 用法同上[入門](p.915.)

8. 硫黃膏

治面上生瘡 或鼻臉赤紫 及風刺粉刺 諸藥不效 生硫黃 白芷 瓜蒌根 膩粉 各半錢 全蠍三箇 蟬殼五枚 莞青七枚去翅足 右爲末 另以香油 黃蠟 和合 如面油 法火上熔熬取下 乃入藥末 在內和勻 每用少許 臨臥洗面後 塗面上 勿近眼 數日赤自消 風刺粉刺一夕 見效[得效](p.598.)

9. 玉容膏

一名 玉容西施膏 塗燥瘡 黃芪 當歸 白芷 川芎 藿香 零陵 香白 檀香 香附子 白斂 白芍藥 白芨 杏仁 各一兩 瓜蒌一箇 龍腦二錢 清油四斤 黃蠟一斤 右除龍腦 並剉浸油中 春五夏三秋七冬十日 日滿 於石

9) 신대역東醫鑑(許浚. 서울. 法仁文化社. 2007년.)의 쪽수를 표시하였으며, 이 후 동일하게 표시하였음.

器煎 候白芷焦黃色 乃去滓 入蠟熔化 又去滓 入龍腦 攪勻密封 用之 冬則蠟減半[袖珍](p.1635.)
治面上燥瘡 及斑點諸刺(方見雜方)(p.599.)

10. 玉容西施膏

一名 玉容西施膏 塗燥瘡 黃芪 當歸 白芷 川芎 藿香 零陵 香白 檀香 香附子 白斂 白芍藥 白芨 杏仁 各一兩 瓜萋一箇 龍腦二錢 清油四斤 黃蠟一斤 右除龍腦 並剉浸油中 春五夏三秋七冬十日 日滿 於石器煎 候白芷焦黃色 乃去滓 入蠟熔化 又去滓 入龍腦 攪勻密封 用之 冬則蠟減半[袖珍](p.1635.)

11. 磨腎膏

消腎膜 蕤仁口含去皮殼一兩 片腦三錢 空青二錢 右合於乳鉢內 研極細盛盒內 旋取少虛 點眼中[得效](p.641.)

白腎旋透 瞳人點點如花 白鱗砌者 此因肝肺伏藏積熱 宜點磨腎膏 後服羚羊角散[得效](p.618)

黑珠上 浮玉色 不疼痛 腎根不紅不宜針割 但服還睛散 點磨腎膏 即愈[得效](p.618)

凡腎自下生上者 爲順 自上而生下者 爲逆 順則易安 逆則難治 宜服車前散 點磨腎膏[得效](p.618)

空青 法木 故色青而入肝 主青盲明目 去腎膜瞳人破者 再得見物其殼 入磨腎膏 神效[本草](p.646.)

12. 花草膏

眼胞皮肉 有似膠凝腫高 如桃李 時出熱淚 乃風毒所注 宜服消風散(方見頭部) 點花草膏¹⁰⁾[得效](p.618)

13. 三光膏

治犯土傷眼 朱砂 雄黃 鵬砂 各等分 右細末 乳汁調塗 盛碗內 覆地上 以艾葉燒烟熏之 至黃色爲度 帶

椀收貯 用時以香油少許 調勻點眼角[醫鑑](p.642.)
犯土傷眼痛 點三光膏[醫鑑](p.620)

14. 地黃膏

治眼被物 撞打腫痛 昏暗 生地黃一合 取汁黃連一兩 黃栢 寒水石 各五錢 右三味爲末 和地黃汁 成餅以紙攤貼眼上 非但撞打 凡風熱赤目熱淚出 皆可用[得效](p.627.)

目被撞打疼痛 無時瞳人被驚 昏暗濛濛 眼眶停留瘀血 宜貼地黃膏 次服石決明散[得效](p.620)

宜服石決明散 救苦湯 以洗眼湯洗之 以五黃膏 地黃膏 貼之效[丹心](p.621.)

此證輕則無妨 重則疼痛而白睛紅花 乃生腎膜 此由五藏積熱 宜貼地黃膏 次服瀉肝散[得效](p.621.)

湯火傷 眼腫痛 不可用冷藥 點之以五行湯 溫洗地黃膏 付之(方見上)[入門](p.634.)

15. 生地黃膏 *

若生腎障 生地黃汁 和大黃末 成膏 帛鋪二寸許 奄眼上 久則易之[得效](p.620.)

16. 五黃膏

治目赤腫痛 黃栢一兩 黃連 黃芩 黃丹 大黃 各五錢 右爲末 每一錢 蜜水調成膏 攤緋絹上 隨左右貼太陽穴 乾則以溫水 潤之[御藥](p.628.)

宜服石決明散 救苦湯 以洗眼湯 洗之 以五黃膏 地黃膏 貼之效[丹心](p.621.)

17. 龍腦膏¹

治小兒胎風 赤爛 龍腦一錢 蕤仁泥二錢半 杏仁七箇 爲泥 右入人乳 研爲膏 點之[醫林](p.642.)

小兒初生 便有此證 至三四歲 雙目紅而弦邊赤爛時

10) 花草膏: 治患眼腫痛澀癢 昏淚羞明 羯羊膽 一枚 飯上蒸熟 上以冬蜜研和 入朱砂末少許 頻研成膏 食後臨臥 匙抄少許含咽 亦可點目, 危亦林. 世醫得效方.

復痒痛 先服消風散(方見頭部) 以湯泡散洗之 以龍腦膏點之[得效](p.621.)

18. 龍腦膏2

治同上(卒聾) 龍腦一分 椒目五錢 杏仁泥二錢半 右爲末 和捻棗核大 綿裹塞耳 日二易[寶鑑](p.663.)

19. 春雪膏1

治目赤腫痛 淚出眇爛 蕤仁去殼皮研壓去油二兩 龍腦二錢半 生蜜六錢 右研勻以銅筋蘸少許點之 治爛弦風 歲久連眶赤爛者 最效[局方](p.641.)

20. 春雪膏2

治眼目赤腫 生翳障 鵬砂三錢 龍腦一錢 朴硝五錢 右合研極細 每用少許 點口中津液 沾入眼中 閉霎時 方開眼淚出效[得效](p.641.)

臉中紅赤而堅硬 眼睛疼痛而淚出 怕日羞明 宜通肝散 若有翳障 點春雪膏[得效](p.622.)

傷寒熱病後 目昏或生翳膜 宜服石決明散(方見上) 點春雪膏(方見下)(p.635)

21. 百點膏

治翳膜 黃連二錢 剉水一椀 煎至半 入防風八分 當歸身 甘草 各六分 蕤仁泥三分 右剉同熬 滴水中不散 絞去滓 入煉蜜少許 再熬少時 令靜心點之 日五七次 臨臥點 尤疾效 有人病翳 六年 以至瞳人 覆雲氣之狀 用此藥而得效[東垣](p.642.)

眼中有膜 自上垂下 遮黑睛 名垂簾膜 望風淚出 怕日羞明 此客邪上衝 用百點膏點之 次服通肝散[得效](p.622.)

22. 南星地黃膏*

治偷鍼 生南星 生地黃 同研成膏 貼兩太陽穴 腫自消[綱目](p.623.)

23. 五膽膏

治眼昏常見黑花 欲成內障 青羊膽一枚 黃牛膽汁一合 熊膽二錢半 鯉魚膽七錢半 烏鷄膽五枚 牛黃五錢 右爲末 先將諸膽相和 次入牛黃末 攪勻銀石器內 慢火熬成膏 食後溫酒調下半錢 仍將少許點眼中[類聚](p.634.)

治眼昏 常見黑花 欲成內障(方見上)(p.643.)

24. 點翳膏

治翳膜 朱砂水飛二錢 鵬砂一錢半 蕤仁二十一粒 爲泥 眞珠爛 石膏 各半錢 熊膽二分半 麝香一分 右爲細末 用好蜜研和於鉢內 蒸得粘磁器 收貯 用秦皮煎湯 調少許以銅筋蘸點 眇頭淚出爲效[直指](p.642.)

25. 蕤仁膏

去翳障 如神蕤仁泥一兩 鵬砂一錢二分 龍腦五分 熊膽三錢 右爲末 入生蜜四兩 調勻盛磁罐 取少許 點之[入門](p.642.)

26. 明鏡膏

治眼目昏花 努肉雲翳腫痛 神效 黃丹水飛一兩 官粉 乳香 硃砂 各五分 鵬砂 銅綠 各三分 沒藥二分 右爲末 煉蜜入水 些少調藥 令勻燒 艾葉熏之 以香油少許 調勻點眼 此神方也[醫鑑](p.642.)

27. 二百味花草膏

治火眼及爛弦風 痒痛流淚 羯羊膽一枚 以蜜滿灌入 朱砂末少許 掛起陰乾 每取一粒 水和點眼 以蜜採百花 羊食百草 故以爲名也[入門](pp.642~643.)

28. 楓膏

治爛弦赤腫流淚 楓葉多取濃煎汁去滓 熬成膏 取以點眼 又楓葉細切 和燒酒蒸絞取汁 點眼 亦效[俗方]

(p.643.)

29. 猪膽膏 *

治外障翳 猪膽一枚 銀石器煎成膏 入龍腦少許 點眼中 仍取猪膽 白皮 曝乾 搥作繩釵 股大燒一頭 作灰 冷點翳上三五度差[得效](p.651.)

30. 蒲黃膏

治耳卒聾 細辛 蒲黃 各五錢 杏仁 神麴 各七錢半 右爲末 杏仁膏 和捻如棗核大綿裹 塞耳日一易[寶鑑](p.663.)

31. 細辛膏

治鼻塞腦 冷清涕不止 細辛 川椒 乾薑 川芎 吳茱萸 附子 各七錢半 皂角屑五錢 桂心一兩 猪油六兩 右煎猪油成膏 先一宿以苦酒浸 前藥取入油煎 附子黃色止 以綿裹塞鼻孔中[入門](p.669.)

32. 辛夷膏

治鼻中瘰肉 窒塞疼痛 辛夷二兩 細辛 木通 木香 白芷 杏仁 各五錢 右以羊髓猪脂二兩 和藥于石器內 慢火熬成膏 取赤黃色 放冷入龍腦 麝香 各一錢 爲丸 綿裹塞鼻中 數日脫落 卽愈[御院] ○小兒鼻流清涕 取此貼顙門上 又塗鼻中[丹心](p.672.)

33. 雄黃定痛膏

治牙痛 大蒜二枚 細辛 焰硝 各三錢 雄黃一錢 猪牙皂角四錠 右爲末 蒜膏搗爲丸 梧子大 每一丸 將綿子裹藥 左邊牙疼放在左耳中 右邊塞右耳良久痛止神效[綱目](p.698.)

34. 禦寒膏

治體虛人 背上惡寒 或夏月怕脫衣 及婦人產後 被風

冷手足冷痛至骨 又治腰痛 生薑半斤 取自然汁 入明膠三兩 乳香 沒藥 各一錢半 銅杓內煎 化移在滾湯內 頓以柳條 攪至成膏 又入川椒末少許 再攪勻用皮紙 攤貼患處 用鞋底烘熱熨之 候五七日脫下 或起小瘡 不妨[醫鑑](p.731.)

35. 丹參膏

治乳癰結核刺痛 及潰後不斂 丹參 赤芍藥 白芷 各等分 剉酒淹二宿 入猪脂半斤 煎令白芷焦黃 則膏成矣 去滓 入黃蠟一兩 攪勻候凝每取少許 塗之[入門](p.764.)

36. 如聖膏1

治難產 及死胎不下 十分危急者 巴豆十六箇去殼 葶麻子四十九粒去殼 麝香二錢 同搗如泥 攤絹上帛 貼臍上一時 產下卽洗去[入門](p.1665.)

產後瘀血 上攻忽兩乳伸長 細小如腸直 過小腹痛 不可忍 名曰乳懸 危證也 川芎 當歸 各一斤 濃煎湯 不時溫服 再用二斤 逐旋燒烟安在病人面前卓子下 令病人曲身 低頭 將口鼻 及病乳常吸烟氣 未甚縮 再用一料 猶不復舊 則用如聖膏 貼頂上(方見婦人)[入門](p.766.)

兒之初生 惡血流入衣中 衣爲血所脹塞 故不能下 須臾衝上逼心 卽死 急服奪命丹 貼如聖膏(方見上)(p.1667.)

產後陰戶突出 四物湯(方見血門) 加龍骨(無則用五倍子) 連用二貼 外以香油和湯 洗患處 且取如聖膏(方見上) 貼頂上[入門](p.1681.)

37. 如聖膏2

一方 葶麻子去皮一兩 雄黃二錢 同研成膏 塗右腳心 纔產速 洗去否 則腸出 用此膏 塗頂上腸 自入 亦名如聖膏[得效](p.1665.)

盤腸產 謂孕婦臥產時 子腸先出 兒卽隨產 治法頂上貼 如聖膏(方見下)(p.1661.)

38. 如聖膏3

歌曰 紫癩 白癩 兩般風 附子 硫黃 最有功 薑汁調勻 茄蒂 蘸擦來兩度 更無蹤 ○右附子 硫黃 等分爲末 以茄蒂 蘸醋 點藥末 擦之 紫癩用紫茄 白癩用白茄[得效](p.807.)

39. 如聖膏4

紫癩 白癩 …… 丹溪方 用白附子(p.807.)

40. 代灸塗臍膏

治下元虛寒 臍腹冷痛 大附子 馬蘭子 蛇床子 木香 肉桂 吳茱萸 各等分 右爲末 入白麵薑汁 調成膏 作片 貼臍上以帛包繫[醫林](p.780.)

寒痛 宜厚朴溫中湯 桂香散 溫胃湯(方見胸部) 沈香磨脾散 酒煮當歸丸(方見胞門) 代灸塗臍膏(方見臍部) 玉抱肚(p.770.)

治痼冷 臍腹痛 附子 馬蘭子 蛇床子 吳茱萸 肉桂 木香 右細末 用白麪一匙 薑汁 調成膏 攤紙上圓三寸許 貼臍下關元氣海 自晚至曉 其力可代灸百壯[海藏](p.1140.)

41. 代灸膏

貼腰眼穴(方見寒門)(p.786.)

42. 琥珀膏1

治同上(積塊) 大黃 朴硝 各一兩爲末 大蒜 搗爲膏 和勻作片 貼之[丹心] ○一方 加麝香五分 名硝黃膏[入門](p.1368.)

肝火盛 兩脇痛 不得伸 舒先以琥珀膏(方見積聚) 貼痛處 却以生薑湯 吞下蜜丸 當歸龍薈丸(方見五藏) 最妙 此藥蜜丸 乃治脇痛[丹心](p.791.)

左脇痛 先以琥珀膏 貼痛處(方見積聚) 却以當歸龍薈丸 熱薑汁吞下[入門](p.794.)

43. 琥珀膏2

琥珀一兩 丁香 木香 各七錢半 木通 桂心 當歸 白芷 防風 松脂 朱砂 木鱉子 各五錢 麻油一斤 右除琥珀 丁香 木香 桂心 朱砂 爲末 外其餘並剉浸油三宿 慢火煎攪 候白芷焦黃色 漉出次下 松脂溶化 濾去滓 再熬下黃丹一斤 以柳篋不住 手攪令黑色 滴水中成珠 乃入琥珀 等五末 攪勻候 凝作片 聽用[局方](p.1634.)

療癩惡瘡 …… 初起未破 十香膏 琥珀膏(二方見雜方) 常貼之 可自消[精義](p.1542.)

44. 硝黃膏

一方 [琥珀膏] 加麝香五分 名硝黃膏[入門](p.1368.)

45. 蜘蛛膏 *

大蜘蛛一箇 鹽泥作一窠 包裹蜘蛛煨紅 放冷取蜘蛛 研細入輕粉一字 醋調成膏 夕付腋下 明日登廁 必瀉下黑汁 臭穢於僻 處理之[三因](p.795.)

46. 爐灰膏

點黑痣 卽去 最妙 用饗糖爐內 灰一升半 風化石灰一升 炒紅以竹箕盛貯 用滾湯三椀 慢慢淋 自然汁一椀 鍋盛慢火 熬如稀糊 先下巴豆末 次下蟾酥各二錢 白丁香末五分炒 石灰末一錢 攪勻再熬如乾麪糊 取起 俟 冷磁罐盛貯 勿令泄氣 每用時以簪頭 挑少許 放指甲上研 呵口氣 調勻如泥 將患處用鍼撥開 以藥點之卽效[入門](p.807.)

治一切惡瘡 除去瘀肉 最妙(方見雜方)(p.1569.)

臃瘡 …… 內外通用爐灰膏(方見雜方) 點去瘀肉後貼黃蠟膏[入門](p.1559.)

治癰疽惡瘡 內點去瘀肉 最妙 用饗糖爐內灰(無則桑柴灰代之)一升半 風化石灰一升炒紅 以箕子盛貯 用滾湯三椀 慢慢淋自然汁一椀許 銅鍋盛慢火 熬如稀糊 先下巴豆末 次下蟾酥各二錢 白丁香末五分 石灰炒

一錢 攪勻再熬如乾麪糊 取起候 冷磁罐盛貯 勿令泄氣 每用時以簪頭 挑少許放指甲上 研呵氣 調勻如泥 用鍼撥開患處 以藥點之 勿點好肉 及眼上[入門](p.1636.)

47. 金絲膏

金絲膏 主風濕 筋寒諸病 可外貼之(方見丹心)(p.830.)

48. 黃蠟膏1

治冬月 手足皸裂 作痛 清油五錢 慢火煎沸 入黃蠟一塊 再煎 候熔 入胡粉 五倍子末 各少許 熬令紫色爲度 先以熱湯 洗患處 火上烘乾 用藥付上以紙貼之 其痛立止 入水亦不落[得效](p.842.)

49. 黃蠟膏2

治內外腫瘡 香油一兩 入油髮如梅大 熬消化 入白膠香三錢 黃蠟一兩 熔化入龍骨 赤石脂 血竭末 各三錢 攪勻 候冷 盛磁器 每用捏作薄片 貼瘡上 絹帛縛定 三日後 翻過貼之[入門](p.1560.)

腫瘡 …… 內外通用 爐灰膏(方見雜方) 點去瘡肉後 貼黃蠟膏[入門](p.1559.)

50. 黃蠟膏3

治諸瘡 能生肌 香油 黃蠟 松脂 各等分 右熔化 待凝貼之 加油髮灰 尤妙[俗方](p.1570.)

凡治惡瘡 令生肌 宜用生肌散 翠霞散 黃蠟膏(三方見上)[入門](p.1570.)

痛甚者 內服乳香定痛散(方見上) 隨以熱酒盡量而飲 外貼 黃蠟膏(方見諸瘡) 有血瘀壅腫 先刺出惡血 然後乃貼膏藥[入門](p.1585.)

51. 三聖膏1

治髭髮脫落 能令再生 附子 蔓荊子 柏子仁 各五錢

右爲末 烏鷄脂 和勻 搗乾 置瓦合內封固 百日取出 塗落處 三五日 卽生新髮[綱目](p.867.)

52. 三聖膏2

貼積塊風化 石灰半斤爲末 瓦器炒 令淡紅色 提出候熱稍減 次下大黃末一兩 就爐外炒 候熱減 入桂心末五錢略炒 入米醋 熬成黑膏 厚紙攤開 貼患處[入門](p.1368.)

53. 外染烏雲膏

五倍子製五錢 銅末製二錢 白礬 白鹽 各一錢半 沒石子二箇 麪炒黃色 右爲末 濃茶調重湯煮 見黑色 如上法 用卽黑[種杏](p.868.)

54. 藜蘆膏

治諸努肉 如菌突出 藜蘆爲末 豬脂調和塗之 一日一易 努肉自入[入門](p.892.)

55. 秘傳神應膏

治痔漏如神 片腦 熊膽 血竭 牛黃 乳香 沒藥 各五分 右爲末 蝸牛取肉 搗成稀膏 每夜洗淨拭乾 將此膏 搽上患處 數遍卽愈 宜磁罐收貯 不要乾了[回春](p.907.)

56. 辰砂膏

痔漏塞竅 信砒一錢 白礬二錢 密陀僧 辰砂 各五錢 右先研 信砒細鋪鍋底 次用礬末 鋪砒上火煨烟盡爲度 次將陀僧 辰砂研細 白糕 和勻作尖挺子如小麥大取一粒 納漏孔內 去敗肉盡後 貼生肌散[丹心](p.908.)

57. 熊冰膏1

治五十年久痔 及一切諸痔 痔漏 脫肛腫痛 絕勝他藥

熊膽二分半 片腦半分 研勻 白雄鷄膽三箇 取汁 調勻 以鷄羽 蘸塗痔上 先以藥水洗淨 乃上藥神效[入門](p.914.)

58. 熊冰膏2

又方治諸痔 雄鷄膽 片腦研勻 塗之[綱目](p.914.)

59. 熊膽膏(熊冰膏)

一方 熊膽 片腦 各少許 井水研調塗痔上 名曰熊膽膏[得效](p.914.)

60. 痔藥膏子

治外痔 及反花痔 脫肛腫痛 膿水不止 柴灰淋濃 汁兩椀 熬至一椀 却入草烏片 大黃片 各二錢 慢火熬至半椀 入甘草一錢 數沸 下淨石灰末半匙 略沸三五次 用絹兩重 濾過再熬成膏 候冷 入膽礬五分 研極細 瓦器盛貯 臨用 入龍腦末少許 和勻以銀篋 蘸藥塗付 日一次重者 三五次 先以藥水洗 乾乃塗之 神效[綱目](p.915.)

61. 田螺膏1

治痔瘡 腫痛 坐臥不得 諸藥不效 惟此極妙一點即好 大田螺八九箇 鍼破 頂蓋入白礬末少許 置地上尖底埋土中 其頂蓋仰天 經一宿 次日取 蓋上水汁 以鷄羽塗痔上 五七次即消[種杏](p.915.)

62. 田螺膏2

治痔瘻 田螺一箇 挑開蓋 入片腦少許 過一宿 先以冬瓜煎湯 洗後 取藥塗之[丹心](p.915.)

63. 皂角膏*

欲吐風涎 取皂角 以漿水浸 春秋四日 夏二日 冬七日 揉去渣熬爲膏 攤紙上陰乾 用時以水化開灌入鼻

內 良久涎出爲效 若吐多欲止之 飲溫鹽湯 一二口即止[入門](p.1003.)

64. 天仙膏

治卒中風 口眼喎斜 南星大者一箇 草烏大者一箇 白芨二錢 白殭蠶七箇 右爲末 生鱈魚血 調成膏 付喎處 覺正便洗去[得效](p.1034.)

65. 水調膏

治破傷風 發熱紅腫 風邪欲傳 經絡而未深入者 杏仁研爲泥 白麪等分 新汲水 調成膏 塗傷腫處 卽腫消熱退 神驗[醫鑑](p.1058.)

66. 禦風膏

治中風 口眼喎斜 取子去殼 搗爛 右喎塗左 左喎塗右 ○一方研塗在 手心以一孟子置在 手心 草麻子 上用熟水 置孟中 候口眼正 則急去之 左右如上法 用[本草]名禦風膏(p.1063.)

67. 五仙膏

治一切痞塊 積聚 癰疾 大黃 皂角 生薑 生葱 大蒜 各半斤 右共搗爛 水煎取汁去渣 再熬成膏 黑色爲度 攤絹帛上 先以鍼刺患處後 貼膏藥[回春](p.1368)

68. 貼痞膏

水紅花子二錢 大黃 朴硝 山梔 石灰 各一錢 酒醪一塊 鷄子 大共搗成膏 用布攤開貼痞塊上 再用湯 瓶熨手帕勒之 三日後 揭起肉黑如墨 是其效也[入門](p.1368.)

69. 塗臍膏

治水腫 小便絕少 地龍生研 豬苓 甘遂 鍼砂 各五錢 右爲末 搗葱涎調成膏 敷臍中約一寸 以絹帛束之 以

小便多爲度 日兩易之[得效](p.1380.)

70. 外敷神膏

大黃 朴硝 各四兩 麝香一錢 爲末 每二兩 和大蒜搗成膏 敷患處[入門](p.1396.)

71. 涌泉膏

治癰疽 軟而瘡頭不破 或已破而瘡頭腫結無膿者 斑貓去毒焙 右爲末 研和蒜膏 如小豆許 點在膏藥中 准瘡口處 貼之 少頃膿出 卽去藥[直指](p.1489.)

72. 驢蹄蕎麥膏 *

隔皮 取膿法 ○驢蹄肉焙 蕎麥粉炒 各一兩 白鹽五錢 草烏四錢 右爲末 水調作餅 慢火灸微黃色 去火毒爲末醋 調成膏 攤厚紙上貼患處 水自毛孔而出 其腫自退 諸般腫毒 皆效[入門](p.1489.)

73. 去水膏

癰疽破穴後 誤入諸毒水以致癢痛 砂糖 糯米粉 各七錢半 甘草生末二錢半 右入熟水少許爲膏 攤絹上貼之 毒水自出 驢馬汗及尿糞一切毒水 皆治之[直指](p.1489.)

74. 巴豆膏

巴豆去殼炒焦研如膏 如發背中央肉死 塗之卽腐未死 塗之生肌惡瘡腫瘡 久不收斂 內有毒根 以紙撚蘸藥納之根 去卽斂 如元氣虛弱 毒氣散 漫中央肉死 急服大補之劑中 塗三四寸許 至五六日 赤黯之界 自裂紋如刀割狀 中央漸潰 若脾胃大虛 肉不知痛急 補脾胃肉 多復生[入門](p.1491.)

75. 神異膏1

露蜂房 杏仁 各一兩 黃芪七錢半 蛇退鹽水洗淨 玄

參 各五錢 亂髮 鷄子大 香油 十兩 黃丹五兩 右先將油 及髮銚中熬 候髮烊盡 入杏仁 候杏仁黑色 綿濾去滓 乃入黃芪 玄參 熬一二時 稍停 入蜂房 蛇退攪熬至紫黑色 又濾去滓 慢火熬 下黃丹 急攪千餘轉 滴水不散膏卽成矣 磁器收貯 用治諸般癰癤毒[正傳](p.1635.)

癰疽 瘡口久不合 肉白而膿血少 乃氣血不潮于瘡 冷滯而然 陳艾葉濃煎取湯 逐日溫洗 仍以白膠香燒烟熏之 神異膏貼之(方見雜方)[精要](p.1493.)

治發背 癰疽 及諸般惡毒 瘡癤 貼之 其效如神 ○膏藥 甚多 效驗 無出于此(方見雜方)(p.1494.)

76. 神異膏2

治同上(一切瘡疥) 全蠍七箇 皂角二錢 巴豆去皮七箇 蛇床子末三錢 雄黃另研三錢 輕粉一字 清油一兩 黃蠟半兩 右先用全蠍 皂角 巴豆 入油 煎變色 去三味 入蠟熔化放冷 入雄黃 蛇床 輕粉 和勻成膏 先以藥水 洗瘡拭乾後 乃上藥擦之神效[得效](p.1553.)

77. 乳香膏

治背瘡 初發赤腫而高 乳香一兩 青薄荷葉四兩 右研勻 罨患處 青絹蓋之 如乾新水潤之 令熱毒消散 減疼免牽引[涓子](p.1494.)

78. 水澄膏

治癰瘡 熱毒 腫痛 黃連 黃栢 白芨 白斂 各四錢 雄黃一錢 乳香 沒藥 各五分 右末水調鷄羽 掃上腫處 [丹心](p.1494.)

79. 沈水膏

治癰疽 發背 排膿 斂毒 大南星七錢半 白芨 白芷 赤小豆 半夏 生貝母 各五錢 木鱉子仁 乳香 沒藥 各二錢半 雄黃一錢 右爲末 蜜水調付紗貼[直指](p.1494.)

80. 三神膏

治癰疽 發背 草麻子去殼四十九枚 陳醋一椀半 鹽一撮 右同入鍋中熬之 槐枝 攪成膏 先以米泔 洗瘡 搽上留頂 未成膿 即消已 成膿 即出膿[醫鑑](p.1494.)

81. 萬應膏

大黃 黃芩 各二兩 白斂 黃蠟 各一兩 黃柏 芍藥 白芷 黃芪 木鱉子仁 杏仁 當歸 白芨 生地黃 官桂 玄參 沒藥 乳香 各五錢 黃丹一斤 香油二斤八兩 右十四味 剉浸油三宿 慢火熬以柳枝攪 以白芷焦黃色爲度 綿濾去滓 入黃丹 再熬滴水 成珠 乃入乳沒 蠟熔化 攪勻收貯盛器 埋土中 七日取出 攤用治一切癰腫久瘡[精義](p.1635.~p.1636.)

治一切瘡疽 初發焮腫 或老瘡不差 亦令收斂 早合貼之神效(方見雜方)(p.1494.)

82. 靈應膏

白麥飯石火煨醋淬十餘次研 令極細 鹿角燒存性 白斂 並爲細末 右取石末 白斂末 各二兩 鹿角末四兩 並要極細 不細則反痛 取好米醋 入銀石器 煎令魚眼沸 却入三味藥末 竹篋子 不住手攪熬 一二時 稀稠得所傾出 候冷 先以豬蹄湯 或藥水洗 去膿血 挹乾 鵝翎拂藥 塗四圍 凡赤處盡塗之 但留一口 如錢 大以出膿血 如藥乾以醋拂濕 初便一日洗 換十日 後兩日一換 其效如神治癰疽 惡瘡 瘰癧 結核 乳癰[精要](p.1636.)

治五發 癰疽 惡瘡 瘰癧 結核 乳癰 貼之 則未成膿者 自消 已成膿者 便潰 惡肉易去 新肉早生 其效如神(方見雜方) ○一名 麥飯石膏[精要](p.1495.)

83. 麥飯石膏*

白麥飯石火煨醋淬十餘次研 令極細 鹿角燒存性 白斂 並爲細末 右取石末 白斂末 各二兩 鹿角末四兩 並要極細 不細則反痛 取好米醋 入銀石器 煎令魚眼

沸 却入三味藥末 竹篋子 不住手攪熬 一二時 稀稠得所傾出 候冷 先以豬蹄湯 或藥水洗 去膿血 挹乾 鵝翎拂藥 塗四圍 凡赤處盡塗之 但留一口 如錢 大以出膿血 如藥乾以醋拂濕 初便一日洗 換十日 後兩日一換 其效如神治癰疽 惡瘡 瘰癧 結核 乳癰[精要](p.1636.)

治五發 癰疽 惡瘡 瘰癧 結核 乳癰 貼之 則未成膿者 自消 已成膿者 便潰 惡肉易去 新肉早生 其效如神(方見雜方) ○一名 麥飯石膏[精要](p.1495.)

84. 太乙膏

治五發 癰疽 一切惡瘡 及蛇虎犬蝎 并湯火 刀斧 打撲損傷 可內服外貼 ○若作丸服之 則蛤粉爲衣 ○一名 神仙太乙膏(方見雜方)(p.1495.)

85. 神仙太乙膏[太乙膏]

玄參 白芷 當歸 肉桂 赤芍藥 大黃 生地黃 各一兩 剉浸 麻油二斤 春五 夏三 秋七 冬十日 慢火煎 令白芷焦黃色 去滓 下黃丹一斤 極攪勻 滴水中成珠 乃候凝 作片聽用[局方](p.1634.)

治五發 癰疽 一切惡瘡 及蛇虎犬蝎 并湯火 刀斧 打撲損傷 可內服外貼 ○若作丸服之 則蛤粉爲衣 ○一名 神仙太乙膏(方見雜方)(p.1495.)

86. 雲母膏

雲母煨硝 甘草各四兩 槐枝 柳枝 陳皮 桑白皮 側柏葉 水銀 各二兩 川椒 白芷 沒藥 赤芍藥 肉桂 當歸 鹽花 黃芪 血竭 菖蒲 白芨 芎藭 木香 白斂 防風 厚朴 麝香 桔梗 柴胡 松脂 人參 黃芩 蒼朮 草龍膽 合歡 乳香 附子 茯苓 高良薑 各五錢 黃丹十四兩 清油二斤半 右除雲母 煨硝 血竭 沒藥 乳香 麝香 黃丹 鹽花 外餘藥剉 浸油中 七日後 文火煎 候白芷 附子 焦黃色 以布絞去滓 再熬後 下黃丹等 八味 細末 以柳木篋 不住手 攪直至膏 凝滴水中 成珠爲度 傾在磁器內 彈水銀在上 每用刮去水銀 凡癰疽 瘡腫

外貼 內服 神效[局方](p.1635.)

治一切癰疽 惡瘡 腫毒 折傷 瘰癧 骨疽 內疽 乳癰 肺癰 腸癰 並可外貼內服(方見雜方) ○凡五發 及發背 外以敗蒲煎水 洗瘡貼之 又取一兩 作丸 梧子大 溫酒吞下三十丸 瘰癧 骨疽 亦如之 腸癰 作丸 甘草湯吞下 下膿血 即愈 一切瘡疽 外貼立差 忌食羊血 [局方](p.1495.)

87. 善應膏

黃丹八兩 白膠香 乳香 沒藥 並另研當歸 白芷 杏仁 大黃 草烏 川烏 赤芍藥 檳榔 生乾地黃 川芎 瀝青 另研亂髮 各一兩 右香油一斤 浸藥三宿 慢火熬至黑色 再入葱白 亂髮煎 少時濾去滓 再上慢火熬却入黃丹 以柳篋 不住手攪滴水 成珠 不散乃入乳沒膠香十分 攪勻盛器沈水中 三日取出 聽用治諸般惡瘡腫毒及諸傷[得效](p.1636.)

治諸般腫毒 惡瘡 發背 腦疽 瘰癧 打撲 閃肭 金瘡 杖瘡 蛇虫 犬馬 咬疥 癬等疾 並外貼 內服 ○內疽 肺癰 腸癰 作丸 如上法服(方見雜方)(p.1495.)

88. 糯米膏1

淨糯米三升 入磁盆內 於端午前 四十九日 以冷水浸之 一日兩度 換水 勿令米碎 至端午日 取出用絹袋盛之 風乾 每旋取少許 炒黑爲末 冷水調成膏 量瘡大小貼之 絹帛包定直 候瘡愈爲度 乾則換 常令濕爲妙[入門](p.1495.)

89. 糯米膏2

治撲傷 筋斷 骨折 糯米一升 皂角切碎半升 銅錢百箇 同炒至焦黑 去錢 右爲末 酒調膏 貼患處 神效[綱目](p.1582.)

90. 蟾蜍膏

治附骨疽 久不差 膿汁敗壞 或骨從瘡口出 大蝦蟆一

枚 亂髮 鷄子大 豬脂 四兩 右以豬脂 煎二物 令稠 去滓 凝如膏貼之 先以桑白皮 烏豆煎湯 淋洗瘡口 拭乾然後 却貼之[得效](p.1506.)

初起 宜漏蘆飲子 五香連翹湯(方見上) 疎下之 次用 內消升麻湯 在尻臀 宜內托羌活湯(方見上)在腿內 羌活防己湯 在腿外 托裏黃芪湯 黃連消毒飲(方見上) 潰後久不愈 宜蟾蜍膏 赤朮元平肌散[入門](p.1505.)

91. 大蒜膏*

癰疽灸法 ○若十數頭作一處 生者即用大蒜 研成膏 作薄餅 鋪頭上 聚艾于餅上 灸之[三因](p.1520.)

灸疔疽法 ○大蒜爛搗成膏 塗瘡四圍 留瘡頂 以艾炷灸之 以爆爲度 不爆難愈 灸百壯無不愈[正傳](p.1521.)

92. 陶潛膏

治癰毒 及疔腫 垂死 菊葉搗取汁飲一升 神驗 ○又取莖葉 塗疔疔上 亦效 名曰陶潛膏[醫鑑](p.1522.)

93. 玉脂膏

治同上(治鵝掌癬) 牛乳 柏油(無則鵝脂代之) 香油 黃蠟 各一兩 熔化 乃入胡粉二錢 輕粉一錢半 麝香五分 右爲末 入內攪勻 抹癬上 火上烘擦 再烘再擦如神[醫鑑](p.1537.)

94. 蟾酥膏

蟾酥如大豆許 白丁香十五枚 巴豆肉五粒 寒水石 寒食麪 各少許 右各另研 合和再研 蜜丸菉豆大 每一丸 或二丸 三丸 納入鍼竅中 如膿未盡 再納數丸 以膿盡爲度[正傳](p.1542.)

95. 綠雲膏

黃連 大黃 黃芩 玄參 黃柏 木鱉子肉 各一錢 右剉 香油一兩同煎 焦色去滓 入松脂五兩 再煎成膏 濾入

水中 扯拔如金色 再熬放溫入猪膽三箇汁 銅綠醋浸一宿 去滓三錢 攪勻如常 攤貼如瘡口不乾 加乳香 沒藥 輕粉 尤妙[正傳](p.1542.)

96. 金寶膏

去腐肉 惡肉 不傷良肉 桑柴灰五椀 以沸湯十椀 淋濾取汁 穿山甲煨二兩 信砒一錢 杏仁七枚 三味同研細 生地黃二兩 朱砂一錢 輕粉 麝香 各半錢 右將灰汁 下鍋煎 濃下甲末等 及地黃汁 候焦乾 下麝香 次下輕粉 次下朱砂 候將成膏 下炒石灰末一兩 以成塊子 收入罐內 勿見風 每取付核上 再付 即去 舊藥并靨即效[正傳](p.1542.)

97. 十香膏

沉香 丁香 白檀 甘松 鬱金 各五錢 剉入 麻油一斤 中浸七日 却入鑊內 慢火 養五日後 以文武火煎 二三十沸 用綿濾去滓 拭鑊下了煉油 入黃丹 以柳篋子不住手攪 候色黑 滴水中 成珠然後 乃入乳香 木香 白膠香 龍齒 蘇合油末 各五錢 麝香末二錢半 攪勻三五遍 候凝 作片 用時攤紅絹上貼之[聖惠](p.1634.)

瘰癧惡瘡 …… 初起未破 十香膏 琥珀膏(二方見雜方) 常貼之 可自消[精義](p.1542.)

98. 化瘤膏

治肉中腫起生瘤 漸大 白斂一兩 大黃 川芎 赤芍藥 黃芩 黃連 當歸 白礬 各五錢 吳茱萸二錢半 右爲末 鷄子黃 調勻攤帛 貼之[類聚](p.1547.)

99. 南星膏

治癭瘤 生天南星大者一箇 細研滴醋三五點爲膏 先將鍼刺瘤上 却以藥攤紙上貼之 頻貼取效 如無生者 乾者爲末 醋調用之[得效](p.1548.)

100. 南星膏

南星膏加味方: 南星膏 …… 又方南星 草烏爲末 薑汁調付之 亦佳[醫鑑](p.1548.)

101. 雄黃膏

治久年冷癩 油髮灰 黃蠟 各五錢 雄黃末 硫黃末 各二錢半 香油二兩 右和勻燐火候 成膏貼之[直指](p.1550.)

102. 麻豆膏1

通治諸癬 麻油二兩 入巴豆肉 葶麻子肉 各十四粒 斑猫七粒 熬煎至枯黑色去滓 却入白蠟五錢 蘆薈末三錢 攪勻成膏 塗擦之[入門](p.1553.)

103. 麻豆膏2

遍身 生癬 獨莖 羊蹄狼 另搗白礬末 以米醋調成膏 塗擦之 加輕粉 黃丹 尤妙[丹心](p.1553.)

104. 蝮猫膏

治牛皮癬全蝮斑猫各十枚巴豆肉二十枚香油一兩右同熬候色焦者先去之去盡三物了乃入黃蠟一錢候熔收貯朝擦暮愈不損皮肉[綱目](p.1553.)

105. 神應膏

治白禿 頭瘡 羊糞燒存性 爲末 用鴈油調塗一次 即愈[醫鑑](p.1556.)

106. 黃栢膏[神應膏]

一名 護眼膏 一名神應膏 黃栢一兩 甘草四兩 紅花二兩 菘豆粉一兩半 右爲末 清油調從耳前 至于兩眼四畔厚 塗之[錢乙](p.1792.)

107. 護眼膏[黃栢膏]

一名 護眼膏 一名神應膏 黃栢一兩 甘草四兩 紅花二兩 菘豆粉一兩半 右爲末 清油調從耳前 至于兩眼四畔厚 塗之[錢乙](p.1792.)

痘出太盛 恐入眼爲害 宜消毒飲 加酒炒芩連 外用護眼膏[入門](p.1794.)

眼腫突如桃者 貼護眼膏(方見上) 眼腫不開 黃連末調鷄子清 貼兩太陽穴 及兩足心[入門](p.1794.)

108. 如聖黑膏

治小兒白禿頭瘡 豆豉半升 草龍膽 蕪荑各二錢半 右燒存性爲末 香油半斤 熬至四兩 下藥調勻 付之 神效[得效](p.1556.)

109. 磨風膏

治陰蝕瘡 蛇床子五錢 大風子十四箇 杏仁二十箇 枯白礬 樟腦 各二錢 川椒 輕粉 水銀 各三錢 雄黃一錢半 銀硃一錢 右爲末 生麻油和丸 彈子大 每用少許 呵洋遍擦之[入門](p.1558.)

血風瘡 與腎臟風瘡 相類 乃三陰經風熱 鬱火血燥所致 瘙痒不常 膿水淋漓 潮熱盜汗 宜四物湯(方見血門) 加浮萍 黃芩 或當歸拈痛湯(方見足部) 外治 磨風膏(方見上) 大馬齒膏 塗之[入門](p.1562.)

110. 龍骨膏

治外賺瘡 龍骨 乳香 沒藥 密陀僧 各二錢 海螵蛸一錢半 皂角子五箇 燒存性 右爲末 用綿紙兩重 以鍼插亂孔 香油調藥 夾內縛貼瘡上 隔日翻貼之[入門](p.1560.)

111. 馬齒膏1

治賺瘡 馬齒莧煎取汁一釜 入黃蠟五兩 再熬成膏 塗之[入門](p.1560.)

112. 馬齒膏2

馬齒莧 ○主小兒疳痢 煮熟和五味 空心食之 ○痘後癩痕 及白禿瘡 馬齒莧汁 熬膏塗之 妙[本草](p.1802.)

113. 窯土膏

治外賺瘡 久年窯竈土 或竈心黃土 黃栢 赤石脂 黃丹 各五錢 輕粉 乳香 沒藥 各一錢 右爲末 香油調成膏 先以茶清洗後 油紙攤藥貼之 以巾縛定縱痒不可忍 直待結痂去之 未愈 再貼[入門](p.1560.)

114. 神捷膏

治內外賺瘡 久年不愈 清油半斤 先煎入黃蠟一兩 松脂五錢 熬至成珠 候冷 入乳香 沒藥 輕粉 血竭 孩兒茶 枯白礬 龍骨煨 各三錢 川椒四錢 右爲末 攪勻收貯 先以藥水洗淨 用油脂以鍼刺孔 攤藥貼瘡上二日 換三次二日 後一日換一次 每換藥必洗淨 貼上[醫鑑](p.1561.)

115. 翠玉膏

治賺瘡 瀝青四兩 黃蠟銅綠 各五錢 沒藥三錢 右將香油半斤 同黃蠟 瀝青 於火上熔化 次下銅綠 沒藥末 旋攪勻成稠 將藥傾冷水中 看瘡大小 捻作餅子貼之 以帛繫定三日一易[綱目](p.1561.)

116. 大馬齒膏

治兩足血風瘡 馬齒莧焙乾五錢 黃丹 黃栢 枯礬 孩兒茶 各三錢 輕粉一錢 右爲末 桐油 或麻油 調勻攤油紙上 先以藥水淋洗 挹乾後 乃貼之[入門](p.1563.)

血風瘡 與腎臟風瘡 相類 …… 外治磨風膏(方見上) 大馬齒膏 塗之[入門](p.1562.)

117. 臘享膏

治凍瘡 豬脂 獐油 各二兩半 香油二合半 海松子油一合 松脂 黃蠟 各三兩 七錢半 右各煉去滓 和合成膏 先以藥水洗後 塗之[俗方](p.1564.)

治凍瘡 臘豬脂 獐油 各二兩半 香油二合半 海松子油一合 明松脂 黃蠟 各三兩七錢半 右各煉去滓 熔化成膏 待凝貯器中 塗之[俗方](p.1635.)

凍瘡 雄雉 鷄腦 一枚 入黃蠟等分 清油減半 熬膏塗之[入門](p.1564.)

118. 柳枝葉膏 *

治翻花瘡 …… 柳枝葉濃煎 作膏塗之[本草](p.1566.)

119. 大黃膏

治軟癩 大黃 黃柏 當歸 各等分 右爲末 以生地黄汁調 塗之[俗方](p.1566.)

120. 杏仁乳香硫黃膏 *

生手足間 相對如新菜黃痒痛 折裂有孔如蝸 久不愈 杏仁 乳香 各三錢 硫黃 輕粉 各一錢半 右爲末 麻油三錢 入黃蠟五錢 熔化入前藥末 攪煎成膏 塗之[入門](p.1567.)

121. 紫草膏

治熱毒瘡 紫草茸 黃連 黃柏 漏蘆 各五錢 赤小豆末 菘豆粉 各一合 右爲末 豬脂 或清油 調日三付[直指](p.1568.)

122. 二黃膏

治一切惡瘡 清油三兩煎 巴豆肉二十粒微黑色去豆 入黃蠟一兩熔化 又入硫黃 雄黃末 各一錢 和勻成膏 以藥水洗瘡 後擦付二三次 神效[得效](p.1569.)

123. 貝母膏

治諸惡瘡 貝母三錢半 半夏(生用) 南星(生用) 五倍子 白芷 黃柏 苦參 各二錢半 黃丹一錢半 雄黃一錢 右爲末 蜜水調付 或乾糝[直指](p.1569.)

124. 皂角子膏 *

諸瘡 入皂角水 及惡水熱痛不止 皂角子燒存性 研二錢半 砂糖末五錢 和勻如膏 貼瘡上[本草](p.1570.)

125. 蛇含膏

蛇含草 ○主金瘡 搗付之佳 ○又云蛇含膏 連已斷之指[本草](p.1576.)

126. 將軍膏

治傷損腫痛 瘀血流注 紫黑 或傷眼上青黑不散 大黃爲末 生薑汁 調付患處 卽消名將軍膏[醫鑑](p.1579.)

127. 二生膏1

治折傷手足 生地黄一斤 生薑四兩 右搗爛入酒糟一斤 炒熱 布裹罨傷處 熨之 傷筋損骨痛 不可忍神效[醫鑑](p.1582.)

128. 二生膏2

傷損臂白脫 出腫痛 生地黄 搗爛 攤油紙上 次糝 木香末一層 又攤地黄 貼患處 明目痛 卽止[得效](p.1582.)

129. 二生膏3

治折傷 斷筋 損骨 生地黄 搗取汁 好酒和服 日二三次 最妙 又搗爛 蒸熱 封傷處一月 筋骨連續 蓋地黄屬骨[種杏](p.1582.)

130. 麻油豆豉膏

又生麻油 研豆豉爲膏丸 如彈子大 常常揩拭 所咬處 却搥開 看豉丸內 若有狗毛茸茸然 此毒氣已出 搥至 無茸 毛方乃痊可[十三方](p.1588.)

131. 葶麻子膏 *

葶麻子 ○主犬咬傷 取五十粒去殼 研爲膏付之[綱目](p.1589.)

132. 救苦膏

治風濕痠疼 川烏炮三錢 牛膝 黃丹 乳香 另研各五錢 白芷 貝母 白芨 白斂 各二錢 槐潤一錢(無則代桃膠) 沒藥另研七錢 白膠香 另研杏仁泥各三兩 當歸一兩 瀝青另研八兩 香油半盞 右末和勻 以香油澆潤火上熔化 每二兩 作一貼 攤油紙付患處[類聚](p.1634.)

133. 白龍膏

白薇 白芷 白斂 黃芪 商陸 根柳白皮 桑白皮 各一兩 輕粉五錢 另研乳香二兩 另研定粉黃蠟各八兩 杏仁油一斤(無則代香油) 右七味 剉浸三日 揉熬 令白芷黃色去滓 下黃蠟 乳香 令熔化出火 再濾微冷下 輕粉定粉 急攪至冷 收貯攤緋帛上貼之 治諸般惡瘡 久瘡腫毒[精義](p.1636.)

134. 皂角草烏膏

小兒 初生 鼻塞不通 乳不得下 取豬牙 皂角 草烏 各等分 右爲末 葱涎調成膏 貼額門上(p.1700.)

135. 桃仁膏 *

桃仁 ○產後陰腫痛 桃仁細研塗之 又和五倍子 枯白礬 爲末 研桃仁爲膏 塗之[正傳](p.1702.)

136. 五通膏

治臍風撮口 生地黃 生薑 葱白 蘿菔子 田螺肉 右共搗爛 搭臍上四圍 一指厚 抱住下 屁泄而愈[醫鑑](p.1716.)

137. 香螺膏

治臍風腫硬如盤 田螺三箇 入麝香少許 右搗爛 搭臍上 須臾 再易腫痛 立消[醫鑑](p.1716.)

138. 泥金膏

治丹毒熱癩 無名腫毒 蚯蚓糞二分 炤硝一分 右新汲水 濃調敷上[回春](p.1760.)

139. 畫眉膏

山梔子炒黑三箇 雄黃 朱砂輕粉 各少許 爲末 清油調勻 候兒睡着濃抹 畫兒兩眉上 醒來自不喫乳 未效再畫仍用墨 搽乳頭[入門](p.1762.)

140. 百花膏

白蜜略用湯 和時時以鷄羽刷身上[正傳](p.1786.) 因食毒物 作痒 宜蟬退湯(方見上) 百花膏[正傳](p.1786.)

141. 硝膽膏

芒硝爲末 調豬膽汁塗之 無芒硝 則炤硝亦可[綱目](p.1787.) 痘瘡 煩痛 宜硝膽膏(方見下) 仍用真黃土細末 糝之良(p.1786.)

142. 臙脂膏

乾臙脂蜜調塗 兩眼眶 則痘不入眼[丹心](p.1792.) 痘出太盛 恐入眼爲害 宜消毒飲(方見上) 加酒炒芩連 桑白皮 草龍膽 煎服 外塗 臙脂膏 [入門](p.1792.)

143. 羊骨髓膏 *

痘落後 宜用減癍痕方 羊骨髓一兩煉一二沸 輕粉一錢 右研如膏 每日塗瘡上 [綱目](p.1793.)

144. 必勝膏

馬齒莧 搗取汁 豬脂 白蜜 右等分 合和熬膏 塗之 [正傳](p.1796.)

145. 芥子膏 *

芥子 ○治痘出不快 色不紅潤 宜內服 紫草飲(方見上) 外用芥子爲末 白湯調如膏 塗兒脚心乾 則再塗 卽快出紅活[入門](p.1802.)

146. 白油麻膏 *

白油麻 ○油-陳油 煎膏 生肌長肉 消癰腫 補皮裂[本草](p.1838.)

147. 鷹屎白膏 *

鷹屎白 ○性平(一云微寒) 有小毒 主滅癍痕合 殭蚕衣 魚之類 爲膏塗之[本草](p.1863.)

148. 白鴿糞膏 *

白鴿糞 ○主頭極痒不痛 生瘡 醋調煮成膏 付之[本草](p.1865.)

149. 豹肉脂膏 *

豹肉 ○脂-可合生髮 膏朝塗暮生[本草](p.1882.)

150. 蟾蜍肪膏 *

蟾蜍 ○肪-塗玉 則刻之如蠟 但不可多得 但取肥者 剉煎膏 以塗玉亦軟[本草](p.1908.)

151. 鼯鼠膏 *

鼯鼠 ○膏堪摩諸惡瘡[本草](p.1893.)

152. 柳枝膏 *

柳枝 ○主齒痛 風熱腫痒 可作浴湯膏藥 牙齒病 爲最要之藥[本草](p.2024.)

153. 柳葉膏 *

柳葉 ○煎膏 續筋骨長肉 止牙痛[本草](p.2024.)

154. 白楊樹皮膏 *

白楊樹皮 ○性冷 味苦(一云酸) 無毒 主毒風 脚氣腫 去風痺 消撲損 瘀血作痛 療折傷 血瀝痛 煎膏可續筋骨[本草](p.2027.)

155. 黃丹膏 *

黃丹 ○性微寒(一云涼) 味辛 無毒 鎮心安神 主驚癇 癱疾 除毒熱 驚悸狂走 療吐 逆反胃 止吐血 及嗽 治金瘡 及湯火 瘡染鬚 可煎膏 止痛生肌(p.2044.)

156. 黃連甘草膏 *

灸瘡久不合 黃連 甘草節 白芷 黃丹 香油 同煎膏貼之[丹心](p.2057.)

IV. 고 찰

1. 主治病症 分類

外用膏를 사용하여 치료한 병증들을 분과별로 분류해 보면 다음과 같다.

Table 1. List of Disease Related to Prescriptions

| 分科 | 關聯 疾患 | 處方名 |
|-----------|--|---|
| 內科 | 大小便不通, 痢, 惡寒, 臍腹痛 | 納臍膏, 貼臍膏, 廻生新膏, 蝸牛膏, 塗臍膏, 禦寒膏, 代灸塗臍膏, 代灸膏, 琥珀膏, 救苦膏, 五通膏, 香螺膏, 硝膽膏, 天仙膏, 禦風膏 |
| 外科 皮膚科 | 癰疽, 積聚, 痔漏, 諸瘡, 折傷, 面上諸瘡, 臙瘡, 手足皸裂, 疥癬, 痔瘡, 紫癩, 筋寒諸病 | 洪寶膏, 硫黃膏, 玉容膏(玉容西施膏), 爐灰膏, 黃蠟膏, 三聖膏, 秘傳神應膏, 辰砂膏, 熊冰膏, 痔藥膏子, 田螺膏, 神異膏, 硝膽膏, 蝸猫膏, 六香膏, 水調膏, 琥珀膏, 硝黃膏, 五仙膏, 貼痞膏, 外敷神膏, 涌泉膏, 去水膏, 巴豆膏, 神異膏, 乳香膏, 水澄膏, 沈水膏, 三神膏, 萬應膏, 糯米膏, 蟾蜍膏, 大蒜膏*, 雲母膏, 靈應膏(麥飯石膏*), 太乙膏(神仙太乙膏), 善應膏, 陶潛膏, 白龍膏, 泥金膏, 必勝膏, 玉脂膏, 十香膏, 綠雲膏, 化癰膏, 南星膏, 雄黃膏, 麻豆膏, 神應膏, 龍骨膏, 必勝膏, 馬齒膏, 黛土膏, 神捷膏, 翠玉膏, 磨風膏, 大馬齒膏, 臘享膏, 大黃膏, 紫草膏, 二黃膏, 貝母膏, 蛇含膏, 將軍膏, 二生膏, 天南星草烏膏*, 蜘蛛膏*, 塗臍膏, 驢蹄蕎麥膏*, 杏仁乳香硫黃膏*, 皂角子膏*, 麻油豆豉膏, 百花膏, 羊骨髓膏*, 芥子膏*, 白油麻膏*, 鷹屎白膏*, 百鴿糞膏*, 蟾蜍肪膏*, 鼯鼠膏*, 柳枝膏*, 柳葉膏*, 白楊樹皮膏*, 黃丹膏*, 草麻子膏*, 如聖膏, 蝸牛膏, 金絲膏, 柳枝葉膏*, 黃連甘草膏* |
| 眼耳鼻咽喉科 | 腎障, 偷鍼, 鼻衄, 腎膜, 眼痛, 耳聾, 齒痛, 傷眼, 眼昏, 眼花, 爛弦風, 鼻塞 | 洪寶膏, 浦黃膏, 龍腦膏, 南星地黃膏*, 磨腎膏, 花草膏, 三光膏, 地黃膏, 五黃膏, 龍腦膏, 春雪膏, 二百味花草膏, 楓膏, 五膽膏, 百點膏, 點腎膏, 明鏡膏, 葵仁膏, 護眼膏, 臙脂膏, 黃栢膏(護眼膏), 細辛膏, 辛夷膏, 細辛膏, 辛夷膏, 生地黃膏*, 豬膽膏*, 雄黃定痛膏, 皂角草烏膏, |
| 產婦科 | 難產, 死胎不下, 乳癰, 乳懸症, 產後陰戶脫出 | 丹參膏, 如聖膏, 藜蘆膏, 桃仁膏* |
| 小兒科 | 小兒胎風, 小兒白禿頭瘡, 斷乳 | 龍腦膏, 五通膏, 香螺膏, 畫眉膏, 如聖黑膏 |
| 其他 | 染色, 生髮 | 外染烏雲膏, 豹肉脂膏* |

이상과 같이 주로 癰疽, 積聚, 諸瘡 등의 外科 皮膚科疾患이나 腎障, 腎膜, 眼痛, 耳聾 등의 五官科疾患을 치료하는데 사용되었다. 外用膏라 하여 외과질환에만 사용된 것이 아니라 大小便不通, 痢疾, 惡寒, 臍腹痛 등과 같은 內科疾患을 치료하는데 쓰이기도 하였으며, 아이의 젖을 끊게 하거나 머리털 染色 등에도 다양하게 쓰였다.

2. 出典別 處方 分類

『東醫寶鑑』에서 外用膏를 인용한 문헌은 총 27종 서적으로, 인용서적별 처방을 분류하면 다음과 같다.

Table 2. List of Book Quoted Prescriptions

| 인용 서적 | 처방명 |
|-------------------|--|
| 入門 | 藜仁膏, 二苜味花草膏, 細辛膏, 丹參膏, 如聖膏, 琥珀膏, 爐灰膏, 藜蘆膏, 熊水膏, 蝸牛膏, 三聖膏, 硝黃膏(琥珀膏), 貼括膏, 外敷神膏, 巴豆膏, 糯米膏, 麻豆膏, 磨風膏, 龍骨膏, 馬齒膏, 窰土膏, 黃蠟膏, 大馬齒膏, 畫眉膏, 護眼膏, 臙脂膏, 皂角膏*, 驢蹄蕎麥膏*, 杏仁乳香硫黃膏*, 芥子膏*, 黃丹膏* |
| 得效 | 硫黃膏, 磨腎膏, 地黃膏, 龍腦膏, 春雪膏, 百點膏, 如聖膏, 黃蠟膏, 熊水膏(熊膽膏), 天仙膏, 塗臙膏, 善應膏, 蟾蜍膏, 南星膏, 神異膏, 如聖黑膏, 二黃膏, 二生膏, 豬膽膏*, 生地黃膏* |
| 醫鑑 | 納臙膏, 三光膏, 明鏡膏, 禦寒膏, 水調膏, 三神膏, 陶潛膏, 玉脂膏, 南星膏, 神應膏, 神捷膏, 將軍膏, 二生膏, 五通膏, 香螺膏, 天南星草烏膏* |
| 本草 ¹¹⁾ | 禦風膏, 蛇含膏, 皂角子膏*, 白油麻膏*, 鷹屎白膏*, 百鴿糞膏*, 豹肉脂膏*, 蟾蜍肪膏*, 鼯鼠膏*, 柳枝膏*, 柳葉膏*, 白楊樹皮膏*, 柳枝葉膏* |
| 丹心 | 五黃膏, 地黃膏, 辛夷膏, 琥珀膏, 金絲膏, 辰砂膏, 田螺膏, 水澄膏, 麻豆膏, 臙脂膏, 蝸猫膏, 黃連甘草膏* |
| 綱目 | 雄黃定痛膏, 三聖膏, 熊水膏, 痔藥膏子, 翠玉膏, 糯米膏, 硝臙膏, 蝸猫膏, 南星地黃膏*, 羊骨髓膏*, 草麻子膏* |
| 正傳 | 神異膏, 綠雲膏, 金寶膏, 百花膏, 必勝膏, 蟾酥膏, 桃仁膏* |
| 直指 | 點腎膏, 涌泉膏, 去水膏, 沈水膏, 雄黃膏, 紫草膏, 貝母膏 |
| 精義 | 萬應膏, 十香膏, 琥珀膏, 白龍膏 |
| 回春 | 洪寶膏, 蝸牛膏, 秘傳神應膏, 五仙膏, 泥金膏 |
| 俗方 ¹²⁾ | 楓膏, 臘享膏, 大黃膏, 黃蠟膏, 六香膏 |
| 類聚 | 貼臙膏, 五膽膏, 化癩膏, 救苦膏 |
| 精要 | 神異膏, 靈應膏(麥飯石膏*) |
| 局方 | 春雪膏, 太乙膏(神仙太乙膏), 雲母膏, 琥珀膏 |
| 種杏 | 外染烏雲膏, 田螺膏, 二生膏 |
| 海藏 | 廻生新膏, 代灸塗臙膏, 硝臙膏 |
| 寶鑑 | 浦黃膏, 龍腦膏 |
| 醫林 | 龍腦膏, 代灸塗臙膏 |
| 三因 | 蜘蛛膏*, 大蒜膏* |
| 東垣 ¹³⁾ | 百點膏 |
| 聖惠 | 十香膏 |
| 錢乙 ¹⁴⁾ | 黃栢膏 |
| 涓子 | 乳香膏 |
| 袖珍 | 玉容膏(玉容西施膏) |
| 御院 | 辛夷膏 |
| 御藥 | 五黃膏 |
| 十三方 | 麻油豆豉膏 |

11) 『神農本草經』을 意味함.

12) 이는 書名이 아님. 許浚이 『東醫寶鑑』을 著述하면서 世俗의 處方을 選擇하여 使用하였을 것으로 추정함.

13) 이는 書名이 아님. 東垣老人인 李杲를 意味하며 李杲의 書籍 中 하나라고 추정함.

14) 이는 書名이 아님. 錢乙의 著書 『小兒藥證直訣』이라 추정함.

이상에서 보는 것처럼 『醫學入門』, 『世醫得效方』, 『衛生醫鑑』 등에서 많이 인용하였으며, 단미약으로 고제를 만들어 사용한 처방이 많아서 『神農本草經』에서도 여러 처방이 인용되었다.

3. 處方 內容 分析

1) 처방내용이 나오지 않는 경우

花草膏는 『得效』에서 인용하였으나 『東醫寶鑑』에는 처방에 대한 내용이 없다.

代灸膏는 처방이 『寒門』에 나온다고 하였으나 『寒門』에는 해당 내용이 없다. 다만 『寒門』에 代灸塗臍膏가 나오는데 이를 指稱하는 것으로 추정된다.

2) 출전에 따라 사용법이 다른 경우

『御院』을 출전으로 하는 辛夷膏는 약을 숨에 싸서 콧구멍에 넣어 치료하는데, 『丹心』을 출전으로 하는 辛夷膏는 솟구멍과 콧구멍에 바른다.

『醫林』을 출전으로 하는 代灸塗臍膏는 배꼽위에 약을 붙이고 천으로 싸매는데, 『海藏』을 출전으로 하는 代灸塗臍膏는 塗臍라는 用語에도 불구하고 臍部가 아닌 關元和 氣海穴에 붙여서 사용방법에 차이가 있었다.

3) 같은 처방명이지만 출전에 따라 처방내용이 다른 경우

『回春』의 蝸牛膏는 大小便不通을 치료하고, 『入門』의 蝸牛膏는 痔瘡를 치료한다고 하였는데, 처방내용이 다르다.

『種杏』과 『丹心』의 田螺膏는 痔瘻나 痔瘡를 치료한다고 하였으나 처방내용이 다르다.

『醫林』의 龍腦膏는 小兒胎風赤爛을 치료하고, 『醫鑑』의 龍腦膏는 卒聾을 치료한다고 하였는데, 마찬가지로 처방내용이 다르다.

春雪膏는 『局方』과 『得效』에서 인용하였으

나 처방내용이 다르다.

『入門』과 『得效』에서 인용한 如聖膏는 難産을 治療하고, 『得效』와 丹溪方에서 인용한 如聖膏는 紫癍白癍을 治療하고, 『入門』에서 인용한 如聖膏는 乳懸症, 産後陰脫을 치료하며, 각각 처방내용이 다르다.

『丹心』과 『入門』에서 인용한 琥珀膏는 모두 積塊와 脇痛을 치료하는데, 『丹心』의 처방과 비교해 보면 『入門』의 처방에는 麝香이 추가되어 있고 一名 硝黃膏라 하며, 『局方』에서 인용한 琥珀膏는 癩癧惡瘡를 치료하여 치료병증과 처방내용이 다르다.

『得效』의 黃蠟膏는 凍瘡를 치료하고, 『入門』의 黃蠟膏는 腫瘡를 치료하고, 『俗方』의 黃蠟膏는 諸瘡를 치료하여 새살을 돋게 한다고 하였는데, 처방내용이 출전마다 모두 다르다.

『綱目』의 三聖膏는 수염과 머리털이 빠질 때에 사용하고, 『入門』의 三聖膏는 積塊를 치료한다고 하였는데, 처방내용이 다르다.

熊冰膏는 痔漏를 치료하는데, 『入門』 『綱目』 『得效』의 처방내용이 모두 다르고 『得效』에서는 일명 熊膽膏라고 하였다.

『正傳』의 神異膏는 癰疽를 치료하고, 『得效』의 神異膏는 瘡疥를 치료한다고 하였는데, 처방내용이 다르다.

『入門』의 糯米膏는 헌데를 치료하고, 『綱目』의 糯米膏는 끊긴 筋骨을 치료한다고 하였는데, 처방내용이 다르다.

麻豆膏는 버짐을 치료하는데, 『入門』과 『丹心』의 처방내용이 다르다.

『醫鑑』의 神應膏는 白禿頭瘡를 치료하고, 『錢乙』의 神應膏는 眼科疾患을 치료하며 一名 黃栢膏라 하였는데, 처방내용이 다르다.

二生膏는 수족이 끊기고 상한 것을 치료하는데, 『醫鑑』 『得效』 『種杏』의 처방내용이 모두 다르다.

4) 처방명을 새롭게 명명한 것

처방명은 없는데 치료방법이 고제를 만들어 병증을 치료하는 경우 처방 이름을 붙였다. 단미약물을 사용하여 고제를 만든 경우 해당 약물로 명명하였다.

두 가지 약물을 사용하여 고제를 만든 경우 두 가지 약물로, 세 가지 이상의 약물로 명명한 경우는 세 가지 약물로 명명하였다.

이와 같은 방법으로 처방이름을 새롭게 부여한 처방은 다음과 같이 모두 28개 처방이다.

Table 3. List of New-named Prescriptions

| 출전 | 처방명 |
|----|---|
| 三因 | 蜘蛛膏*, 大蒜膏* |
| 得效 | 生地黃膏*, 猪膽膏* |
| 本草 | 柳枝葉膏*, 白油麻膏*, 鷹屎白膏*, 百鴿糞膏*, 豹肉脂膏*, 蟾蜍肪膏*, 鼯鼠膏*, 柳枝膏*, 柳葉膏*, 皂角子膏*, 白楊樹皮膏* |
| 醫鑑 | 天南星草烏膏* |
| 綱目 | 南星地黃膏*, 苧麻子膏*, 羊骨髓膏* |
| 精要 | 麥飯石膏* |
| 正傳 | 桃仁膏* |
| 入門 | 皂角膏*, 驢蹄蕎麥膏*, 杏仁乳香硫黃膏*, 芥子膏*, 黃丹膏* |
| 丹心 | 黃連甘草膏* |

4. 사용 약재 분석

外用膏에 사용된 약재는 크게 고제를 구성하는데 사용된 약재와 고제를 만드는데 사용된 약재로 구분할 수 있다.

蜜, 黃蠟, 薑汁, 生地黃汁, 唾, 茶, 醋, 人乳, 牛乳, 黃牛膽汁, 葱涎, 砂糖 등 뿐만 아니라 鴈油, 猪脂 등 같은 動物性油와 麻油, 杏仁油와 같은 植物性油 등을 기초제로 하여 다른 약재와 섞어 고제를 만들었다.

白蠟은 주로 아물게 하고 단단히 영키는 힘을 가지고 있어서 외과에 좋은 약으로 쓰이고 黃蠟은 쇠붙이에 상한 것을 치료하는데 둘 다 外用膏에는 사용되었으나 內服膏에는 사용되지 않았다.

1) 식물성 약재

麻油, 薑, 生地黃, 醋, 茶, 麵, 白糕, 杏仁, 葱, 甘遂, 甘松, 甘草, 桂, 芥子, 苦參, 瓜蒌, 藿香, 蕎麥, 菊莖葉, 芎藭, 桔梗, 槐潤, 槐枝, 糯米, 蘿菥子, 蘆薈, 菘豆, 漏蘆, 丹參, 當歸, 大蒜, 大黃, 桐油, 桃仁, 柳枝, 馬蘭子, 馬齒莧, 蔓荊子, 木通, 木香, 沒藥, 蕪荑, 半夏, 防風, 白膠香, 白芨, 白檀, 白斂, 白薇, 白丁香, 白芷, 檳榔, 白楊樹, 白芍藥, 茯苓, 附子, 苧麻子, 桑白皮, 蛇床子, 山梔, 商陸根, 桑柴灰, 鼠粘子, 蘇合油, 柴胡, 乾地黃, 細辛, 水紅花子, 藜蘆, 臙脂, 零陵香, 吳茱萸, 牛膝, 鬱金, 龍腦, 藜仁, 乳香, 松脂, 辛夷, 五倍子, 王瓜藤, 天南星

2) 동물성 약재

唾, 猪油, 人乳, 牛乳, 鴈油, 豹脂, 露蜂房, 烏雞脂, 黃牛膽汁, 鮮魚血, 狢羊膽, 鷄子黃, 蚯蚓糞, 鹿角, 蜘蛛, 驢蹄肉, 鯉魚膽, 牡蠣, 斑貓, 白蜜, 白蠟, 白雄鷄膽汁, 白僵蠶, 白鴿糞, 蛇退, 麝香, 蟬殼, 蟾酥, 羊骨髓, 羊糞, 羊髓, 鼯鼠, 烏雞膽, 龍骨, 龍齒, 蝸牛, 牛黃, 熊膽, 雄黃, 油髮, 亂髮, 黃蠟

3) 광물성 약재

空青, 光粉, 銅綠, 銅錢, 朴硝, 膽礬, 密陀僧, 白礬, 石膏, 石灰, 信砒, 鹽, 焰硝, 鹽花, 雲母, 水銀, 朱砂, 黃丹

5. 膏劑 제조 방법

膏는 외용약에서 흔히 사용하는 劑型이다. 특히 장기 보관이 용이하고 만들어 놓으면 쓰기에 간편하고 경제적이다. 『東醫寶鑑』에서는 膏를 만드는 방법이 어떻게 쓰였는지를 알아보고 일반적으로

쓰이는 膏製의 제법과 비교해 본다.

1) 『東醫寶鑑』에서 外用膏를 만드는 방법을 분류해 보면 아래와 같이 8개의 방법이 쓰였다.

- ① 유동성 물질에 가루형태의 약재를 넣어 갠다.
- ② 짓찧는다.
- ③ 유동성 물질을 불에 녹이면서 분말형태의 약재를 넣어 잘 반죽한다.
- ④ 약재를 유동성 물질에 넣고 졸이다가 찌꺼기를 버리고 봉뿔 등을 넣어 다시 졸인다.
- ⑤ 약재를 유동성 물질에 넣고 졸여 고약을 만들어 식힌 다음에 사향, 용뇌 등을 넣는다.
- ⑥ 약재를 유동성 물질에 넣고 졸인다.
- ⑦ 약재를 유동성 물질에 넣고 졸이다가 약재를 꺼내고 황랍 등을 넣어 녹여 식힌다. 여기서 다른 약재를 넣어 반죽해서 고약을 만든다.
- ⑧ 약재를 유동성 물질에 넣고 졸이다가 찌꺼기를 버리고 황단을 넣고 약한 불에 졸이다가 물에 떨어 주어 보아 구슬같이 되어 풀어지지 않을 때 유향, 몰약 등을 넣어 잘 짓는다.

2) 『한방외용약』에 따르면 일반적으로 膏劑를 만드는 방법은 다음과 같은데¹⁵⁾, 이것을 『東醫寶鑑』에서 언급한 방법과 비교해 보았다.

가. 장기 보관용 고약을 만드는 방법은 크게 3 단계로 나뉜다.

첫째, 밀랍, 기름 등 유동성 물질을 가열한다. 꿀, 우유, 초, 사탕, 기름 등을 주원료로 삼는다.(특히 硫黃이나 송진은 가열하면 녹으므로 유동성 물질에 해당된다.) 처음부터 분말하지 않은 약재를 넣어 그 성분을 추출하여 고품물질은 제거한다.(고온에 약재를 투여하면 성분이 파괴될 우려가 있는 약물은 처음부터 넣어 가열한다.)

둘째, 분말의 고품물질을 가하는 단계이다.

이때는 가열하지 않고 냉각시키며 투여하는 것이 성분의 손실을 줄일 수 있다. 이 시기에 黃丹을 투여하는데 주의해야 한다.

셋째, 냉각시켜 보관한다.

火毒을 없애기 위해서이다. 도기에 넣어 보관하거나 紙에 발라 보관하기도 한다.

◆ 『東醫寶鑑』의 제법 중 ④⑤⑥⑦⑧이 여기에 해당한다.

나. 즉시 사용하기 위한 고약을 만드는 방법은 간단하다.

생약재를 두드려 떡처럼 만든다.(도란, 도병법)

여기다 분말의 약재를 첨가하기도 한다.

◆ 『東醫寶鑑』의 제법 중 ②가 여기에 해당한다.

다. 또 다른 방법은 분말의 약제에 유동성 물질을 섞는 방법이다.

유동성 물질(각종 油나 脂, 酒, 醋, 계란, 우유, 사탕, 각종 汁, 물등)에다 분말형태의 약재를 넣어 반죽해 덩어리를 만든다. 장기보관이 어렵다.

◆ 『東醫寶鑑』의 제법 중 ①③이 여기에 해당한다.

이와 같이 일반적으로 고제를 만드는 방법은 『東醫寶鑑』에서 고제를 만드는 방법이라고 표현된 것과 다르지 않다.

6. 사용방법 분석

外用藥을 적용하기 전에 고려해야 될 사항은 다음과 같다.

表裏에 따른, 上下에 따른, 經絡에 따른 치료 원칙에 따른다. 병사가 피부나 혈맥에 있을 경우 가벼우며 깊이 침투하지 않는 방법을 쓴다. 그리고 체표에 약이 오래 남아 있지 않는 방법을 응용한다. 병사가 근육, 골격에 있을 경우 무거우면서 깊이 침투할 수 있는 방법을 써야 한다¹⁶⁾. 이런 원

15) 신광호, 한방외용약. 1994. 서울:열린 책들. 1994:93~97.

칙을 고려해서 外用藥을 사용해야 한다.

일반적으로 外用藥을 사용하는 방법은 ① 찌다 ② 삼입하다 ③ 찜질하다 ④ 마찰하다 ⑤ 산포하다 ⑥ 바르다 ⑦ 씻다 ⑧ 싸매다¹⁷⁾ 등이 있다.

『東醫寶鑑』에서는 外用膏의 사용법을 다음과 같이 표현하고 있다.

◆ 넣는다.(入)

欲吐風涎 取皂角 以漿水浸 春秋四日 夏二日 冬七日 揉去渣熬爲膏 攤紙上陰乾 用時以水化開 灌入鼻內 良久 涎出爲效 若吐多欲止之 飲溫鹽湯一二口即止[入門]

◆ 넣는다.(點)

治爛弦赤腫 流淚楓葉 多取濃煎汁 去滓熬成膏 取以點眼 又楓葉細切 和燒酒蒸絞取汁 點眼亦效[俗方]

◆ 막는다.(塞)

治耳卒聾 細辛 蒲黃 各五錢 杏仁 神麴 各七錢半 右爲末 杏仁膏 和捻如棗核大 綿裹塞耳 日一易[寶鑑]

◆ 바르다.(塗)

治乳癰結核刺痛 及潰後不斂 丹參 赤芍藥 白芷 各等分 剉酒淹二宿 入豬脂半斤 煎令白芷焦黃 則膏成矣 去滓入黃蠟一兩 攪勻 候凝 每取少許 塗之[入門]

◆ 바르다.(塗擦)

通治諸癬 麻油二兩 入巴豆肉 葶麻子肉 各十四粒 斑貓七粒 熬煎至枯黑色 去滓却入白蠟五錢 蘆薈末三錢 攪勻成膏 塗擦之[入門]

◆ 바르다.(掃)

治癰瘡熱毒腫痛 黃連 黃柏 白芨 白斂 各四錢 雄黃一錢 乳香 沒藥 各五分 右末水調 鷄羽掃上腫處[丹心]

◆ 바르다.(擦)

治陰蝕瘡 蛇床子五錢 大風子十四箇 杏仁二十箇 枯白礬 樟腦 各二錢 川椒 輕粉 水銀 各三錢 雄黃一錢半 銀硃一錢 右爲末 生麻油和丸 彈子大 每用少許 呵洋遍擦之[入門]

◆ 붙인다.(抹)

治外腫瘡 龍骨 乳香 沒藥 密陀僧 各二錢 海螵蛸一錢半 皂角子五箇燒存性 右爲末 用綿紙兩重 以鍼插亂孔 香油 調藥夾內縛貼瘡上 隔日翻貼之[入門]

山梔子炒黑三箇 雄黃 朱砂 輕粉 各少許 爲末 清油 調勻 候兒睡着濃 抹畫兒兩眉上 醒來自不喫乳 未效 再畫 仍用墨搽乳頭[入門]

◆ 붙인다.(封)

治折傷斷筋損骨 生地黄搗取汁 好酒和服 日二三次 最妙 又搗爛蒸熱封傷處 一月 筋骨連續 蓋地黃屬骨[種杏]

◆ 붙인다.(付)

治傷損腫痛 瘀血流注 紫黑 或傷眼上青黑不散 大黃爲末 生薑汁 調付患處 卽消名將軍膏[醫鑑]

◆ 붙인다.(敷)

治丹毒熱瘰 無名腫毒 蚯蚓糞二分 炤硝一分 右新汲水 濃調敷上[回春]

◆ 붙인다.(貼)

治外腫瘡 龍骨 乳香 沒藥 密陀僧 各二錢 海螵蛸一錢半 皂角子五箇燒存性 右爲末 用綿紙兩重 以鍼插亂孔 香油調藥夾內 縛貼瘡上 隔日翻貼之[入門]

위와 같이 외용으로 쓰이는 膏는 눈에 넣거나 피부에 펴서 바르기도 하고 배지에 발라 환부에 붙이거나 떡처럼 만들어 붙이기도 하고 구멍에 투입하기도 하고 膏를 붙이고 천으로 싸매는 등 다양한 방법으로 사용하였다.

16) 신광호. 한의외치료법학. 서울:대성의학사. 2000:23~26.

17) 상계서:81.

V. 결 론

이상과 같이 『東醫寶鑑』에 나오는 外用膏를 대상으로 고찰하여 다음과 같은 결론을 얻었다.

1. 『東醫寶鑑』에서 外用膏는 주로 皮膚疾患, 癰疽, 積聚, 諸瘡 등의 질환에 사용되었고, 寒脇痛, 腰痛 등 身體痛症疾患, 大小便疾患 등에도 쓰였다. 그리고 折傷 등의 外科疾患, 머리염색, 옥을 연하게 할 때, 어린아이가 젖을 끊게 하는 경우에도 사용하였다.
2. 『東醫寶鑑』에서는 27종 서적에서 外用膏를 인용하였으며, 특히 『入門』 『得效』 『醫鑑』 등에서 많이 인용하였다.
3. 처방을 운용하는데 있어서는 적응증에 따라 처방내용을 잘 살펴야 하는데, 같은 처방이라 하더라도 출전에 따라 舐·용법이 다른 처방(辛夷膏, 代灸塗臍膏)도 있으며, 출전에 따라 처방내용과 주치병증이 다른 처방(蝸牛膏, 龍腦膏, 如聖膏, 黃蠟膏, 三聖膏, 神異膏, 糯米膏)도 있다. 또한 비슷한 병증을 치료하더라도 출전에 따라 처방내용이 다른 경우(田螺膏, 春雪膏, 琥珀膏, 熊水膏, 麻豆膏, 二生膏)도 있다.
4. 「腰門」의 代灸膏는 「寒門」에 나온다 하였으나 「寒門」에는 代灸膏가 없고 『醫林』에서 引用한 代灸塗臍膏 처방만이 있는 것으로 보아 代灸膏는 代灸塗臍膏를 말하는 것이라고 보아야 할 것이다. 「小兒門」의 黃栢膏는 일명 神應膏라 하였는데 錢乙을 출전으로 하는 神應膏와 醫鑑을 출전으로 하는 神應膏는 주치병증과 처방구성이 다르기 때문에 유의해서 사용해야 한다.
5. 『東醫寶鑑』에서는 300종 이상의 약재를 사용하여 外用膏를 만들었는데, 약재를 섞거나 녹이는 기초제로는 麻油, 汁, 동물의 脂나 油, 蜜 등이 사용되었고, 黃蠟, 白礬, 龍腦, 木香, 乳香,

黃丹, 麝香, 朱砂, 大蒜, 巴豆, 杏仁, 黃連, 芍藥, 川椒, 草烏, 藜仁, 黃栢, 當歸, 細辛, 草麻子 등의 식물성 약재뿐만 아니라 동물성이나 광물성인 爐灰, 銅錢, 豹脂, 鮮魚血, 珍珠, 穿山甲, 鷹屎白, 田螺肉, 熊膽 등의 약재들이 다양하게 사용되었다.

6. 『東醫寶鑑』에서는 膏를 만드는 방법으로 찻재, 유동성 물질에 가루형태의 약재를 넣어 가는 방법, 들재, 짓쪼는 방법, 셋재, 약재를 유동성 물질에 넣고 졸이다가 약재를 꺼내고 黃蠟 등을 넣어 녹여 식힌 다음 여기에 다른 약재를 넣어 반죽해서 고약을 만드는 방법 등으로 구분할 수 있다.
7. 『東醫寶鑑』에서는 外用膏 舐·용방법으로 넣는다(入, 點), 막는다(塞), 바른다(塗, 塗擦, 掃, 擦), 붙인다(抹, 封, 付, 敷, 貼)는 것처럼 다양한 방법으로 표현하였다. 또한 膏를 눈에 넣거나, 피부에 펴서 바르기도 하고, 배지에 발라 환부에 붙이거나 떡처럼 만들어 붙이기도 하고, 구멍에 투입하기도 하고, 膏를 붙이고 천으로 싸매는 방법으로도 사용하였다.

感謝의 글

본 논문은 2008년 원광대학교 교내연구비지원에 의해 수행된 것임.

VI. 참고 문헌

1. 허준저. 신대역동의보감. 동의보감국역위원회 역. 서울:법민문화사. 2007.
2. 신민교저. 임상본초학. 서울:영지사. 1991.
3. 신광호저. 한의외치요법학. 서울:대성의학사. 2000.
4. 이진아, 김현아, 이원철. 점안약에 대한 문헌적

- 고찰. 한방안이비인후피부과학회지. 대한한방안이비인후피부과학회. 1993;6(1):155-70.
5. 이병욱, 김상찬, 변성희, 김한균, 지선영. 천금요방에 기재된 약욕요법에 관한 연구. 대한한의원전학회지. 대한한의원전학회. 2004;17(1):198-217.
 6. 신상문, 노석선. 외과질환에 상용하는 고약의 처방내용에 대한 고찰. 한방안이비인후피부과학회지. 대한한방안이비인후피부과학회. 1994;7(1):95-122.
 7. 문우상, 이병욱, 안상우, 김은하. 외치요법의 이론과 적응증에 대한 사적 고찰. 한국한의학연구원논문집. 2004;10(2):1-22.
 8. 정명용, 김은배, 안상우, 이병욱. 이약병문의 학술사상에 관한 연구(1). 한국외사학회지. 2005;18(1):1-14.
 9. 박태열, 고우신. 마왕퇴의서, 황제내경, 금궤요략에 나타난 중국 고대 외치요법. 동의생리병리학회지. 2002;16(4):617-25.
 10. 신광호. 한방외용약. 서울:열린 책들. 1994.
 11. 문우상, 김은하, 이병욱. 위진시대의 외치요법에 관한 연구. 대한한의원전학회지. 2005;18(3):1-21.