

香附子의 方劑 活用에 대한 考察 (東醫寶鑑 中心으로)

허 진¹, 이정환¹, 윤용갑^{1,2}

¹원광대학교 한의과대학 방제학교실, ²한국전통의학연구소

ABSTRACT

Study on the Applications of Prescriptions including *Rhizoma Cyperi* as a Main Component in *Donguibogam*

Jin Hu¹, Jung-Hwan Lee¹, Young-Gab Yun^{1,2}

¹Dept. of Oriental Medical Prescription, Won-Kwang University

²Research Center of Traditional Korean Medicine

Objectives : The aim of this study is to find the therapeutic meaning of *Rhizoma Cyperi* in herbal medication.

Methodes : In this study, we investigate 85 prescriptions related to the use of *Rhizoma Cyperi* main blended from *Donguibogam*. We research about field of therapy, symptoms of a disease, the chief virtue of a medicine, the cause of a disease, the pathology of a disease, dosage, contents of composition.

Results : The following conclusions were reached through investigations on the prescriptions that use *Rhizoma Cyperi* as the main ingredient. Prescriptions that *Rhizoma Cyperi* was taken

-
- 교신저자 : 윤용갑
 - 전북 익산시 신용동344-2번지 원광대학교 한의과대학 방제학교실
 - Tel : 063-850-6834 E-mail : yunyg@wku.ac.kr
 - 접수 : 2011/ 11/ 09 수정 : 2011/ 11/ 18 채택 : 2011/ 12/ 02

as a monarch drug are utilized for 24 therapeutic purpose, for example, woman disease, uterine disease, vitality and abdominal mass. In particular, 16.4% of prescriptions appear in the chapter of woman, and 15.2% of those appear in the chapter of uterus. Prescriptions that utilize *Rhizoma Cyperi* as the main ingredient are used in the treatment of menstrual disorder, pain due to disorder of Gi, infertility, irregular menstruation and abdominal mass. *Rhizoma Cyperi* is used in pathogenic factors such as seven modes of emotions and used in pathology related to the stagnation of blood system.

The dosage of *Rhizoma Cyperi* is 6li(about 0.23g) to 6don(about 22.5g), however 1don(about 3.75g) has been taken the most for clinical application. Gyogamdan and Yukmisamleunghwan are the most useful base prescriptions which use the *Rhizoma Cyperi* as the main component.

Conclusions : This information provide the rationale for establishing Basic evidance in the oriental medical prescription.

Key word : Rhizoma Cyperi, Dongeuibogam, prescription, therapeutic purpose, pathogenic factor, dosage

I. 緒 論

香附子는 莎草科(사초과 : Cyperaceae)에 속한多年生草本인 사초(*Cyperus rotundus* L.)의 根莖으로, 봄·여름·가을에 채취하여 乾燥한 다음 鬚根과 鱗葉을 소각하고, 煙乾하여 사용한다. 우리나라의 경북 다산면과 경남 고령 및 충남의 신탄진이 집산 재배지이며, 중국에서는 山東, 浙江, 湖南, 河南이 주산지이고, 강변과 해변 모래사장에 자생한다^{1,2,3,4,6,7,9,12)}.

香附子의 氣味는 辛, 微苦, 微甘, 平無毒하고 歸經은 肝, 脾, 三焦에 屬하며 理氣解鬱, 疏肝理氣, 調經止痛, 安胎의 效能이 있어 脇肋作痛, 肝鬱氣滯, 痰氣痛症, 胸脇脘腹疼痛, 消化不良, 胸脇痞悶, 月經不調, 乳房脹痛, 產前後諸症 等에 使用하여 왔

다^{1,4,5,7,8,10)}.

香附子에 含有된 성분으로는 glucose 8.3~9.1%, 과당 1.0~1.7%, 전분 40~41%, 精油 0.65~1.4%를 含有하고, 精油 中 주성분은 β-pinene, camphene, 1,8-cineol, limonene, p-cymene, cyperene, d-cyperone, selinetriene, β-selinene, α-cyperone β-cyperone 등이며 이 외에도 triterpenoids, flavonoids, alkaloids 등도 含有하고 있다. 藥理作用으로는 精油에는 痛消作用을 억제하는 작용이 있으며, 수축상태인 자궁에 대한 억제 작용은 한층 더 현저하고, 生體의 疼痛에 대한 耐受性을 현저하게 높인다. 또한 estrogen 유사작용, 장관과 기관지 평활근 이완작용, 진통해열 작용, 항균소염작용, 강심 혈압강하작용, 중추신경 억제 작용 등이 있다^{2,3,4,5,11,13,14,15)}.

이와 같이 香附子는 配伍되는 藥物이나 處方에 따라 다양한 效能을 발휘하고 있는 바, 저자는 東

醫寶鑑 中 香附子가 主藥으로 配伍된 85종의 方劑^{18~20)}에 대한 治療領域, 痘症 및 主治, 病因·病理, 使用量, 處方構成內容 等의 자료 분석을 통하여 香附子의 活用에 대한 方劑學的 知見을 얻었기에 報告하는 바이다.

II. 本 論

調查方法은 東醫寶鑑 中 香附子가 主藥으로 配伍된 85處方의 内容을 data base化하여 文獻的 資料分析 및 研究內容을 整理하였다. 處方名은 同一 하나 構成內容이 다른 경우는 處方에 (2)라고 表記하여 區分하였다.

本 論文에서 主藥이라 함은 處方構成에서 香附子의 役割이나 使用量이 君臣藥으로 作用하거나, 혹은 여러 가지 藥物과 等分으로 構成되어 있는 경우로 効能과 사용량으로 볼 때 主된 역할을 할

수 있는 것으로 한정하였다. 君臣藥에 대해서는 《素問·至真要大論》에서 “主病之謂君, 佐君之謂臣...”이라 하였고, 《脾胃論》에서는 “君藥分量最多, 臣藥次之, 使藥又次之, 不可令臣過于君”, “力大者爲君”이라 하였으며, 《活人心統》에서는 “凡用藥殊分, 主病爲君, 以十分爲率, 臣用七八分, 輔佐五六分, 使以三四分”이라 한 내용을 참조하였다^{16,17)}.

1. 香附子가 主藥으로 配伍된 方劑의 治療領域에 대한 調查

香附子가 主藥으로 配伍된 方劑의 治療領域에 대해 調查하고, 빈도수가 높은 순서대로 整理하여 보면 Table 1과 같다. 즉 婦人門, 胞門 등 총 24개 領域에서 활용되었고 婦人門이 가장 빈도수가 높은 것으로 조사되었다. 治療領域은 東醫寶鑑의 痘門구분과 상통하는 것으로 간주하였다.

Table 1. 香附子가 主藥으로 配伍된 方劑의 治療領域

治療領域 (病門)	活用處方名	빈도수	백분율
婦人	調經種玉湯, 百子附歸丸, 調經養血元, 玉鑰啓榮丸, 錫斯丸, 補氣養血湯, 桑寄生散, 安榮湯, 保生湯, 正脾散, 養血佐肝丸, 抑氣散, 異香四神散, 推氣養血丸	14	16.4
胞	四神丸, 蒼柏樗皮丸, 香附散, 煮附丸, 清熱調血湯, 烏藥湯, 四物調經湯, 立效散, 歸朮破癰湯, 備金散, 墨附丸, 四製香附丸, 七製香附丸	13	15.2
氣	交感丹, 降氣湯, 快氣湯, 香橘湯, 蘇合香元, 神仙九氣湯, 木香破氣散, 小烏沈湯, 正氣天香湯	9	10.5
積聚	六鬱湯, 六鬱湯(2), 木香調氣散, 大七氣湯, 真人化鐵湯, 寬中丸, 香砂平胃散	7	8.1
內傷	香砂六君子湯, 加味六君子湯, 內消散, 消食清鬱湯, 破鬱丹, 增味二陳湯	6	7.0
寒	香蘇散(2), 茵芷香蘇散, 十神湯, 香葛湯, 衝寒散	5	5.9
脹滿	撞關飲子, 大異香散, 消脹飲子	3	3.5
胸	二炒香良散, 行氣香蘇散, 清鬱散	3	3.5
前陰	加減香苓散, 茵香安腎湯, 十味蒼柏散	3	3.5
神	加味溫膽湯, 清心溫膽湯	2	2.4
腹	開鬱導氣湯, 茵朮散	2	2.4
血	小蘆散, 莎芎散	2	2.4
痰飲	順氣導痰湯, 開氣消痰湯	2	2.4
黃疸	大溫中丸, 褪金丸	2	2.4
小兒	消食丸, 安胎散	2	2.4

風	趁痛散, 疎風湯	2	2.4
小便	通秘散	1	1.2
牙齒	開笑散	1	1.2
後陰	香附散(2)	1	1.2
瘧疫	香蘇散	1	1.2
諸傷	補氣生血湯	1	1.2
虛勞	小安腎丸	1	1.2
脇	芍藥散	1	1.2
皮	開結舒經湯	1	1.2
합계		85	100.0

2. 香附子가 主藥으로 配伍된 方劑의 痘症 및
主治 調査

香附子가 主藥으로 配伍된 方劑를 疾患別로 區

分하고, 이에 대한 痘症 및 主治를 調査하였다
(Table 2).

Table 2-1. 婦人門에 香附子가 主藥으로 配伍된 方劑의 痘症 및 主治

領域區分	病症區分	處 方	主 治
婦人門	求嗣	調經種玉湯	婦人無子 多因七情所傷 致經水不調 不能受孕
		百子附歸丸	久服有孕 及治月水參差不調
		調經養血元	經脈不調 久不受孕
		玉鑰啓榮丸	婦人無子
		螽斯丸	經調受補者服七日即交合 孕後勿服
	婦人雜病	抑氣散	婦人氣盛於血 所以無子 且變生諸證 頭暉膈滿
		異香四神散	婦人氣盛於血 所以無子 且變生諸證 頭暉膈滿
	產後心腹 腰脇痛	推氣養血丸	產後右脇膨脹 有塊如堅弦一條 着冷便疼
		養血佐肝丸	產後左脇脹悶 一塊痛 臥不着席
	胎漏胎動	桑寄生散	胎漏 及經血妄行
	半產	安榮湯	胎氣不固 時常小產 宜以此預防 固胎
	血崩	補氣養血湯	小產後下血不止
	惡阻	保生湯	婦人月經不行 身無病似病 脈滑大而 六脉俱勻 乃孕婦之脉也 精神如故 惡聞食氣 或但嗜一物 或大吐 或時吐清水 此名惡阻 宜服此
	產後浮腫	正脾散	產後通身浮腫

Table 2-2. 胞 · 氣門에 香附子가 主藥으로 配伍된 方劑의 痘症 및 主治

領域區分	病症區分	處 方	主 治
胞門	血結成瘕	四物調經湯	經閉 有積塊動痛
		立效散	經年積血 腹中常痛
		歸朮破癥湯	月經不通 腹中有積塊疼痛
	調血	煮附丸	經候不調 脍腹痛 面色萎黃 飲食減少 或崩漏帶下
		清熱調血湯	經水將來 腹中陣痛 乃氣血俱實也

氣門	帶下	墨附丸	婦人經水不調久無子
		四製香附丸	月候不調能調和經脈
		七製香附丸	月候不調結成癥瘕或骨蒸發熱
	崩漏	四神丸	白帶
		蒼柏樗皮丸	肥人白帶是濕痰
		香附散	五色崩漏
	通血	備金散	血崩不止
		烏藥湯	婦人血海疼痛
	氣痛	木香破氣散	氣痛
		小烏沈湯	諸氣心腹刺痛
	氣鬱	交感丹	諸氣鬱滯 一切公私怫情 名利失志 抑鬱煩惱 七情所傷 不思飲食 面黃形羸 胸膈痞悶諸證 神效大 能升降水火
		降氣湯	氣鬱
	九氣	神仙九氣湯	九氣作痛
		正氣天香湯	九氣作痛 婦人氣痛
	上氣	快氣湯	氣不升降 上氣喘促
	七氣	香橘湯	七情所傷 中脘腹脇脹滿
	通治	蘇合香元	一切氣疾 及中氣 上氣 氣逆 氣鬱 氣痛

Table 2-3. 積聚·內傷·寒·脹滿門에 香附子가 主藥으로 配伍된 方劑의 痘症 및 主治

領域區分	病症區分	處 方	主 治
積聚門	積聚	大七氣湯	五積六聚 心腹痛脹·二便不利
		貞人化鐵湯	五積六聚 痂癖癰瘕
		六鬱湯(2)	通治六鬱
		六鬱湯	開諸鬱火
		木香調氣散	氣鬱
		香砂平胃散	食鬱
	積聚癰瘕 痃癖痞塊	寬中丸	七癰 八瘕 五積 六聚 痂癖 氣塊 胸腹脹痛 面黃肌瘦 一切沈滯之疾
內傷門	內傷脾胃則 不思食不嗜食	香砂六君子湯	不思飲食不化 食後倒飽者 脾虛也
	食厥	加味六君子湯	食厥
	食傷消導	內消散	傷食 生冷硬物 痔滿脹痛
	嘈雜	消食清鬱湯	嘈雜
	噫氣	破鬱丹	婦人噫氣 胸緊 連十餘聲 不盡嗳出氣 心頭略寬不嗳即緊
	吞酸吐酸	增味二陳湯	吞酸
寒門	傷寒表證	香蘇散(2)	四時傷寒 頭痛 身疼 發熱 惡寒 及傷風 傷濕 傷寒 時氣瘟疫
		芍芷香蘇散	傷寒傷風表證 頭項強痛百節痛 陰陽未分 皆可服
		十神湯	兩感風寒 頭痛寒熱 無汗
		香葛湯	傷寒不問陰陽兩感 頭痛寒熱
	痼冷	衝寒散	痼冷 腹痛泄瀉 飲食減少

脹滿門	脹滿	撞關飲子	脹滿 用此衝開關格 使脹自消
	穀脹	大異香散	穀脹 亦治氣脹
	蠱脹	消脹飲子	蠱脹 單腹脹

Table 2-4. 胸·前陰·神·腹·血·痰飲·黃疸·小兒·風門에 香附子가 主藥으로 配伍된 方劑의 痘症 및 主治

領域區分	病症區分	處 方	主 治
胸門	胃心痛	清鬱散	胃中有伏火 脊上有稠痰 胃口作痛 及嘔吐酸水 惡心煩憫
	積心痛	行氣香蘇散	內傷生冷 外感風寒 又觸七情惱怒 飲食墳滯 胸腹脹痛
	心腹並痛	二炒香良散	心腹痛
前陰門	陰卵偏墜	加減香苓散	偏墜氣初起 壯熱憎寒 乃發表分利藥也 一服而愈
		茴香安腎湯	左邊偏墜丸如鷄鴨子大
	諸疝	十味蒼柏散	通治濕熱疝痛
神門	驚悸	加味溫膽湯	心膽虛怯 觸事易驚 涎與氣搏 變生諸證
	癲癇	清心溫膽湯	諸癇 平肝解鬱 清火化痰益心血
腹門	腹痛	開鬱導氣湯	諸般腹痛 一服立止
	痰飲腹痛	芎朮散	痰積腹痛
血門	衄血	莎芎散	衄血
	齒衄	小薊散	牙宣出血
痰飲門	痰塊	開氣消痰湯	胸中胃脘至咽門窄挾如線疼痛 及手足俱有核如胡桃者
	痰飲	順氣導痰湯	氣升屬火 因氣動者曰痰氣
黃疸門	穀疸	大溫中丸	黃疸黃胖黃腫
	黃疸通治	褪金丸	黃腫絕妙
小兒門	孕婦痘瘡	安胎散	孕婦痘瘡時 胎動
	積癰	消食丸	宿食不消 消乳積 食積
風門	風有中血脉 中腑中臟之異	疏風湯	風中府 手足不仁 先宜解表 後用愈風湯調理
	歷節風	趁痛散	痛風 多屬血虛血污 宜調血行血

Table 2-5. 其他 痘門에 香附子가 主藥으로 配伍된 方劑의 痘症 및 主治

領域區分	病症區分	處 方	主 治
小便門	氣淋	通秘散	氣淋痛 不可忍
牙齒門	齒病	開笑散	風冷齒痛
後陰門	腸風臟毒	香附散(2)	腸風
瘧疫門	瘧疫	香蘇散	四時瘧疫
諸傷門	杖傷	補氣生血湯	杖瘡潰爛 久不愈
虛勞門	腎虛	小安腎丸	虛勞 腎氣冷憊 夜多漩濁 漸覺羸瘦 面黑 目暗 耳鳴 牙齒蛀痛
腰門	風寒腰痛	芍藥散	婦人冷證 腰痛 諸藥不效
皮門	麻木	開結舒經湯	婦人七情六鬱 氣滯經絡 手足麻痺

3. 香附子가 主藥으로 配伍된 方劑의 痘症 · 痘病 調查

香附子가 主藥으로 配伍된 方劑 中 痘症 · 痘病 가 기록된 内容을 調査하여 有形別로 分類하여 整理하였다(Table 3).

Table 3. 香附子가 主藥으로 配伍된 方劑의 痘因·病理

區 分	病因·病理	症 狀	處 方
七情	諸氣鬱滯(氣鬱,六鬱)	不思飲食 面黃形羸 胸膈痞悶諸證	交感丹 降氣湯 六鬱湯(2) 木香調氣散 快氣湯
	氣痛	心腹刺痛	木香破氣散 小烏沈湯 正氣天香湯 神仙九氣湯
	七情所傷(悲哀太甚)		香橘湯 開結舒經湯 調經種玉湯 備金散
	婦人氣盛於血	無子且變生諸證 頭暉硬滿	抑氣散 異香四神散
	一切氣疾	中氣 上氣 氣逆 氣鬱 氣痛	蘇合香丸
	鬱火		六鬱湯
臟腑	心膽虛怯	觸事 易驚 涎與氣搏 變生諸證	加味溫膽湯
	肝鬱 心血虛	諸癟	清心溫膽湯
	胃中有伏火	膈上有稠痰 胃口作痛 及嘔吐酸水 惡心煩悶	清鬱散
	脾虛	不思飲食不化 食後倒飽	香砂六君子湯
	脾受濕熱鬱而不行	黃腫	褪金丸
	虛勞 腎氣冷憊	夜多漩濁 漸覺羸瘦 面黑 目暗 耳鳴 牙齒蛀痛	小安腎丸
六氣	陽明熱鬱	衄血	莎芎散
	濕熱	痘痛	十味蒼朮散
	濕熱在胃	吞酸	增味二陳湯
	風冷	齒痛	開笑散
	四時傷寒 四時瘟疫	頭痛 身疼 發熱 惡寒 及傷風 傷濕 傷寒 時氣瘟疫	香蘇散(2) 香蘇散 香葛湯
	傷寒傷風	頭項強痛	芎芷香蘇散
	風寒	頭痛寒熱 無汗	十神湯
	痼冷	腹痛泄瀉 飲食減少	衝寒散
痰飲	風中府	手足不仁	疎風湯
	痰塊	胸中 胃脘至咽門窄挾如線 疼痛 及手足俱有核如胡桃	開氣消痰湯
	痰飲	痰積腹痛	芎朮散
	濕痰	白帶	四神丸 蒼柏樗皮丸
	痰	精神如故 惡聞食氣 或但嗜 一物 或大吐 或時吐清水	保生湯
	瘀血濕痰	偏墜氣 初起壯熱 憎寒	加減香苓散
	痰火	嘈雜 或兼嘔氣 或兼痞滿 或兼惡心 漸至胃脘作痛	消食清鬱湯

氣血	血虛血污	痛風	趁痛散
	氣血俱實	經水將來 腹中陣痛	清熱調血湯
	血少不能攝精	婦人無子	百子附歸丸
	氣血虛	小產後下血不止	補氣養血湯
	敗血循經流入四肢	產後通身浮腫	正脾散
內傷	內傷生冷 外感風寒 又觸七情惱怒 飲食墳滯	胸腹脹痛	行氣香蘇散
	食鬱	噫酸 惡食 黃疸 鼓脹 瘕塊 脈氣口緊盛	香砂平胃散
	飲食過度	卒然暈倒 口噤不能言 目不識人 四肢不舉等證	加味六君子湯
	傷食生冷硬物	痞滿脹痛	內消散
外傷	宿食不消	腹脹瘦弱痢色無常	消食丸
	杖瘡	潰爛 久不愈	補氣生血湯
其他	胎氣不固	時常小產	安榮湯
	子宮有陰無陽不能生發	婦人無子	玉鑰啓榮丸
	蠭脹	脹滿	撞關飲子 消脹飲子
	穀脹	脹滿	大異香散

4. 香附子의 使用量에 대한 調査

香附子의 각 處方別 一回 使用量을 調査하여 整理하였다. 丸, 元, 丹劑의 경우에는 20貼으로 간

주하고 제제환산 하였다. 85개 處方중 환산이나 구분이 명확한 것만 대상에 포함시켰다(Table 4).

Table 4. 香附子의 一回 使用量

用 量	病 症	處 方	비 고
六厘~五分	通治氣藥	蘇合香元	二兩
	孕婦痘瘡	安胎散	
	歷節風	趁痛散	二錢
	齒衄	小薑散	五錢
	血結成瘕	立效散	等分
	產後浮腫	正脾散	等分
	齒病含漱方	開笑散	等分
	積聚治法	真人化鐵湯	
	蠭脹	消脹飲子	
六分~九分	痰飲腹痛	芎朮散	等分
	求嗣	玉鑰啓榮丸	十五兩
	九氣	神仙九氣湯	等分
	嘈雜	消食清鬱湯	
	陰卵偏墜	加減香苓散	
	調血治法	清熱調血湯	
	上氣	快氣湯	三兩半
	穀疸	大溫中丸	一兩半

六分~九分	風有中血脉中腑中臟之異	疎風湯	
	陰卵偏墜	茴香安腎湯	
	麻木	開結舒經湯	
	氣鬱	交感丹	一斤
	氣痛	木香破氣散	四兩
	腸風癰毒	香附散(2)	一兩
一錢	求嗣	螽斯丸	二兩
	積聚癥瘕痃癖痞塊通治藥	寬中丸	二兩
	血結成瘕	四物調經湯	
	半產	安榮湯	
	氣鬱	降氣湯	
	血崩	補氣養血湯	
	杖傷	補氣生血湯	
	胎漏胎動	桑寄生散	
	諸疝通治	十味蒼柏散	
	積聚治法	大七氣湯	
	六鬱爲積聚癥瘕痃癖之本	六鬱湯	
	產後心腹腰脇痛	養血佐肝丸 推氣養血丸	二兩
	傷寒表證	十神湯 香葛湯	
	食鬱	木香調氣散 香砂平胃散	
一錢	穀脹	大異香散	
	內傷脾胃則不思食不嗜食	香砂六君子湯	
	食傷消導之劑	內消散	
	胃心痛	清鬱散	
	積心痛	行氣香蘇散	
	癩癰	清心溫膽湯	
	痰塊	開氣消痰湯	
	腹痛通治	開鬱導氣湯	
	吞酸吐酸	增味二陳湯	
	痰飲治法	順氣導痰湯	
	氣痛	小烏沈湯	二兩
	婦人雜病	抑氣散	四兩
	心腹並痛	二炒香良散	等分
一錢一分~ 一錢五分	風寒脹痛	芍藥散	四兩
	崩漏治法	備金散	四兩
	衄血	莎芍散	四兩
	血結成瘕	歸朮破癥湯	
	食厥	加味六君子湯	
	痼冷	衝寒散	
	七氣	香橘湯	
	求嗣	調經種玉湯	六錢

一錢六分七厘	氣淋	通秘散	等分
二錢	噯氣	破鬱丹	四兩
	脹滿通治藥	撞關飲子	
	惡阻	保生湯	
	六鬱爲積聚癥瘕之本	六鬱湯(2)	
	通血治法	烏藥湯	
	傷寒表證	香蘇散(2)	
	五色帶下	香附散	
	傷寒表證	芎芷香蘇散	
二錢四分	驚悸	加味溫膽湯	
三錢	瘟疫治法	香蘇散	
	九氣	正氣天香湯	
	黃疸通治藥	褪金丸	六兩
四錢	腎虛藥	小安腎丸	半斤
	婦人雜病	異香四神散	
	帶下治法	四神丸	八兩
六錢	求嗣	調經養血元 百子附歸丸	十二兩

5. 香附子가 主藥으로 配伍된 方劑의 構成內
容 調查

香附子가 主藥으로 配伍된 方劑를 疾患別로 區

分하고, 이에 대한 處方構成 内容을 調査하여 分析하였다(Table 5).

Table 5-1. 婦人門에 香附子가 主藥으로 配伍된 方劑의 構成內容

病 症	處 方	構成內容	構成基本處方
求嗣	調經種玉湯	熟地黃 香附子炒 各六錢 當歸身酒洗 吳茱萸 川芎 各四錢 白芍藥 白茯苓 陳皮 玄胡索 牡丹皮 乾薑炒 各三錢 官桂 熟艾各二錢	交感丹 狗黃四物湯類
	玉鑰啓榮丸	香附子 梔去皮毛 醋水浸三日 炒乾細末 十五兩 當歸 二兩 白芍藥 川芎 赤石脂 藟本 人參 牡丹皮 白茯苓 白薇 桂心 白芷 白朮 玄胡索 没藥 各一兩	交感丹 八物湯類 桂枝茯苓丸類
	調經養血元	香附子 十二兩 酒醋鹽湯煎便 各浸 三日焙 當歸酒洗 白芍藥酒炒 生乾地黃酒沈 牡丹皮酒洗 各二兩 川芎 白茯苓 白芷 乾薑炒 肉桂 紅花 桃仁 没藥 半夏油炒 阿膠珠 各一兩 玄胡索六錢 蓬朮 煨醋炒 甘草灸 各五錢 茴香炒 二錢	二陳湯 桂枝茯苓丸類 四物黃狗丸
	百子附歸丸	四製 香附子 末十二兩 川芎 白芍藥 當歸 熟地黃 阿膠珠 陳艾葉各二兩	四物黃狗丸
	螽斯丸	香附子 白薇 半夏 白茯苓 杜沖 厚朴 當歸 秦艽 各二兩 防風 肉桂 乾薑 牛膝 沙參 各一兩半 細辛 人參 各二錢三分	交感丹 小半夏茯苓湯
婦人雜病	抑氣散	香附子四兩 陳皮二兩 茯神 甘草 各一兩	降氣湯
	異香四神散	香附子 四錢 陳皮 三錢 烏藥 二錢 甘草 一錢	

產後心腹脇痛	推氣養血丸	便香附子 二兩 當歸 川芎 白芍藥酒炒 白朮土炒 青皮油炒 陳皮 枳實 烏藥 厚朴 神曲 乾薑炒黑 白芥子 炒 各一兩 三稜 蓬朮並醋炒 各八錢 麥芽炒 肉桂 各六錢 木香 三錢	四物湯 翹藥枳朮丸 六味三稜丸
	養血佐肝丸	香附子醋炒 二兩 當歸 川芎 白芍藥酒炒 陳皮 半夏油炒 白朮炒 青皮油炒 神曲炒 蘿蔔子炒 牡丹皮 紅花 白茯苓 各一兩 柴胡酒炒桃仁炒 各八錢 草龍膽酒洗 六錢 三稜 蓬朮並醋炒 各五錢	四物湯 六味三稜丸類
胎漏胎動	桑寄生散	桑寄生 繢斷 川芎 當歸 白朮 香附子 阿膠珠 茯神 各一錢 人參 甘草 各五分	交感丹 芎歸湯 四君子湯
半產	安榮湯	熟地黃 白芍藥 川芎 當歸 阿膠珠 香附子 桑寄生 白朮 黃芩 縮砂 各一錢 糯米百粒	安胎飲類
血崩	補氣養血湯	人參 黃芪 當歸 白朮 白芍藥酒炒 艾葉 阿膠 川芎 青皮 香附子炒 縮砂研 甘草灸 各一錢	十全大補湯類 膠艾四物湯類
惡阻	保生湯	白朮 香附子 烏藥 橘紅各二錢 人參 甘草 各一錢	異香四神散
產後浮腫	正脾散	蓬朮炮 便香附子 陳皮 茴香 甘草灸 各等分	
血結成瘕	四物調經湯	香附子醋炒一錢 當歸 川芎 白芍藥酒炒 柴胡 黃芩 枳殼各七分 熟地黃 陳皮 白朮 三稜 蓬朮並醋炒 白芷 茴香鹽水炒 玄胡索 各五分 青皮 縮砂 紅花 甘草 各三分	四物湯 小柴胡湯類 荊蓬煎元類
	立效散	青皮 陳皮 烏藥 乾薑 香附子 蓬朮 三稜 各等分	六味三稜丸類
	歸朮破癰湯	香附子醋炒一錢半 三稜 蓬朮並醋煮 赤芍藥 白芍藥 當歸尾 青皮各一錢 烏藥 七分 紅花 蘇木 官桂各五分	
調血	煮附丸	香附子 擦去毛好醋煮 半日焙 為末 醋糊 和丸 梧子大 米飲下五十九.	
	清熱調血湯	當歸 川芎 白芍藥 生乾地黃 黃連 香附子 桃仁 紅花 蓬朮 玄胡索 牡丹皮 各七分	桃紅四物湯 狗黃四物丸類
	墨附丸	四製香附子一斤 淨熟艾四兩用醋一椀煮 至乾 入石臼內搗爛捏作餅子於新瓦上焙乾 入白茯苓 當歸 人參 川芎 熟地黃 京墨 火煅 紅醋淬 各一兩 木香 五錢 右爲末醋 糊和丸 梧子大 溫酒吞下 七八十九	四物湯類
	四製香附丸	香附米一斤分作四製 一用鹽水加薑汁浸煮略 炒主降痰 一用米醋浸煮略炒主補血 一用山梔 仁四兩同炒去梪主散鬱 一用童便洗過不炒主 降火 右爲末入 川芎 當歸 二兩 同爲末 酒麪 糊和丸梧子大 每五十九	
	七製香附丸	香附米十四兩分七包 一包同當歸二兩酒浸 二包同蓬朮二兩童便浸 三包同牡丹皮 艾葉 各一兩米泔浸 四包同烏藥二兩米泔浸 五包同 川芎玄胡索各一兩水浸 六包同三稜 柴胡各一 兩醋浸 七包同紅花烏梅各一兩鹽水浸 右各浸 春五夏三秋七冬 十日晒乾 只取香附爲末 以浸藥水打糊和丸梧子大 臨臥酒下八十九	

Table 5-2. 胞·氣門에 香附子가 主藥으로 配伍된 方劑의 構成內容

病 症	處 方	構成內容	構成基本處方
帶下	四神丸	香附子米 八兩 以酒 醋 鹽水 童便 各浸 二兩 過三日乃出炒 蒼朮四兩 米泔浸 牡蠣粉炒 縮砂炒 檉根白皮蜜水炒 各二兩	
	蒼柏檉皮丸	蒼朮 黃柏 檉根白皮 海石 半夏製 南星炮 川芎 香附子 乾薑 各等分	二妙散
	香附散	香附子去毛 碎醋煮半日焙爲末 每二錢 米飲調下空心神效.	
崩漏	備金散	香附子炒黑 四兩 當歸尾 一兩二錢 五靈脂炒 一兩	
通血	烏藥湯	香附子二錢 烏藥一錢半 當歸一錢 木香 甘草 各五分	
氣痛	木香破氣散	香附子 四兩 烏藥 薑黃 各二兩 木香 甘草灸 各五錢	
	小烏沈湯	香附子 二兩 烏藥一兩 沈香 甘草 各二錢半	
氣鬱	交感丹	香附子 一斤 長流水浸三日取炒 茯神四兩	
	降氣湯	香附子製 茯神 甘草各一錢	交感丹
九氣	神仙九氣湯	香附子 片子薑黃 甘草灸 各等分	
	正氣天香湯	香附子 三錢 烏藥 陳皮 紫蘇葉 各一錢 乾薑 甘草 各五分	異香四神散
上氣	快氣湯	香附子 三兩半 縮砂 八錢 甘草灸 四錢	降氣湯類
七氣	香橘湯	香附子米炒 半夏製 橘皮 各一錢半 甘草灸 五分 薑五片 棗二枚	二陳湯類
通治	蘇合香元	白朮 木香 沈香 犀角 丁香 安息香 白檀香 朱砂(水飛半爲衣) 犀角 訶子皮 香附子 菖撥 各二兩 蘇合油(入安息香膏內) 乳香 龍腦 各一兩	

Table 5-3. 積聚門에 香附子가 主藥으로 配伍된 方劑의 構成內容

病 症	處 方	構成內容	構成基本處方
積聚	大七氣湯	三稜 蓬朮 青皮 陳皮 桔梗 蕁香 益智仁 香附子 肉桂 甘草各一錢	六味三稜丸類
	真人化鐵湯	三稜 蓬朮 青皮 陳皮 山楂肉 神麴 香附子 枳實 厚朴 黃連 當歸 川芎 桃仁 檳榔 各五分 紅花 木香 甘草 各三分	荊蓬煎元類 越鞠丸類 桃紅芍歸湯 小承氣湯類
	六鬱湯(2)	香附子 二錢 川芎 蒼朮 各一錢半 陳皮 半夏製 各一錢 赤茯苓 柴子仁 各七分 縮砂 甘草 各五分	越鞠丸類 二陳湯 降氣湯類
	六鬱湯	便香附子 蒼朮 神麴 柴子 連翹 陳皮 川芎 赤茯苓 貝母 枳殼 紫蘇葉 各一錢 甘草 五分	越鞠丸 降氣湯類
	木香調氣散	烏藥 香附子 枳殼 青皮 陳皮 厚朴 薰蕎 蒼朮 各一錢 木香 縮砂 各五分 桂皮 甘草 各三分	香砂平胃散 越鞠丸類 快氣湯
	香砂平胃散	蒼朮 厚朴 陳皮 便香附子 各一錢 山楂肉 縮砂 枳殼 麥芽 神麴 乾薑 木香 各五分 甘草灸 三分	平胃散 越鞠丸 快氣湯
積聚 癰瘕 痃癖 痞塊	寬中丸	蒼朮炒 烏藥 香附子 各二兩 三稜 蓬朮 並醋煮焙 青皮 陳皮 乾薑炮 良薑炮 茵香炒 神麴炒 麥芽炒 各一兩	越鞠丸類 六味三稜丸 四味茵香散

5-4. 内傷·寒門에 香附子가 主藥으로 配伍된 方劑의 構成內容

病 症	處 方	構成內容	構成基本處方
內傷脾胃則不思食不嗜食	香砂六君子湯	香附子 白朮 白茯苓 半夏 陳皮 白豆蔻 厚朴 各一錢 縮砂 人參 木香 益智仁 甘草 各五分	六君子湯 平胃散類 交感丹類
食厥	加味六君子湯	香附子 一錢半 白朮 白茯苓 陳皮 半夏 各一錢 人參 七分 木香 縮砂 各五分 甘草 三分	六君子湯 快氣湯
食傷消導	內消散	陳皮 半夏 白茯苓 枳實 山楂肉 神曲 縮砂 香附子 三稜 蓬朮 乾生薑 各一錢	二陳湯 六味三稜丸類 交感丹類
嘈雜	消食清鬱湯	半夏 陳皮 白茯苓 神曲炒 山楂肉 香附子 川芎 麥芽炒 枳殼 梔子炒 黃連 薑汁炒 蒼朮 蕤香 甘草各七分	二陳湯 越鞠丸
噫氣	破鬱丹	香附子醋煮 梔子仁炒 各四兩 黃連薑汁炒 二兩 枳實 檳榔 蓬朮 青皮 瓜萎仁 蘇子 各一兩	
吞酸 吐酸	增味二陳湯	半夏 陳皮 茯苓 梔子炒 黃連炒 香附子 各一錢 枳實 川芎 蒼朮 各八分 白芍藥七分 神曲炒五分 甘草 三分	二陳湯 越鞠丸 芍藥甘草湯
傷寒 表證	香蘇散(2)	香附子 紫蘇葉 各二錢 蒼朮一錢半 陳皮 一錢 甘草灸 五分	
	芎芷香蘇散	香附子 紫蘇葉各二錢 蒼朮一錢半 陳皮 川芎 白芷 各一錢 甘草 五分	香蘇散
	十神湯	香附子 紫蘇葉 升麻 赤芍藥 麻黃 陳皮 川芎 乾葛 白芷 甘草 各一錢	升麻葛根湯 芎芷香蘇散類
	香葛湯	蒼朮 紫蘇葉 白芍藥 香附子 升麻 乾葛 陳皮 各一錢 川芎 白芷 甘草 各五分	升麻葛根湯 芎芷香蘇散類
痼冷	衝寒散	香附子 陳皮 草果 各一錢半 縮砂 白薑 肉豆蔻 各七分 蕤香 白茯苓 木通 吳茱萸 各三分	回生散 快氣湯類

Table 5-5. 脹滿·胸·前陰門에 香附子가 主藥으로 配伍된 方劑의 構成內容

病 症	處 方	構成內容	構成基本處方
脹滿	撞關飲子	香附子 二錢 烏藥 一錢二分 厚朴 一錢 縮砂 八分 三稜 白豆蔻 甘草 各五分 丁香 沉香 各三分	小烏沈湯 快氣湯 神香散
穀脹	大異香散	三稜 蓬朮 青皮 陳皮 蕤香 半夏曲 桔梗 益智仁 香附子 枳殼各一錢 甘草 二分半	六味三稜丸類 桔梗枳殼湯 二陳湯類
蠶脹	消脹飲子	猪苓 澤瀉 人參 白朮 赤茯苓 半夏 陳皮 青皮 厚朴 紫蘇葉 香附子 縮砂 木香 檳榔 大腹皮 木通 蘿蔔子 甘草 各五分	平陳湯 香蘇散 君苓湯
胃心痛	清鬱散	半夏 陳皮 白茯苓 蒼朮 便香附子 神曲 黃連薑汁炒 梔子薑汁炒 各一錢 川芎 六分 乾薑炒黑 五分 甘草灸 二分	二陳湯 越鞠丸
積心痛	行氣香蘇散	紫蘇葉 陳皮 蒼朮 香附子 烏藥 川芎 羌活 枳殼 麻黃 甘草 各一錢 生薑 三片	香蘇散 正氣天香湯類 越鞠丸類
心腹並痛	二炒香良散	香附子 良薑 等分	

陰卵偏墜	加減香苓散	枳殼 陳皮 香附子 蒼朮 麻黃 猪苓 澤瀉 木通 滑石 車前子 三棱 蓬朮 川棟子 玄胡索 甘草 各七分	香蘇散類 四苓散類 六一散 車前木通湯
	茴香安腎湯	人參 白朮 白茯苓 苗香 破故紙 檳榔 烏藥 便香附子 縮砂 荔枝核 各八分 黃柏 澤瀉 各六分 木香 玄胡索 各四分 升麻 甘草 各二分	荔香散 四君子湯 四磨散類 降氣湯
諸疝	十味蒼朮散	蒼朮 黃柏 香附子 各一錢 青皮 玄胡索 益智仁 桃仁 各七分 茴香炒 附子炮 甘草 各五分	二妙散

Table 5-6. 神·腹·血·痰飲門에 香附子가 主藥으로 配伍된 方劑의 構成內容

病 症	處 方	構成內容	構成基本處方
驚悸	加味溫膽湯	香附子 二錢四分 橘紅 一錢二分 半夏 枳實 竹茹 各八分 人參 白茯苓 柴胡 麥門冬 桔梗 各六分 甘草 四分	香橘湯 溫膽湯
癲癇	清心溫膽湯	陳皮 半夏 茯苓 枳實 竹茹 白朮 石菖蒲 黃連 薑汁炒 香附子 當歸 白芍藥 各一錢 麥門冬 八分 川芎 遠志 人參 各六分 甘草 四分	溫膽湯 交感丹類 定志小丸 四物湯類
腹痛	開鬱導氣湯	蒼朮 香附子便炒 白芷 川芎 赤茯苓 滑石 梔子炒 神曲炒 各一錢 乾薑炮 陳皮 各五分 甘草灸三分	越鞠丸 平胃散類 六一散 交感丹類
痰飲腹痛	芎朮散	川芎 蒼朮 香附子 白芷各等分	
衄血	莎芎散	香附子四兩 川芎二兩	
齒衄	小薊散	百草霜 小薊 香附子 蒲黃炒 各五錢	
痰塊	開氣消痰湯	桔梗 便香附子 白僵蠶炒 各一錢 陳皮 片芩 枳殼 各七分 前胡 半夏 枳實 羌活 荊芥 檳榔 射干 威靈仙 各五分 木香 甘草 各三分	桔梗枳殼湯 二陳湯祛痰散
痰飲	順氣導痰湯	半夏 南星 茯苓 枳實 陳皮 香附子 烏藥 各一錢 木香 沈香 甘草 各五分	導痰湯 異香四神散

Table 5-7. 黃疸·小兒·風門에 香附子가 主藥으로 配伍된 方劑의 構成內容

病 症	處 方	構成內容	構成基本處方
黃疸	大溫中丸	香附子一兩半 鍼砂一兩 陳皮 蒼朮 厚朴 青皮 三稜 蓬朮 黃連 苦參 白朮 各五錢 生甘草 二錢	平胃散 六味三稜丸祛神曲麥芽
	褪金丸	鍼炒 煅紅醋淬 香附子 便浸 各六兩 蒼朮 白朮 各二兩半 陳皮 神曲 麥芽 各一兩半 厚朴 甘草 各一兩	平胃散
孕婦痘瘡	安胎散	人參 陳皮 大腹皮 白朮 當歸 川芎 白芍藥 香附子童便炒 縮砂 紫蘇葉 赤茯苓 甘草 各三分	異功散 安胎飲
積癰	消食丸	香附子炒五錢 縮砂 陳皮 三稜 蓬朮 神曲 麥芽 各二錢半	六味三稜丸類
風有中血脉中 腑中臟之異	疎風湯	羌活 防風 當歸 川芎 赤茯苓 陳皮 半夏 烏藥 白芷 香附子 各八分 桂枝 細辛 甘草 各三分	防風湯 芎歸湯 二陳湯 快氣湯
歷節風	趁痛散	桃仁 紅花 當歸 地龍 五靈脂 牛膝酒浸 羌活酒浸 香附子童便浸 甘草生 各二錢 乳香 没藥 各一錢	五靈丸類

Table 5-8. 其他 痘症門에 香附子가 主藥으로 配伍된 方劑의 構成內容

病 症	處 方	構成內容	構成基本處方
氣淋	通秘散	香附子 陳皮 赤茯苓 各等分	
齒病含漱方	開笑散	白芷 細辛 良薑 薑撥 川椒 香附子 露蜂房 各等分	
腸風臟毒	香附散(2)	香附子炒一兩 枳殼七錢半 當歸 川芎 各五錢 槐花炒 甘草 各二錢半	芎歸湯
瘧疫	香蘇散	香附子 三錢 紫蘇葉 二錢半 陳皮 一錢半 蒼朮 甘草 各一錢	
杖傷	補氣生血湯	人參 白朮 白茯苓 白芍藥 當歸 陳皮 香附子 貝母 桔梗 熟地黃 甘草 各一錢	八珍湯祛川芎
腎虛	小安腎丸	香附子 川練子各半斤 用鹽二兩 水二升 同煮候乾 剉焙 茵香炒六兩 熟地黃四兩 川烏炮 川椒炒 各二兩	
風寒脇痛	芍藥散	香附子四兩以醋二升鹽一兩同煮乾爲度 肉桂 玄胡索炒 白芍藥酒炒 各一兩	
麻木	開結舒經湯	紫蘇葉 陳皮 香附子 烏藥 川芎 蒼朮 羌活 南星 半夏 當歸 各八分 桂枝 甘草 各四分	香蘇散 正氣天香湯類 芎歸湯

III. 考 察

東醫寶鑑 中 香附子가 主藥으로 配伍된 方劑의 治療領域에 대한 調查 結果, Table 1에서 보는 바와 같이 婦人, 胞, 氣, 積聚, 內傷, 寒, 脹滿, 胸, 前陰, 神, 腹, 血, 痰飲, 黃疸, 小兒, 風, 小便, 牙齒, 後陰, 溫疫, 諸傷, 虛勞, 脇, 皮門 等 24개의 영역에서 活用하고 있음을 알 수 있었다.

이 중 婦人에 대한 사용빈도가 16.4%로 가장 많았고, 胞 15.2%, 氣 10.5%, 積聚 8.1%, 內傷 7.0%, 寒 5.9% 等의 順이었다(Table 1).

香附子가 主藥으로 配伍된 方劑의 痘症을 조사해 보면 婦人門에서는 求嗣, 婦人雜病, 產後心腹腰脇痛, 胎漏胎動, 半產, 血崩, 惡阻, 產後浮腫 等에 活用하고 있다. 이를 통해 볼 때 香附子는 諸般 婦人科疾患의 치료에 使用되고 있어, 香附子가 血中의 원기를 복돋고 血分을 運行시키는 效能이 있는 藥物임을 보여주고 있다(Table 2-1). 그리고 胞門에서는 血結成瘕, 調血治法, 帶下治法, 崩漏治法, 五色帶下, 通血治法 等에 活用하고 있는데, 이를 통

해 볼 때 香附子는 調經止痛의 效能이 있음을 알 수 있다(Table 2-2). 氣門에서는 氣痛, 氣鬱, 九氣, 上氣, 七氣, 通治氣藥 等 諸般 氣病에 活用하고 있음을 볼 때 理氣解鬱의 效能이 있음을 보여주고 있다(Table 2-2). 그리고 積聚門에서는 積聚, 瘰瘕, 痰癖 等에 主藥으로 活用되었고 脹滿門에서는 脹滿通治藥, 穀脹, 蠕脹 等에 쓰이는데, 이를 통해 보면 香附子는 飲食物이나 情緒的인 鬱滯로 인한 積聚, 脹滿의 치료에 使用되고 있어, 理氣行滯 破積의 效能이 있음을 알 수 있다(Table 2-3). 그리고 內傷門에서는 內傷脾胃, 食厥, 嘴雜, 嘘氣, 吞酸吐酸 等에 活用하고 있으며, 胃心痛, 積心痛, 心腹痛, 痰飲腹痛에도 活用하고 있는 것으로 보아 일체의 氣, 霍亂으로 인한 吐瀉腹痛을 치료하고 消化를 촉진시키는 效能이 있음을 알 수 있다(Table 2-3, 2-4). 그리고 寒門에서는 傷寒表證, 痘冷 等에 活用하고 있는 것으로 보아 전염성 寒邪를 몰아내는 效能이 있음을 알 수 있다(Table 2-3). 또한 前陰門에서는 陰卵偏墮, 諸般疝症에 使用되고 있는 것으로 보아 疏肝理氣의 效能이 있음을 알 수 있다(Table 2-4). 그 밖에도 驚悸, 癲癇, 痰塊, 穀

疸등의 黃疸, 鮫血, 齒衄等의 出血疾患, 孕婦痘瘡, 積癰, 歷節風, 杖傷, 腎虛疾患, 氣淋, 齒病, 瘰疫, 癥木 等의 痘症에 香附子가 主藥으로 使用되었음을 알 수 있다(Table 2-4, 2-5).

香附子가 主藥으로 配伍된 方劑의 痘因·病理를 조사한 결과, 七情과 관련된 痘因으로는 諸氣鬱滯, 鬱火, 氣痛, 悲哀太甚 等이 조사되었으며, 氣血病理에 있어서는 血虛血汚, 氣血俱實, 氣血虛 等이 조사되었고, 痰飲과 관련된 痘因으로는 痰塊, 濕痰, 痰血濕痰 等이 조사되었고, 臟腑와 관련된 痘因으로는 心膽虛怯, 肝鬱 心血虛, 胃中有伏火, 脾虛, 濕熱在胃, 腎氣冷憊, 陽明熱鬱 等이 조사되었고, 六氣와 관련된 痘因으로는 濕熱, 風冷, 風寒, 四時瘟疫 等이 조사되었으며, 內傷과 관련된 痘因으로는 食鬱, 飲食過度, 宿食不消 等이 조사되었고, 그 외 杖瘡 等의 外傷과 胎氣不固등의 痘理에 香附子가 사용되었음을 알 수 있었다(Table 3).

이를 통해 香附子는 肝, 脾胃, 心에 주로 作用하는 藥物이며 氣血循環不利, 七情鬱結에 의한 氣滯, 痰飲이나 積聚, 脹滿 等의 痘因, 痘理에 사용하고 있음을 알 수 있다.

그리고 香附子가 主藥으로 配伍된 方劑에서 使用量을 조사한 결과는 1회 使用量으로 볼 때 병증에 따라 六厘에서 六錢까지 폭넓게 사용하고 있음을 알 수 있었으며, 이중 一錢이 사용된 경우가 35.3%로 가장 많았고, 一錢초과 二錢이 사용된 경우가 20.0%로 조사되었다. 따라서 香附子는 一錢에서 二錢사이 용량을 가장 많이 사용하고 있음을 알 수 있다. 丸, 散, 丹劑는 20貼으로 간주하고 제제환산 하였으며 85개 處方중 환산이나 구분이 명확한 것만 대상에 포함시켰다(Table 4).

그리고 香附子가 主藥으로 配伍된 方劑의 處方構成을 조사한 결과 婦人門에서는 白茯神을 배합하여 香附子의 理氣解鬱하는 效能을 높였으며, 交感丹, 四物湯類등의 基本方을 많이 사용하였고 狗黃四物湯, 桂枝茯苓丸, 八物湯, 四勿黃狗丸, 六味三稜丸 등을 配合하여 活用하였다(Table 5-1).

胞門에서는 四物湯類를 配合하여 治血作用을 높였고, 茉莉煎元, 桃紅四物湯, 二妙散 등을 配合하여 活用하였으며, 氣門에서는 烏藥, 白茯神, 砂仁 等을 配合하여 理氣作用을 강화시켜 氣鬱을 풀어주고, 異香四神散, 二陳湯 等을 配合하여 活用하였다(Table 5-2).

積聚門에서는 三稜, 蓬朮, 青皮, 陳皮 等을 配合하여 破積行氣作用을 강화시켜 積聚를 풀어주고 六味三稜丸, 茉莉煎元, 越鞠丸, 二陳湯, 降氣湯, 平胃散 等의 基本方을 配合하여 使用하였다며, 內傷門에서는 白朮, 半夏, 陳皮 等을 配合하여 理氣作用을 강화시켜 消導시켜주고 六君子湯, 平胃散, 二陳湯, 六味三稜丸, 越鞠丸 等을 配合하여 活用하였다(Table 5-3, 5-4).

寒門에서는 香蘇散, 蔡芷香蘇散, 升麻葛根湯, 回生散 等을 配合하여 活用하였고, 脹滿門에서는 小烏沈湯, 六味三稜丸, 平陳湯 等을 配伍하여 穀脹, 蠕脹등에 活用하였으며 胸門에서는 二陳湯, 越鞠丸, 正氣天香湯 等을 配合하여 活用하였으며, 良薑을 配伍하여 心腹痛에 使用하였다(Table 5-4, 5-5).

前陰門에서는 香蘇散, 四苓散, 六一散, 荔香散, 四磨散, 二妙散 等을 配合하여 活用하였고 溫膽湯과 함께 配伍하여 驚悸에 使用하였고, 溫膽湯, 交感丹, 定志小丸, 四物湯 等을 配伍하여 癲癇에 使用하였고, 桔梗枳殼湯, 二陳湯 等을 配伍하여 痰塊에 사용하였으며, 導痰湯, 異香四神散 等을 配伍하여 痰飲疾患에 使用하였고, 越鞠丸, 平胃散, 六一散, 交感丹 等을 配伍하여 腹痛에 使用하였으며, 平胃散, 六味三稜丸 等을 配伍하여 黃疸에 使用하였고, 川芎을 配伍하여 鮫血에 使用하였으며, 百草霜, 小蘿蔔, 蒲黃 等을 配伍하여 齒衄에 使用하였고, 異功散, 安胎飲 等을 配伍하여 孕婦痘瘡에 使用하였으며, 六味三稜丸 等을 配伍하여 積癰에 使用하였고, 防風湯, 蔡歸湯, 二陳湯, 快氣湯 等을 配伍하여 風病에 사용하였으며, 五靈丸類 等을 配伍하여 歷節風에 使用하였고, 八珍湯 等을 配伍하여 杖傷에 사용하였으며 川練子, 川烏, 川椒 等을 配伍하

여 腎虛에 使用하였고, 芍歸湯 等을 配伍하여 腸風臟毒에 使用하였으며, 香蘇散, 正氣天香湯, 芍歸湯 等을 配伍하여 癥瘕에 使用하고 있음을 볼 수 있다(Table 5-5, 5-6, 5-7, 5-8)

위에서 보는 바와 같이 香附子는 配伍되는 處方이나 藥物에 따라 理氣解鬱 疏肝理氣, 調經止痛 等의 다양한 效能을 發揮하고 있음을 알 수 있다. 이를 통하여 香附子가 配合된 方劑를 分석하고 構成藥物의 作用을 이해할 뿐 아니라, 方劑構成에 대한 이론적 근거를 제시하는데 많은 기여를 할 수 있을 것으로 생각된다.

IV. 要 約

東醫寶鑑 中 香附子가 主藥으로 配伍된 85개 處方에 대하여 資料調査를 한 바 다음과 같이 要約 할 수 있었다.

1. 香附子가 主藥으로 構成된 方劑의 治療領域에 따른 치방빈도는 婦人門이 16.4%, 胞門이 15.2%, 氣門이 10.5%, 積聚門이 8.1% 순으로 많은 빈도수를 차지하였으며, 그 밖에도 20개 治療領域에 사용되었음을 알 수 있었다.
2. 香附子는 求嗣, 月經不調, 氣鬱, 氣痛, 積聚등의 痘症에 가장 많이 활용되고 있었으며, 그밖에도 55개 병증에 사용하였다.
3. 香附子가 主藥으로 사용된 處方의 痘因病理는 諸氣鬱滯, 七情, 痰飲, 食傷, 風寒등의 痘理가 많았다.
4. 香附子가 主藥으로 사용된 處方의 1회 香附子 사용량은 6厘~6錢까지이며, 1錢을 가장 많이 사용하였다.
5. 香附子는 配伍되는 藥物과 치방에 따라 理氣解鬱, 疏肝理氣, 調經止痛등의 다양한 작용을 하는 것을 알 수 있으며, 香附子가 主藥으로 사용된 處方의 基本方으로는 交感丹, 二陳湯, 六味

三稜丸을 가장 많이 사용하였음을 알 수 있다.

參考文獻

1. 辛民敎. 臨床本草學. 서울:永林社. 1997:477-8.
2. 康秉秀. 臨床配合本草學. 서울:永林社. 1994:333-6.
3. 金昌玟, 辛民敎, 李京淳, 安德均 外. 完譯 中藥大辭典. 서울:鼎談. 1998:6124-30.
4. 韓醫科大學 本草學 編纂委員會. 本草學. 서울:永林社. 2006:399-400.
5. 安德均. 韓國本草圖鑑. 서울:敎學社. 2003:593.
6. 申佶求. 申氏本草學 各論. 서울:壽文社. 1988:486-9.
7. 金京玉 著. 實用 本草學. 서울:鼎談. 2001:238-9.
8. 김철우, 김형돈. 國시 本草學. 서울:군자. 2007: 190.
9. 옥은성. 本초학. 서울:신광출판사. 2004:191-2.
10. 신용욱, 신전휘. 肾臟病의 肾臟本초. 대구: 계명대학교출판부. 2006:141.
11. 임종필. 本초생약학. 서울:신일상사. 2003:224-5.
12. 한국생약학교수협의회. 本草學. 서울:아카데미 서적. 2002:439-41.
13. 한방약리학 교재편찬위원회 著. 한방약리학. 서울:신일상사. 2005:632-3.
14. 한종현, 김기영. 한방약리학. 서울:의성당. 2004: 309-11.
15. 國家中醫藥管理局《中華本草》編委會. 中華本草 下冊. 上海:上海科學技術出版社. 1998:2236-43.
16. 許濟群, 王綿之 主編. 方劑學. 北京:人民衛生出版社. 1995:14.
17. 李飛 主編. 方劑學(上冊). 北京:人民衛生出版社. 2002:68.
18. 許浚. 東醫寶鑑. 서울:南山堂. 1998:30, 31, 34, 35, 36, 37, 44, 50, 62, 71, 107, 109, 145, 146, 148, 149, 150, 153, 155, 179, 314, 339, 340, 360, 362, 373, 381, 429, 435, 444, 513, 533, 560, 596, 771, 773, 774, 638, 648, 653, 655, 660, 676, 744,

- 745, 749, 756, 791, 794, 815, 916, 955, 956, 957,
963, 965, 968 984, 990, 991, 992, 997, 1041,
1079.
19. 龔廷賢. 國譯 萬病回春(上,下). 서울:癸丑文化
社. 1977:112, 212, 213, 221, 317, 324, 329, 354,
下174, 下175, 下223, 下280.
20. 尹用甲. 新東醫方劑2233(도해임상활용). 서울:
도서출판 정담. 2006:44, 87, 89, 142, 166, 168,
169, 170, 268, 276, 330, 331, 344, 398, 429, 488,
489, 497, 618, 696, 727, 728, 818, 844, 854, 878,
987, 1079, 1102, 1104, 1106, 1116, 1130, 1139,
1160, 1232, 1263, 1269, 1288, 1292, 1408, 1439,
1554, 1555, 1617, 1726, 1765, 1808, 1816, 1849,
1851, 1876, 1904, 1964, 1969, 1980, 2065, 2077,
2081, 2129, 2147, 2188, 2234, 2243, 2259, 2316,
2326, 2329, 2333, 2335, 2339, 2340, 2341, 2471.