

方藥合編 醫方活套 中 柴胡가 配合된 方劑에 관한 考察

강석훈¹, 이진호², 권동렬¹

¹원광대학교 한약연구소·약학대학 한약학과, ²원광대학교 한의학전문대학원 한약자원개발학과

ABSTRACT

Application of prescription of Bupleuri Radix mixture in the Uibanghwaltu chapter of the Bangyakhappyeon

Suk-Hoon Kang¹, Jin-Ho Lee², Dong-Yeul Kwon¹

¹Dept. of Oriental Pharmacy, College of Pharmacy,

Wonkwang Oriental Medicines Research Institute, Wonkwang University,

²Dept. of Herbal Resources, Professional Graduate School of Oriental Medicine Wonkwang University

Objectives : Bangyakhappyeon was classified into three tongs of prescription. When juxtaposed with existing publications on oriental medicine, this composition was considerably original. Due to its ease of searching for diseases and prescription, it has been read by not only doctors and researchers but also among general citizens alike. Based on the fundamentals of Bangyakhappyeon composition, this thesis focused on the thorough research on the prescription of Bupleuri Radix mixture.

Methods : 42 prescriptions of Bupleuri Radix mixtures have been divided in to three tongs based on the composition of Bangyakhappyeon. Then, these prescriptions, dosage, and composition were researched and organized.

-
- 교신저자 : 권동렬
 - 전북 익산시 신용동 344-2 원광대학교 한약학과 한약연구소
 - Tel : 063-850-6802 Fax : 063-852-6802 E-mail : sssimi@wku.ac.kr
 - 접수 : 2012/ 09/ 14 수정 : 2012/ 12/ 03 채택 : 2012/ 12/ 06

Results : After analyzing the prescription of Bupleuri Radix mixture in the Uibanghwaltu chapter of the Bangyakhappyeon text, the following results were attained.

1. Of the 42 prescriptions of Bupleuri Radix mixtures, jungtong constitutes the most prescription at 30, 8 at hatong, and 4 at sangtong.

2. 42 prescriptions are documented into 18 medical divisions and 44 disease symptoms.

3. After analyzing the prescription dosage of Bupleuri Radix mixture, the dosage of Bupleuri Radix was 3 *puns* to 4 *jeons* used in 14 sections. Most use was 1 *jeon* 14 prescriptions, 33.3% were recorded.

4. Invigorating vital function, catharsis, malaria, mediation method, and clearing away method of Bupleuri Radix have a close relationship with the dosage.

5. The 42 prescriptions formation of using Bupleuri Radix consisted of decoction at 39 prescriptions (92.9%) and the others at 3 prescriptions (7.1%).

6. As a result of researching the component of the prescription of Bupleuri Radix mixture, Sosihotang, Soyosan and Bojungikgitang were used as the basic prescription.

Conclusions : prescription of Bupleuri Radix mixture in Uibanghwaltu of Bangyakhappyeon as based on Sosihotang, Soyosan and Bojungikgitang, combined with various oriental medicine was found to treat many kinds of diseases.

Key word : Bupleuri Radix, Bangyakhappyeon, Uibanghwaltu, prescription

1. 緒 論

柴胡(Bupleuri Radix)는 繖形科(미나리과, Umbelliferae)에 속하는 多年生本草인 시호 *Bupleurum falcatum* L.의 뿌리를 건조한 것이다. 中國에서는 柴胡(北柴胡) *B. chinense* DC, 혹 狹葉柴胡(南柴胡) *B. scorzonerifolium* Willd. 의 뿌리를 봄과 가을에 採取하여 莖葉과 泥沙를 제거하고 건조한 것을 말한다¹⁾. 柴胡는 性이 微寒(涼)無毒하고 味는 苦辛하며 肝과 膽으로 歸經한다.

柴胡의 效能과 主治는 네 가지로 나눌 수 있다. 첫째, 柴胡는 解表清熱의 效能이 있어 外感表證의 發熱과 少陽證의 寒熱往來, 口苦, 目眩 등을 치료한다. 둘째, 疏肝泄氣의 작용으로 肝鬱 및 각종 원인으로 인한 氣滯로 발생하는 脇痛, 月經不調, 乳房脹痛 등에 사용한다. 셋째, 升舉陽氣하여 氣虛下陷으로 인한 久泄脫肛, 子宮脫垂 등을 치료한다. 넷째, 瘧熱을 물리치는데 사용되어 瘧疾로 인한 寒熱을 治療하는 藥으로 쓰였다²⁾.

柴胡는 주로 Saponin과 정유를 주성분으로 함

유하고 있다. Saponin은 saikosaponin A, B, C, D가 있고, 정유 성분으로는 bupleumol, eugenol 등이 있다. 약리작용은 해열작용, 진정진통작용, 소염작용, 혈청지질강하작용, 간기능보호작용, 이담작용, 항궤양작용이 있다고 보고되어 있다³⁾.柴胡는 부작용이 적지만 다량으로 경구 투여할 경우 기면현상이나 작업능률 저하가 나타나고 식욕감퇴와 복부창만감 등과 같은 증상이 수반되기도 하고,柴胡 주사액을 근육주사 하는 경우 allergy 반응과 쇼크를 유발하기도 한다⁴⁾. 또한柴胡의 물추출물의 ether 분획과 n-BuOH 분획은 벤조알라피렌 등으로 유발한 돌연변이 활성을 증가시킨다고 알려져 있다⁵⁾.

柴胡處方에 관한 연구로는 박 등의⁶⁾ “柴胡抑肝湯의 抗stress效能에 대한 研究”, 서 등의⁷⁾ “柴胡桂枝湯加味方 투여로 호전된 아토피 피부염 환자 증례”가 있고柴胡單味에 관한 연구로는 이 등의⁸⁾ “柴胡추출물이 고지방식이를 급여한 흰쥐의 혈청 지질 및 항산화계에 미치는 影響”, 홍 등의⁹⁾ “시호가 우울증 모델 白鼠의 catecholamine에 미치는 영향” 등이 있으며柴胡약침에 대한 연구는 구 등의¹⁰⁾ “柴胡藥鍼이 생쥐의 Adjuvant 誘發 關節炎에 미치는 영향”, 문 등의¹¹⁾ “시호 약침의 부종 억제능 및 항알레르기 활성 검토” 등 활발한 연구가 진행되고 있고,柴胡의 文獻研究는 정 등의¹²⁾ 『東醫寶鑑』을 위주로 정리한 “柴胡가 君藥으로 配伍된 處方의 時代別 病證 및 主治에 관한 考察”이 있다.

『方藥合編』은 黃度淵의 『醫方活套』을 모태로 그의 아들인 黃泌秀가 『損益本草』를 合編하여 1885년에 간행하였다¹³⁾. 이 책은 기존 韓醫學 서적과

는 달리 處方을 上中下 三統으로 分類하여 기재하였고 『重訂方藥合編』, 『證脈方藥合編』 등의 增補를 거쳐 지금까지 널리 이용되고 있다¹⁴⁾. 『方藥合編』 중柴胡가 配合된 方劑는 醫方活套 上中下統에 모두 52方이 수록되어 있지만 이에 대한 研究는 아직까지 보고된 바 없다. 또한 『方藥合編』에 수록된 方劑에 관한 수많은 研究 가운데 本書의 독창적인 構成을 토대로 작성된 자료는 드물다. 이에 筆者는 『方藥合編』 醫方活套 中柴胡가 配合된 方劑를 調査하여 方劑의 出處, 構成, 注治 및柴胡의 使用量, 效能 등을 分析하고 『方藥合編』의 構成을 참고하여 整理하고자 한다.

II. 本 論

연구방법은 『方藥合編』 醫方活套 中柴胡가 配合되어 사용된 52方을 調査한 후¹³⁻¹⁸⁾ 그 중 加減으로 配合된 10方⁽¹⁾을 제외하고 原方 中 사용된 42方을 調査하고 정리하였다. 醫方活套에 수록된 方劑를 上中下統으로 分類한 후 研究를 진행하였고 각 處方名 뒤에 번호를 기입하여 『方藥合編』 本然의 특징을 살리고 處方의 出處를 정확히 하였다.

1. 柴胡가 配合된 方劑에 대한 調査

『方藥合編』 醫方活套 中柴胡가 配合된 方劑를 調査하여 上中下統으로 分類하여 정리하였다 (Table 1). 醫方活套에 수록된 總 42方은 上統에 4方, 中統에 30方, 下統에 8方으로 나누어져 기재되었다.

(1) 上統-理陰煎(11), 八物湯(32), 金水六君煎(51), 補虛湯(116) 中統-人蔘養胃湯(16), 升麻葛根湯(22), 六和湯(36), 平陳湯(71) 下統-丹粉丸(147), 七製香附丸(153)

Table 1. 醫方活套 中 柴胡가 配合된 方劑에 대한 調査

段	處方	處方數
上統	補陰益氣煎(10), 補中益氣湯(22), 益胃升陽湯(23), 加味歸脾湯(98)	4
中統	羌活愈風湯(3), 牛黃清心元(7), 葛根解肌湯(12), 人蔘敗毒散(19), 正柴胡飲(24), 小柴胡湯(25), 陶氏升陽散火湯(28), 人蔘逍遙散(30), 人蔘清肌散(41), 中滿分消湯(62), 木香順氣湯(63), 柴陳湯(69), 清脾飲(72), 加減清脾飲(76), 柴平湯(77), 追瘧飲(79), 加味溫膽湯(91), 順氣和中湯(117), 當歸補血湯(118), 清上瀉火湯(120), 升麻胃風湯(123), 荊芥連翹湯(126), 柴梗半夏湯(135), 清肝解鬱湯(141), 當歸四逆湯(152), 全生活血湯(156), 柴胡四物湯(163), 逍遙散(166), 小兒清心元(168), 柴歸飲(172),	30
下統	大柴胡湯(9), 柴苓湯(14), 蔘胡芍藥湯(15), 爭功散(50), 加味二陳湯(53), 升陽除濕湯(88), 龍膽瀉肝湯(137), 梔子清肝湯(148)	8
合計		42

2. 柴胡가 配合된 方劑의 病症, 注治 및 方中 柴胡의 效能에 대한 調査

柴胡가 配合된 方劑의 病症 및 注治를 調査한 후 活套鍼線을 참고하여 病門을 分類하였다. 分類

한 方劑 42方を 다시 上中下統으로 整理하여 기재하였다. 또한 方中 柴胡의 效能을 調査하여 整理하였다(Table 2).

Table 2. 醫方活套 中 柴胡가 配合된 方劑의 病症, 注治 및 效能에 대한 調査

病門	病症	段	處方	效能	主治
風	中腑中臟	中統	羌活愈風湯	疏泄	筋骨弱 言語難 精神昏憤 半身不遂 恐而健忘 喜以多思 中風前兆症 豫防
	救急		牛黃清心元	清熱	不省人事 痰涎壅塞 精神昏憤 語言蹇澁 口眼喎斜 手足不遂 等症, 脊心熱 夢遊
寒	內傷外感	上統	補陰益氣煎	升陽	陰虛外感寒熱 痲瘧 秘結陰不足 邪外侵 神效
	傷寒陽明	中統	葛根解肌湯	清熱	目疼 鼻乾 不得臥 宜解肌
	傷寒陰症		人蔘養胃湯	清熱	外感風寒內生冷 憎寒壯熱 頭疼身痛
	傷寒表症		人蔘敗毒散	解表	傷寒 時氣發熱 頭痛 肢體痛 及傷風 咳嗽 鼻塞 聲重
	感冒		升麻葛根湯	清熱	溫病及時令感冒
			正柴胡飲	清熱	風寒發熱 惡寒 頭痛 痲瘧
			小柴胡湯	和解	少陽半表裏 往來寒熱
	傷寒少陽		陶氏升陽散火湯	清熱	撮空 肝熱乘肺 元氣虛弱 譫語 神昏
	傷寒動悸	人蔘逍遙散	清熱	女勞復虛弱者	
	傷寒女勞復	下統	大柴胡湯	和解	少陽轉屬陽明 身熱 便堅 尿赤 譫潮
傷寒陽極似陰	柴苓湯		和解	身熱 脈數 煩渴 自利	
傷寒自利	蔘胡芍藥湯		治瘧熱	傷寒十四日外 餘熱未除 或渴煩 大便不快 小便黃	
傷寒壞症					
火	潮熱	中統	人蔘清肌散	清熱	虛勞 骨蒸潮熱 無汗
內傷	勞傷	上統	補中益氣湯	升陽	勞役太甚 或飲食失節 身熱自汗
			益胃升陽湯	升陽	內傷諸症 血脫 益氣

(2) 方藥合編¹³⁾에 氣血痛으로 기재되어 있으나 내용을 살펴보면 氣虛痛으로 보여진다.

脹滿	寒脹	中統	中滿分消湯	升陽	中滿 大小便不通
	濁氣		木香順氣湯	升陽	濁氣在上 生臌脹
瘧疾	痰瘧	中統	柴陳湯	治瘧熱	痰瘧 痰熱 胸痞
	食瘧		清脾飲	治瘧熱	食瘧妊娠時瘧疾寒少熱多, 有熱無寒, 口苦舌乾, 大便秘結, 食慾不振, 脈弦數
	通治		加減清脾飲	治瘧熱	諸瘧
	通治		柴平湯	治瘧熱	諸瘧寒多熱少, 汗出, 四肢沈重, 嘔逆脘悶, 脈濡緩
	截瘧甚效		追瘧飲	治瘧熱	氣血未衰屢散之後而不止
	熱瘧	下統	爭功散	治瘧熱	熱瘧多效
婦人	血閉	上統	加味歸脾湯	疏泄	肝脾怒鬱 月經不通
	崩漏	中統	全生活血湯	疏泄	崩漏過多 昏冒不省 手足厥冷
	發熱		柴胡四物湯	疏泄	產後發熱, 熱入血室
	血虛發熱		逍遙散	疏泄	月經不調 及血虛 五心煩熱 寒熱如瘧
小兒	諸熱	中統	小兒清心元	清熱	諸熱 及驚熱, 煩燥
	初熱		柴歸飲	清熱	痘初起
精	濕痰	下統	加味二陳湯	升陽	濕痰滲爲遺精
神	驚悸	中統	加味溫膽湯	疏泄	心膽虛怯 觸事易驚
大便	虛泄	下統	升陽除濕湯	升陽	氣虛泄瀉 不思飲食 困倦無力
頭	氣血痛 ⁽²⁾	中統	順氣和中湯	升陽	氣虛頭痛
	血虛痛		當歸補血湯	疏泄	血虛頭痛
	熱厥痛		清上瀉火湯	清熱	熱厥頭痛
面	胃風	中統	升麻胃風湯	升陽	胃風面腫
耳	聾膿	中統	荊芥連翹湯	清熱	兩耳腫痛 有腎經風熱
胸	痰結痞	中統	柴梗半夏湯	清熱	痰熱盛 胸痞 脇痛
乳	乳核	中統	清肝解鬱湯	疏泄	肝經鬱火 傷血 乳房結核
前陰	寒疝	中統	當歸四逆湯	疏泄	臍下冷痛
	筋疝	下統	龍膽瀉肝湯	清熱	肝臟濕氣 男子陰挺 女人陰痒瘡,
諸瘡	癰癤	下統	梔子清肝湯	疏泄	肝膽火盛 耳後, 頸項, 胸乳等處 結核

3. 柴胡가 配合된 方劑의 使用量에 대한 調査

柴胡가 配合된 方劑를 煎湯劑(湯, 散, 飲等)와 其他劑(丸, 散, 丹等)로 分類하였다. 用量은 사용된 三分~四錢의 범위를 14개 구역으로 나누어 정리하였고 元方에 기록된 使用量을 기준으로 하였

다(Table 3). 단 人蔘清氣散, 逍遙散, 人蔘逍遙散 등 處方들은 인용된 東醫寶鑑에서 복용법이 水煎服 또는 煎服으로 기재되어 있어 煎湯劑로 分類하였다.

Table 3. 醫方活套 中 柴胡가 配合된 方劑의 使用量에 대한 調査

用 量	煎湯劑(湯, 散, 飲等)	個 數	其他劑(丸, 散, 丹等)	個 數	合 計	百分率
三分	補中益氣湯, 益胃升陽湯, 順氣和中湯, 升麻胃風湯	4		0	4	9.5
四分	羌活愈風湯, 木香順氣湯	2		0	2	4.7
五分	中滿分消湯, 當歸補血湯, 清肝解鬱湯	3		0	3	7.1
六分	加味溫膽湯	1		0	1	2.4
七分	荊芥連翹湯, 全生活血湯, 升陽除濕湯	3		0	3	7.1
九分	當歸四逆湯	1		0	1	2.4
一錢	加味歸脾湯, 葛根解肌湯, 人蔘敗毒散, 陶氏升陽散火湯中, 清脾飲, 清上瀉火湯, 柴梗半夏湯, 柴歸飲, 麥胡芍藥湯, 加味二陳湯, 龍膽瀉肝湯, 人蔘清肌散, 逍遙散	13	爭功散	1	14	33.3
一錢二分半		0	牛黃清心元	1	1	2.4
一錢五分	人蔘逍遙散	1		0	1	2.4
一錢六分	柴苓湯	1		0	1	2.4
二錢	梔子清肝湯, 柴陳湯, 柴平湯, 柴胡四物湯	4	小兒清心元	1	5	12
三錢	正柴胡飲, 小柴胡湯, 加減清脾飲, 追瘡飲	4		0	4	9.5
四錢	大柴胡湯	1		0	1	2.4
一~二錢	補陰益氣煎	1				2.4
合計		39		3	42	
百分率		92.9		7.1		100

4. 柴胡가 配合된 方劑의 構成內容에 대한 調査

Table 2의 결과를 바탕으로 柴胡가 配合된 方劑를 病症으로 分類한 후 處方構成을 調査하고 構成基本處方を 整理하였다. 단 處方の 構成이 모두 갖추어지지 않았어도 柴胡와 配合으로 處方の 效能이 발휘되는 藥對를 고려하여 調査하였고⁽³⁾, 基

本處方調査는 너무 작은 단위로 분석하지 않았으며⁽⁴⁾, 處方を 구성하는 基本方에 柴胡 또는 柴胡와 藥對를 이루는 기타 藥이 중복 配伍되는 경우 藥對의 형성을 고려하여 모든 處方を 기재하였다⁽⁵⁾(Table 4).

(3) 方中 柴胡, 黃芩의 配伍는 小柴胡湯, . 柴胡, 白芍藥의 配伍는 逍遙散, 柴胡, 升麻의 藥對는 補中益氣湯으로 整理하였다.

(4) 예를 들어 補益脾胃 하는 補中益氣湯은 四君子湯類에 속하고 補氣養血 하는 八物湯은 四君子湯, 四物湯 合方이지만 따로 區分하지 않고 分類하였다.

(5) 牛黃清心元, 陶氏升陽散火湯 中 柴胡는 逍遙散, 小柴胡湯 두 方에 藥對를 형성하는 것으로 보았고 全生活血湯, 當歸補血湯, 清肝解鬱湯 中 芍藥은 柴胡와 配伍하여 小柴胡湯의 藥對를 이루고 熟地黃, 川芎, 當歸 等과 配伍하여 四物湯의 藥大를 構成하는 것으로 기재하였다.

(6) 方藥合編¹³⁾에 氣血痛으로 기재되어 있으나 正황상 氣虛痛으로 보여진다.

Table 4. 醫方活套 中 柴胡가 配合된 方劑의 構成內容

病 症	段	處 方	處方構成, 製法 및 用法	構成基本處方
中腑中臟		羌活愈風湯	蒼朮 石膏 生地黃 各六分 羌活 防風 當歸 蔓荊子 川芎 細辛 黃芪 枳殼 人參 麻黃 白芷 甘菊 薄荷 枸杞子 柴胡 知母 地骨皮 獨活 杜沖 秦艽 黃芩 白芍藥 甘草 各四分 肉桂 二分 姜三片 水煎朝夕服.	逍遙散
救急	中統	牛黃清心元	山藥 七錢 甘草(炒) 五錢 人參 蒲黃(炒) 神麩(炒) 各二錢半 犀角 二錢 大豆黃卷(炒) 官桂 阿膠(炒) 各一錢七分半 白芍藥 麥門冬 黃芩 當歸 防風 朱砂(水飛) 白朮 各一錢半 柴胡 桔梗 杏仁 白茯苓 川芎 各一錢二分半 牛黃 一錢二分 羚羊角 麝香 龍腦 各一錢 石雄黃 八分 白蘞 乾薑(炮) 各七分半 金箔(一百二十片內四十片爲衣) 大棗 二十枚 蒸取肉研膏. 上藥材末棗膏入煉蜜和勻每兩作十丸 金箔爲衣 每一丸 溫水和下	逍遙散 小柴胡湯
內傷外感	上統	補陰益氣煎	熟地黃 三五錢至一二兩 人參 山藥(酒洗) 各二錢 當歸 陳皮 甘草 各一錢 升麻 三五分 柴胡 一二錢 生姜五片 水煎溫服	補中益氣湯
傷寒陽明		葛根解肌湯	葛根 柴胡 黃芩 赤芍藥 羌活 石膏 升麻 白芷 桔梗 各一錢 甘草 五分 生姜三片 大棗二枚 水煎服	升麻葛根湯 小柴胡湯
傷寒表症		人參敗毒散	人參 柴胡 前胡 羌活 獨活 枳殼 桔梗 川芎 赤茯苓 甘草 各一錢 生姜三片 薄荷少許 水煎服	敗毒散
感冒		正柴胡飲	柴胡 三錢 白芍藥 二錢 陳皮 一錢半 防風 甘草 各一錢 生姜三片 水煎溫服	逍遙散
傷寒少陽	中統	小柴胡湯	柴胡 三錢 黃芩 二錢 人參 半夏 各一錢 甘草 五分 生姜三片 大棗二枚 水煎溫服	小柴胡湯
傷寒動悸		陶氏升陽散火湯	人參 當歸 白芍藥 柴胡 黃芩 白朮 麥門冬 陳皮 白茯苓 甘草 各一錢 生姜三片 大棗二枚 熟金同煎	小柴胡湯 逍遙散 四君子
傷寒女勞復		人參逍遙散	人參 當歸 各二錢 柴胡 一錢五分 白朮 白茯苓 白芍藥 各一錢 水煎溫服	逍遙散
傷寒陽極似陰		大柴胡湯	柴胡 四錢 黃芩 白芍藥 各二錢半 大黃 二錢 枳實 一錢半 半夏 一錢 水煎溫服	小柴胡湯
傷寒自利	下統	柴苓湯	柴胡 一錢六分 澤瀉 一錢三分 白朮 猪苓 赤茯苓 各七分半 半夏 七分 黃芩 人參 甘草 各六分 桂心 三分 生姜三片 水煎溫服	小柴胡湯 五苓散
傷寒壞症		參胡芍藥湯	生地黃 一錢半 人參 柴胡 白芍藥 黃芩 知母 麥門冬 各一錢 枳殼 八分 甘草 三分 生姜 三片 水煎溫服	小柴胡湯
潮熱	中統	人參清肌散	人參 白朮 白茯苓 赤芍藥 當歸 柴胡 乾葛 半夏麩 各一錢 甘草 五分 生姜三片 大棗二枚 水煎溫服	四君子湯 逍遙散
勞傷	上統	補中益氣湯	黃芪 一錢半 人參 白朮 甘草 各一錢 當歸身 陳皮(酒洗) 各五分 升麻(酒洗) 柴胡(酒洗) 各三分 水煎, 食間微熱服	補中益氣湯
		益胃升陽湯	白朮 一錢半 黃芪 一錢 人參 神麩(炒) 各七分半 陳皮 甘草(炙) 各五分 升麻 柴胡 各三分 生黃芩 二分 水煎溫服	補中益氣湯

寒脹		中滿分消湯	益智仁 半夏 木香 赤茯苓 升麻 各七分半 川芎 人參 青皮 當歸 柴胡 生薑 乾薑 畢澄茄 黃連 黃芪 吳茱萸 草豆蔻 厚朴 各五分 水煎,食前熱服	補中益氣湯
濁氣		木香順氣湯	厚朴 白茯苓 澤瀉 半夏 各一錢 蒼朮 八分 青皮 陳皮 各六分 草豆蔻 人參 當歸 各五分 木香 乾薑 升麻 柴胡 甘草 各四分 益智仁 吳茱萸 各三分 生姜三片 水煎,食前服	二陳湯 平胃散 補中益氣湯
痰瘧		柴陳湯	柴胡 半夏 各二錢 人參 黃芩 陳皮 赤茯苓 各一錢 甘草五分 生姜三片 大棗二枚 水煎溫服	小柴胡湯 二陳湯
食瘧	中統	清脾飲	柴胡 半夏 黃芩 白朮 草果 赤茯苓 厚朴 青皮 各一錢 甘草五分 生姜三片 大棗二枚 水煎服	小柴胡湯 平胃散 二陳湯
通治		加減清脾飲	柴胡 三錢 黃芩 二錢 人參 半夏 各一錢 五分 蒼朮 一錢半 陳皮 厚朴 半夏(製) 各一錢二分半 赤茯苓 藿香 各一錢 草果 甘草(炙) 各五分 桃枝 柳枝 各三寸 生姜五片 大棗二枚 水煎溫服	清脾飲
通治		柴平湯	柴胡 蒼朮 各二錢 厚朴 陳皮 半夏 黃芩 各一錢 人參 甘草 各五分 生姜三片 大棗二枚 烏梅一枚 水煎服	小柴胡湯 平胃散
截瘧甚效		追瘧飲	何首烏 一兩 青皮 陳皮 當歸 柴胡 半夏 甘草 各三錢 井水河水各一鍾煎半露一宿次早溫服食遠再服	二陳湯
熱瘧	下統	爭功散	知母 貝母 柴胡 常山 梔子 檳榔 地骨皮 甘草 各一錢 蟬退 二十七枚 桃枝 柳枝 各五寸 水煎服	爭功散
血閉	上統	加味歸脾湯	當歸 龍眼肉 酸棗仁(炒) 人參 黃芪 白朮 白茯苓 遠志 各一錢 木香 五分 甘草 三分 山梔 柴胡 各一錢 生薑 五片 大棗 二枚 水煎溫服	歸脾湯
崩漏		全生活血湯	白芍藥 升麻 各一錢 防風 羌活 獨活 柴胡 當歸身 乾葛 甘草 各七分 藁本 川芎 各五分 生地黃 熟地黃 各四分 蔓荊子 細辛 各三分紅花 一分 水煎服	升麻葛根湯 四物湯 逍遙散
發熱	中統	柴胡四物湯	柴胡 生地黃 各二錢 川芎 赤芍藥 當歸 黃芩 各一錢 人參 半夏 甘草 各五分 生姜三片 水煎溫服	三元湯 小柴胡湯 四物湯
血虛發熱		逍遙散	白朮 白芍藥 白茯苓 柴胡 當歸 麥門冬 各一錢 甘草 薄荷 各五分 生姜三片 水煎,隨時服	逍遙散
諸熱		小兒清心元	人參 白茯苓 防風 朱砂 柴胡 各二錢 金箔 三十片上藥材末蜜丸梧子大每一丸竹瀝調下	
初熱		柴歸飲	當歸 二錢 白芍藥 一錢半 柴胡 荊芥 各一錢 甘草 七分 生姜三片	逍遙散
濕痰	下統	加味二陳湯	半夏(薑製) 赤茯苓(鹽水炒) 梔子(炒黑) 各一錢半 陳皮 白朮 桔梗 升麻(酒炒) 柴胡(酒炒) 甘草 各一錢 石菖蒲 七分 知母 黃柏 各三分 生姜三片 水煎,空心服用	二陳湯
驚悸	中統	加味溫膽湯	香附子 二錢四分 橘紅 一錢二分 半夏 枳實 竹茹 各八分 人參 白茯苓 柴胡 麥門冬 桔梗 各六分 甘草 四分 生姜三片 大棗二枚 水煎服	溫膽湯 柴胡疏肝散
虛泄	下統	升陽除濕湯	蒼朮 一錢半 升麻 柴胡 羌活 防風 神麴 澤瀉 豬苓 各七分 陳皮 麥芽 甘草(炙) 各五分 水煎,食前空心服	平胃散

氣血痛 ⁽⁶⁾	中統	順氣和中湯	黃芪(蜜炒) 一錢半 人參 一錢 白朮 當歸 白芍藥 陳皮 各五分 升麻 柴胡 各三分 蔓荊子 細辛 川芎 各二分 水煎, 食後服	補中益氣湯	
血虛痛		當歸補血湯	生乾地黃(酒炒) 白芍藥 川芎 當歸 片苓(酒洗) 各一錢 防風 柴胡 蔓荊子 各五分 荊芥 藁本 各四分 水煎溫服	四物湯 逍遙散	
熱厥痛		清上瀉火湯	柴胡 一錢 羌活 八分 酒黃芩 酒知母 各七分 酒黃柏 炙甘草 黃芪 各五分 生地黃 酒黃連 藁本 各四分 升麻 防風 各三分半 蔓荊子 當歸身 蒼朮 細辛 各三分 荊芥穗 川芎 生甘草 各二分 紅花 一分 水煎, 食後服	川芎茶調散 黃連解毒湯 二妙散 小柴胡湯	
胃風		升麻胃風湯	升麻 二錢 甘草 一錢半 白芷 一錢二分 當歸 乾葛 蒼朮 各一錢 麻黃(不去節) 五分 柴胡 藁本 羌活 黃柏 草豆蔻 各三分 蔓荊子 二分 生三片 大棗二枚 水煎, 食後服	升麻葛根湯 二妙散	
疔膿		荊芥連翹湯	荊芥 連翹 防風 當歸 川芎 白芍藥 柴胡 枳殼 黃芩 梔子 白芷 桔梗 各七分 甘草 五分 水煎, 食後服	川芎茶調散 四物湯 小柴胡湯	
痰結痞		柴梗半夏湯	柴胡 二錢 瓜蒌仁 半夏 黃芩 枳殼 桔梗 各一錢 青皮 杏仁 各八分 甘草 四分 生姜三片 水煎溫服	小柴胡湯 桔梗枳殼湯	
乳核		清肝解鬱湯	當歸 白朮 各一錢 貝母 赤茯苓 白芍藥 熟地黃 山梔 各七分 人參 柴胡 牡丹皮 陳皮 川芎 甘草 各五分 水煎服	八物湯 逍遙散	
寒疝		當歸四逆湯	當歸 一錢二分 附子(炮) 官桂 茴香 各一錢 白芍藥 柴胡 各九分 川楝子 玄胡索 白茯苓 各七分 澤瀉 五分 水煎微溫空心服	逍遙散	
筋疝		下統	龍膽瀉肝湯	草龍膽 柴胡 澤瀉 各一錢 木通 車前子 赤茯苓 生地黃 當歸 山梔 黃芩 甘草 各五分 水煎後空心服	八正散 清腸湯 小柴胡湯
瘰癧		下統	梔子清肝湯	柴胡 二錢 梔子(酒炒) 牡丹皮 各一錢三分 赤茯苓 川芎 赤芍藥 當歸 牛蒡子 各一錢 青皮 甘草(炙) 各五分	逍遙散

III. 考 察

『方藥合編』은 기타 한의학 서적들과 다른 독특한 구성을 가진 서적으로 그 특징을 다음과 같이 두 가지로 볼 수 있다.

첫째, 方劑를 중심으로 하는 기재 방법을 사용하였다. 朝鮮時代의 대표적인 韓醫學 서적인 『東醫寶鑑』¹⁵⁾, 『鄉藥集成方』¹⁹⁾, 『濟衆新編』²⁰⁾의 方劑 기재는 病門을 중심으로 整理하는 방법을 사용하였다. 즉 病門을 分類한 후 각 病症으로 整理하고 적합한 方劑를 기재 하였다. 반면 『方藥合編』은 方劑를 기재한 후 病症, 兼症, 藥劑의 加減, 構成 藥劑의 순서로 나열하였는데 이러한 구성은 다른 서적들에 비해 쉽게 검색하고 이해할 수 있다.

둘째, 方劑를 性向別로 分類하였다. 方劑를 補益劑, 和解劑, 攻邪劑로 정리한 후 이를 각각 上中下 三統으로 分類하여 方劑가 기재된 위치만으로도 그 특징을 알 수 있게 했고 비슷한 類型의 方劑를 容易하게 검색할 수 있다.

위의 내용으로 볼 때 『方藥合編』의 가장 큰 특징은 方劑의 分類와 기재 방법이라는 것을 알 수 있다. 筆者는 이러한 『方藥合編』의 독창적인 구성을 기본으로 하여 柴胡가 配合된 處方을 調査하였고 그것을 바탕으로 다음과 같이 分析해 보고자 한다.

1. 柴胡가 配合된 方劑에 대한 分析

醫方活套 中 柴胡가 配合된 方劑는 총 42方으로

上統에 4方, 中統에 30方, 下統에 8方이 수록되어 있다. 이것으로 柴胡가 配合된 方劑는 和解劑가 가장 많았고 攻邪劑, 補益劑의 順임을 알 수 있다 (Table 1).

2. 柴胡가 配合된 方劑의 病症 및 注治에 대한 分析

柴胡가 配合된 方劑는 매우 광범위한 病症 및 注治에 使用되었다(Table 2). 風門의 中膈中臟, 救急에 使用되었고, 寒門의 內傷外感, 傷寒陽明, 傷寒陰症, 傷寒表症, 感冒, 傷寒少陽, 傷寒動季, 傷寒女勞復, 傷寒陽極似陰, 傷寒自利, 傷寒壞症 등 11개 病症에 活用되었다. 또한 火門의 潮熱, 內傷門의 勞傷, 脹滿門의 寒脹, 濁氣, 瘧疾門의 痰·食·諸·熱瘧, 熱瘧甚效 등 病症에서 使用되었고, 婦人門에서는 血閉, 崩漏, 發熱, 血虛發熱, 月經不調 등 5개 病症의 치료에 活用된 것을 알 수 있었다. 이 밖에 柴胡가 配合된 方劑는 小兒門의 諸熱, 通治, 精門의 濕痰, 神門의 驚悸, 大便門의 泄瀉, 頭門의 氣血·血虛·熱厥痛 등 病症部分에 각각 기재되었고 面門의 胃風, 耳門의 聾膿, 胸門의 痰結痞, 乳門의 乳核, 前陰門의 寒疝·筋疝, 諸瘡門의 癰癤 등에 대한 治療에도 使用되었다.

柴胡가 配合된 方劑의 病症과 主治를 分析하면 寒門에서 가장 많은 病症에 사용되었다. 이 中 中統에 기재된 方劑는 8方이고 下統은 3方, 上統은 1方으로 調査되었다. 婦人門과 瘧疾門에서 각 5개 病門에 活用되었는데 婦人門의 方은 中統 3方, 上·下統 1方씩, 瘧疾의 方은 모두 中統의 6方으로 分析되었다.

3. 調査方 中 柴胡의 效能에 대한 分析

柴胡가 配合된 方劑의 注治를 참고 하여 方中 柴胡의 效能을 調査하였고 그 결과를 上中下 統으로 分類하여 정리하였다(Table 2). 柴胡가 配伍된 方劑 中 柴胡의 效能은 解表, 升陽, 疏泄, 治瘧熱,

和解, 清熱 등 여섯 가지로 볼 수 있다. 첫째, 柴胡의 解表는 1方으로 中統의 人蔘敗毒散 中 使用되었다. 둘째, 柴胡의 升陽은 모두 9方으로 上統의 補陰益氣煎, 補中益氣湯, 益胃升陽湯, 中統의 中滿分消湯, 木香順氣湯, 順氣和中湯, 升麻胃風湯, 下統의 加味二陳湯, 升陽除濕湯에서 活用되었다. 셋째, 疏泄의 方劑는 모두 10方으로 上統方은 加味歸脾湯, 中統方은 羌活愈風湯, 全生活血湯, 柴胡四物湯, 逍遙散, 加味溫膽湯, 當歸補血湯, 清肝解鬱湯, 當歸四逆湯, 下統方은 梔子清肝湯 등으로 調査되었다. 넷째, 治瘧熱의 方劑는 中統方의 柴陳湯, 清脾飲, 加減清脾飲, 柴平湯, 追瘧飲, 下統方의 柴胡芍藥湯, 爭功散 등 모두 7方이었다. 다섯째, 和解는 中統의 小柴胡湯, 下統의 大柴胡湯, 柴苓湯 등 3方에서 발휘되었다. 마지막으로 清熱은 모두 12方에서 나타났으며 中統方은 牛黃清心元, 葛根解肌湯, 人蔘養胃湯, 升麻葛根湯, 正柴胡飲, 陶氏升陽散火湯, 人蔘逍遙散, 人蔘清肌散, 小兒清心元, 柴歸飲, 清上瀉火湯, 荊芥連翹湯, 柴梗半夏湯, 下統方은 龍膽瀉肝湯 등으로 調査되었다.

4. 柴胡가 配合된 方劑의 使用量에 대한 分析

醫方活套에 기록된 柴胡가 配合된 方劑 42方的 使用量에 대한 調査 결과 三分~四錢까지 다양한 使用量을 使用하고 있음을 알 수 있다. 이 가운데 柴胡가 一錢 使用된 處方이 14方으로 가장 많아 33.3%를 차지했다. 14方을 分析해 보면 中統方이 9方으로 葛根解肌湯, 人蔘敗毒散, 陶氏升陽散火湯 中, 清脾飲, 清上瀉火湯, 柴梗半夏湯, 柴歸飲, 人蔘清肌散, 逍遙散 등이 調査되었고 下統方은 麥胡芍藥湯, 加味二陳湯, 龍膽瀉肝湯, 爭功散 등 4方이 기재되었으며 上統方은 加味歸脾湯 1方이 수록되었다. 使用量이 二錢인 處方은 5方이고 12%에 달하는데 中統方이 가장 많아 柴陳湯, 柴平湯, 柴胡四物湯, 小兒清心元 등 4方이었고, 1方的 下統方은 梔子清肝湯이었다. 使用量이 三分인 方劑는 上統의 補中益氣湯, 益胃升陽湯, 中統의 順氣和中湯,

升麻胃風湯, 三錢의 使用方劑는 모두 中統의 方劑로 正柴胡飲, 小柴胡湯, 加減清脾飲, 追瘡飲 등으로 각각 4方으로 9.5%를 차지했다. 使用량이 五分과 七分인 處方은 각3方으로 7.1%를 나타냈는데 五分이 使用된 方劑는 中滿分消湯, 當歸補血湯, 清肝解鬱湯 등으로 모두 中統方이고 七分이 使用된 方劑는 中統方으로 荊芥連翹湯, 全生活血湯이 下統方으로 升陽除濕湯 등이 調査되었다. 이밖에 柴胡를 四分 使用한 方劑는 中統에 기재된 羌活愈風湯, 木香順氣湯 등 2方으로 4.7%로 나타났고 六分, 九分, 一錢二分半, 一錢五分, 一錢六分, 四錢, 一~二錢은 각각 1方으로 2.4%씩을 차지했다(Table 3).

調査한 42方的 劑型을 分析하면 煎湯劑가 39方으로 92.9%를, 其他劑는 3方으로 7.1%를 차지하였다(Table 3). 일반적으로 其他劑는 오랜 治療가 필요한 虛症에 사용되지만 柴胡의 其他劑 3方이 使用되는 病症은 實證인 것으로 調査되었다. 이밖에 方中 柴胡의 使用量은 柴胡의 效能에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 解表작용은 一錢이 使用된 人蔘敗毒散에서 調査되었고, 升陽작용은 使用량이 三分~二錢인 方劑에서 볼 수 있는데 用량이 三分인 補中益氣湯, 益胃升陽湯, 順氣和中湯, 升麻胃風湯, 四分, 五分인 木香順氣湯, 中滿分消湯, 및 七分인 升陽除濕湯, 一錢과 一~二錢이 配合된 加味二陳湯, 補陰益氣煎 등 9方的 使用량과 관계가 있다. 疏泄작용은 四分~二錢 사이의 用량을 使用한 方劑에서 調査되었는데 使用된 用량이 四分인 羌活愈風湯, 五分인 當歸補血湯, 清肝解鬱湯, 六分, 七分인 加味溫膽湯, 全生活血湯에서 볼 수 있고 九분이 使用된 當歸四逆湯, 一錢의 加味歸脾湯과 逍遙散, 二錢이 活用된 梔子清肝湯, 柴胡四物湯 등 10方에서 使用되었다. 治瘧熱작용은 柴胡의 使用량이 一錢~三錢의 方劑에서 효능이 발휘되었다. 清脾飲, 蔘胡芍藥湯, 爭功散에서 一錢이 使用되었고 使用량이 二錢인 柴陳湯, 柴平湯, 三錢인 加減清脾飲, 追瘡飲 등 7方に 配合되었다. 和解작용은 柴胡를 一錢六分~四錢을 配合한 方劑에서 活用되

었는데 使用량이 一錢六分인 柴芥湯, 三錢인 小柴胡湯, 四錢인 大柴胡湯 등 3方에서 使用되었다. 清熱작용은 使用량이 七分~三錢까지인 方劑에서 볼 수 있다. 七分이 使用된 荊芥連翹湯, 一錢이 活用된 葛根解肌湯, 陶氏升陽散火湯中, 清上瀉火湯, 柴梗半夏湯, 柴歸飲, 龍膽瀉肝湯, 人蔘清肌散, 一錢二分半과 一錢五분이 使用된 牛黃清心元, 人蔘逍遙散, 및 二錢과 三錢이 配合된 小兒清心元, 正柴胡飲 등의 12方에서 파악되었다.

5. 柴胡가 配合된 方劑의 構成內容에 대한 分析

柴胡가 配伍된 方劑의 處方構成을 病症으로 分類한 후 上中下統으로 整理하고 構成 및 構成基本方을 調査하였다(Table 4). 나아가 基本方을 중심으로 三統의 處方을 分類하고 基本方을 포함하지 않는 方劑는 方中 柴胡가 발휘하는 功效로 정리하였다. 醫方活套 三統 중 柴胡가 使用된 方劑는 대부분 小柴胡湯, 逍遙散, 補中益氣湯 등의 基本方으로 이루어져 있음을 알 수 있다(Table 4).

總 42方 中 小柴胡湯⁸⁾이 基本方으로 使用된 方劑는 모두 15方으로 中統과 下統에 기재 되었다. 牛黃清心元, 葛根解肌湯, 陶氏升陽散火湯, 小柴胡湯, 柴陳湯, 清脾飲, 柴平湯, 柴梗半夏湯, 柴胡四物湯, 清上瀉火湯, 荊芥連翹湯 등 11方은 中統에, 大柴胡湯, 柴苓湯, 蔘胡芍藥湯, 龍膽瀉肝湯, 등 4方은 下統에서 볼 수 있다. 小柴胡湯은 其他處方, 藥物들과 配伍되어 다양한 病症에 사용되었다. 大柴胡湯, 柴苓湯, 蔘胡芍藥湯, 小柴胡湯에서 和解少陽의 功效로 寒症과 熱症이 공존하는 病症을 治療하였고 柴陳湯, 清脾飲, 柴平湯, 柴胡四物湯에서 退熱截瘧로 각종 瘧疾에 사용되었으며 牛黃清心元, 葛根解肌湯, 陶氏升陽散火湯, 清上瀉火湯, 荊芥連翹湯, 龍膽瀉肝湯, 柴梗半夏湯의 處方에선 清熱 작용으로 여러 가지 원인으로 발생하는 熱症을 治療하였다. 小柴胡湯과 合方된 處方을 살펴보면 平胃散, 二陳湯이 3회로⁷⁾ 가장 많았는데 瘧疾을 治療할 때 活用되었고 다음은 四物湯, 逍遙散⁸⁾ 등이

2회의 順이었다(Table 4).

逍遙散¹⁸⁾이 基本方으로 使用된 醫方活套의 方劑는 逍遙散, 羌活愈風湯, 牛黃清心元, 正柴胡飲, 陶氏升陽散火湯, 人蔘逍遙散, 人蔘清肌散, 當歸補血湯, 清肝解鬱湯, 全生活血湯, 當歸四逆湯, 柴歸飲, 梔子清肝湯等 13方으로 모두 中統에 기재 되었다. 逍遙散도 其他處方, 藥物과 함께 活用되어 각종 病症을 치료하였다. 疏肝泄氣의 效能으로 肝鬱 및 기타 원인으로 인한 病症을 治療하는 處方은 逍遙散, 羌活愈風湯, 牛黃清心元, 陶氏升陽散火湯, 人蔘逍遙散, 當歸補血湯, 清肝解鬱湯, 全生活血湯, 當歸四逆湯, 梔子清肝湯 등 10方이고 退瘧熱의 작용으로 瘧疾을 治療하는 處方은 正柴胡飲 1方이었다. 養血清熱은 柴歸飲, 人蔘清肌散 2方에서 발휘되는 데 血虛로 인한 虛熱症을 治療하는 것으로 調査되었다. 逍遙散과 合方된 方劑는 四物湯이 3회로⁽⁹⁾ 가장 많아 血虛鬱滯로 인한 病症을 治療하였고 다음은 小柴胡湯, 四君子湯⁽¹⁰⁾이 2회씩으로 나타났다(Table 4).

補中益氣湯¹⁸⁾이 基本方으로 使用된 處方은 6方으로 上統과 中統에 기재되어 있다. 上統에 기재된 方劑는 補中益氣煎, 補中益氣湯, 益胃升陽湯 3方이고 中統에 기재된 方劑는 中滿分消湯, 木香順氣湯, 順氣和中湯 3方이었다. 정리한 6方を 分析하면 上統의 3方은 虛勞로 인한 發熱, 自汗, 血脫 등을 治療하고 中統의 3方은 扶正祛邪法을 活用하여 脾胃氣虛로 인한 脹滿, 頭痛 등을 治療한다(Table 4). 補中益氣湯과 함께 合方된 處方은 二陳湯, 平胃散으로 木香順氣湯을 構成하여 病症을 治療하였다.

이 밖에 Table 4에 整理한 내용을 보면 柴胡가 使用된 基本構成方과 配合하지는 않지만 柴胡와

配合하여 使用하는 方劑들도 있는 것을 알 수 있다. 追瘧飲, 爭功散에서 柴胡는 退瘧熱 功效로 使用되고 加味歸脾湯, 加味溫膽湯 중 柴胡는 疏肝泄氣 作用으로 活用되었다. 加味二陳湯, 升陽除濕湯, 升麻胃風湯에서 柴胡는 升麻와 配合하여 升陽의 功效를 발휘하고 人蔘敗毒散에선 解表清熱의 效能으로 使用되었다.

이상과 같이 진행한 연구를 통해 『方藥合編』~醫方活套 중 柴胡가 配合된 方劑들을 체계적으로 整理하고 이해할 수 있었고 『方藥合編』의 獨創의 構成에 대해 깊이 생각해 보는 기회를 마련한 것으로 생각되며 『方藥合編』~醫方活套의 方劑 研究에 대한 새로운 方向을 提示할 수 있을 것이라 생각한다.

IV. 總括 및 要約

『方藥合編』~醫方活套 중 柴胡가 配合된 42개 方劑에 대해 上中下三統 分類를 시작으로 病症 및 主治, 原方に 기재된 使用量, 方劑構成과 構成基本方 等の 調査를 통해 다음과 같이 요약할 수 있다.

1. 『方藥合編』~醫方活套 중 柴胡가 配合된 方劑는 모두 52方으로 加減에 活用된 10方を 제 외한 方劑를 分析하면 上統에 4方, 中統에 30方, 下統에 8方이 기재되어 中統에 가장 많은 方劑가 수록되어 있다. 이를 통해 『方藥合編』~醫方活套 中 柴胡는 和解劑로 빈번하게 使用되었음을 알 수 있다.
2. 『方藥合編』~醫方活套 중 柴胡가 配合된 方劑는 18개 病門, 44개 病症에서 광범위하게 使用되었다. 그 中 寒門에서 가장 많은 11개 病症에 活

(7) 小柴胡湯, 平胃散, 二陳湯은 清脾飲, 加減清脾飲에서 함께 使用되었고, 柴平湯(小柴胡湯, 平胃散), 柴陳湯(小柴胡湯, 二陳湯)에서 각각 合方되었다.

(8) 小柴胡湯은 四物湯과 柴胡四物湯, 荊芥連翹湯에서 合方되었고 逍遙散과 牛黃清心元, 陶氏升陽散火湯에서 使用되었다.

(9) 逍遙散은 四物湯과 全生活血湯, 當歸補血湯, 清肝解鬱湯에서 合方하였다.

(10) 逍遙散은 人蔘清肌散, 清肝解鬱湯, 陶氏升陽散火湯에서 四君子湯과 함께 使用했다.

用되었고 瘧疾門, 婦人門은 5개 病症의 治療에 使用되었다. 寒門, 瘧疾門, 婦人門의 病症에 使用된 23方을 分析하면 中統의 方劑가 17方으로 가장 많았고 下統의 方劑는 4方, 上統의 方劑는 2方으로 調查되었다.

3. 調査方 中 柴胡의 效能은 解表, 升陽, 疏泄, 治瘧熱, 和解, 清熱 등 여섯 가지로 나눌 수 있고 清熱작용으로 活用된 方劑가 가장 많은 12方이었다.
4. 柴胡가 配合된 方劑의 使用量은 三分~四錢까지 14개 區域에서 使用되었다. 가장 많은 使用量은 一錢으로 14方(33.3%)이 기재되었고, 9개의 中統方, 4개의 下統方, 1개의 上統方으로 構成되었다. 二錢이 사용된 處方은 中統方이 4方, 下統方이 1方 등 모두 5方으로 12%를 차지했고 五分과 七分이 配伍된 方劑는 각 3方(7.1%)으로 5方은 中統方, 1方은 下統方이었다. 이밖에 四分의 柴胡를 活用한 方劑는 中統에 기재된 2方이었고 使用量이 六分, 九分, 一錢二分半, 一錢五分, 一錢六分, 四錢, 一~二錢은 각각 1方이었다.
5. 柴胡가 配合된 42方의 劑型은 全湯劑가 39方으로 92.9%를, 其他劑가 3方으로 7.1%를 차지하는 것으로 나타났다.
6. 柴胡의 使用量은 效能과 일정한 관계가 있는 것으로 調査되었다. 解表작용은 一錢이 사용된 一方에서 調査되었고, 升陽작용은 柴胡의 使用量이 三分~二錢까지인 9方에서 使用되었고, 疏泄작용은 四分~二錢 사이의 用量을 活用한 10方에서 調査 되었으며, 治瘧熱작용은 柴胡의 使用量이 一錢~三錢의 7方에서 볼 수 있었다. 和解작용은 柴胡를 一錢六分~四錢 配伍한 3方에서, 清熱작용은 七分~三錢 使用한 12方에서 活用되고 있는 것을 알 수 있다.
7. 柴胡가 配合된 方劑의 構成內容을 調査 대부분 小柴胡湯, 逍遙散, 補中益氣湯을 基本方으로 使用하였다. 小柴胡湯을 基本方으로 使用하는 方

劑가 16方으로 가장 많았고 이 中 中統方은 12方, 下統은 4方이었다. 逍遙散을 基本方으로 活用하는 方劑는 모두 中統方으로 12方이었고 補中益氣湯을 基本方으로 하는 方劑는 6方으로 上統과 中統에 3方씩 기재되었다. 위의 基本方들은 病症, 主治에 따라 小柴胡湯은 二陳湯, 平胃散, 四物湯, 逍遙散과 逍遙散은 四物湯, 四君子湯, 小柴胡湯과 合方하여 活用되었다.

參考文獻

1. 전국한의과대학 본초학교수 공편저. 본초학. 서울:영림사. 1999:149-50.
2. 高學敏. 中藥學. 北京:中國中醫藥出版社. 2002:82-4.
3. 김호철. 한약약리학. 경기도:집문당. 2008:94-5.
4. 길기정. 한약독성학. 서울:도서출판 태성. 2003:38-40.
5. 한방약리학 교재편찬위원회 저. 한방약리학. 서울:신일북스. 2010:191.
6. 朴美淳 外. 柴胡抑肝湯의 抗stress效能에 대한 研究. 대한한방부인과학회지. 2000;13(1):220-62.
7. 서민수, 허인희, 심성용, 김경준. 柴胡桂枝湯加味方 투여로 호진된 아토피 피부염 환자 증례. 韓方眼耳鼻咽喉皮膚科學會誌. 2008;21(3):215-25.
8. 이 은, 이장천. 柴胡(Bupleuri Radix)추출물이 고지방식이를 급여한 흰쥐의 혈청지질 및 항산화계에 미치는 影響. 大韓韓醫學方劑學會誌. 2003;11(1):151-9.
9. 홍성유, 박선동. 시호가 우울증 모델 白鼠의 catecholamine에 미치는 영향. 大韓本草學會誌. 2003;18(4):245-53.
10. 구민숙 外著. 柴胡藥鍼이 생쥐의 Adjuvant 誘發關節炎에 미치는 영향. 大韓鍼灸學會誌. 2002;19(3):51-63.
11. 文振榮, 林鍾國. 시호 약침의 부종 억제능 및

- 항알레르기 활성 검토. 大韓鍼灸學會誌. 1999: 16(3):245-53.
12. 鄭宗佶. 柴胡가 君藥으로 配伍된 處方의 時代別 病證 및 主治에 관한 考察 : 東醫寶鑑을 中心으로. 方劑學會誌. 2001:9(1):207-14.
13. 黃度淵原著. 對譯證脈方藥合編·辨證增補版. 서울:南山堂. 1991:3, 94, 122-3, 127-31, 134-6, 142-6, 150-2, 154-6, 166-9, 171-2, 183-5, 189-92, 194-6, 204-6, 227, 230-1, 232-3, 235-6, 238-9, 245-6, 248, 250-1, 258-60, 262-3, 267-70, 271-4.
14. 辛載鏞 編著. 方藥合編解說. 서울:成輔社. 1989:5, 82, 113, 165-7, 168, 169, 177, 179, 193-5, 232, 247-8.
15. 許浚 原著. 原本東醫寶鑑. 서울:南山堂. 2007: 96, 157, 158, 160, 183, 205, 206, 210, 236, 267, 273, 313, 361, 362, 381, 382, 385, 386, 387, 392, 397, 398, 400, 422, 434, 460, 464, 503, 504, 519, 520, 523, 527, 625, 626, 649.
16. 張景岳. 景岳全書 新方八陣. 北京:科學出版社. 1998:484, 505.
17. 李挺 編著. 醫學入門. 서울:大成文化社. 1989: 543.
18. 尹用甲著. 東醫方劑와處方解說. 서울:醫聖堂. 2004 :83, 93, 241, 242, 330, 332, 350, 381, 456, 485-7, 621-4, 631, 639-45, 703, 704, 813, 827, 861.
19. 兪孝通, 盧重禮, 朴充德. 鄉藥集成方. 서울:永林社. 1989:10-20.
20. 康命吉著. 濟衆新編. 서울:驢江出版社. 1994:6-35.