

닭콜레라 원인은?

1. 닭콜레라

① 원인

출혈성파혈증균(Pasteurella multocida)의 A형이 병원체. 형태 · 배양성 · 저항성에 관해서는 “파스튜렐라균증(Pasteurellosis)”을 참조. 급성 닭콜레라에서 분리한 균을 형광성집락(螢光性集落 Fluorescent colony)을 형성한다. 균은 병계의 분비물 · 배설물에 들어 있으며 자연 감염은 주로 호흡기감염에 의해 생긴다. 오염된 사료 · 물 등에 의하여 경구 감염된다.



② 증상

임상증상이 거의 없이 갑자기 폐사하는 경우가 있다. 식욕부진 또는 폐질과 아울러 침울 호흡곤란이 있으며 가래 끓는 소리를 내며 콧구멍 · 주둥이로부터 거품 섞인 점액이 나온다. 설사를 하며 처음에는 백황색이나 후에는 녹색으로 변하며 악취가 난다. 양계

자료제공 : 축산물품질평가원 “재미있는 축산물 이야기”

* 본란은 독자분들께 사양, 유통, 질병, 시설 등 전반적인 양계에 관한 질문을 받아 전문가들의 자문을 거쳐 답변해 드리는 코너입니다.

궁금한 사항이 있으신 분들은 메일을 보내주세요.

ch-spirow@hanmail.net(장성영 기자), enani85@naver.com(최인환 기자)