

대칭 램지 수의 실험적 증명

이 상운*

Experimental Proof for Symmetric Ramsey Numbers

Sang-Un Lee *

요 약

본 논문은 램지 수에 대해 해결하지 못한 $43 \leq R(5,5) \leq 49$ 와 $102 \leq R(6,6) \leq 165$ 의 문제를 해결하였다. K_n 완전 그래프의 램지 수 $R(s,t)$ 는 임의의 정점 v 의 $n-1$ 개 부속 간선수가 $(n-1)/2 = R$ 과 $(n-1)/2 = B$ 의 2가지 색으로 정확히 양분된다. 따라서 임의의 정점 v 로부터 거리 개념을 적용하여 $\{K_L, v\}$ 의 $(n-1)/2 = R$, $\{v, K_R\}$ 의 $(n-1)/2 = B$ 색이 되도록 $K_n = K_L + v + K_R$ 분할 그래프를 형성하였다. 이로부터 K_L 이 K_{s-1} 의 R 색을 형성하면 K_s 를 얻을 수 있다. K_R 이 K_{t-1} 의 B 색을 형성하면 K_t 를 얻는다. K_L 과 K_R 의 최대 거리는 짝수와 모든 정점의 부속 간선 수는 동일하다는 필요충분조건을 만족시키는 $R(s,t) = K_n$ 을 구하였다. 결국, $R(5,5) = 43$ 과 $R(6,6) = 91$ 을 증명하였다.

▶ Keywords : 램지 수, 분할 그래프, 거리, 차수

Abstract

This paper offers solutions to unresolved $43 \leq R(5,5) \leq 49$ and $102 \leq R(6,6) \leq 165$ problems of Ramsey's number. The Ramsey's number $R(s,t)$ of a complete graph K_n dictates that $n-1$ number of incidental edges of a arbitrary vertex v is dichotomized into two colors: $(n-1)/2 = R$ and $(n-1)/2 = B$. Therefore, if one introduces the concept of distance to the vertex v , one may construct a partite graph $K_n = K_L + v + K_R$, to satisfy $(n-1)/2 = R$ of $\{K_L, v\}$ and $(n-1)/2 = B$ of $\{v, K_R\}$. Subsequently, given that K_L forms the color R of K_{s-1} , K_s is attainable. Likewise, given that K_R forms the color B of K_{t-1} , K_t is obtained. By following the above-mentioned steps, $R(s,t) = K_n$ was obtained, satisfying necessary and sufficient conditions where, for K_L and K_R , the maximum distance should be even and incidental edges of all vertices should be equal are satisfied. This paper accordingly proves $R(5,5) = 43$ and $R(6,6) = 91$.

▶ Keywords : Ramsey number, Partite graph, Distance, Degree

•제1저자 : 이상운

•투고일 : 2014. 12. 01. 심사일 : 2014. 12. 31. 게재확정일 : 2015. 01. 12.

* 강릉원주대학교 멀티미디어공학과 (Dept. of Multimedia Eng., Gangneung-Wonju National University)

I. 서론

램지 수 (Ramsey number) $R(s,t)$ 는 K_n -완전 그래프 (complete graph)의 간선 수 $e(K_n) = n(n-1)/2$ 개를 대상으로 s 와 t 두 명이 번갈아가면서 자신의 색 (Red와 Blue)을 칠할 경우 K_s 또는 K_t 중 어느 하나가 나오는 사람이 게임을 승리하는 경우이다. 따라서 램지 수 $R(s,t)$ 는 K_s 또는 K_t 중 어느 하나가 반드시 나올 수 있는 최소한의 K_n 을 찾는 문제이다[1-12].

$R(3,3) = 6, R(3,4) = 9, R(4,4) = 18$ 로 증명되었으며, $43 \leq R(5,5) \leq 49, 102 \leq R(6,6) \leq 165$ 는 정확한 값을 얻지 못하고 있다[3,5]. McKay와 Radziszowski[11]는 컴퓨터 프로그램을 적용한 그래프 생성 방법을 적용하여 $R(5,5) = 43$ 을, Kunkel과 Ng[12]는 Tabu 탐색 방법을 적용하여 $R(5,5) = 44$ 를 제시하였다. Bian et al.[13]은 $R(3,3)$ 과 $R(m,2), 4 \leq m \leq 8$ 을 얻는 알고리즘을 제안하였으며, Xiaodong et al.[14]는 램지 수의 하한값에 대한 연구를 수행하였다.

$R(5,5) = 43$ 을 정확히 찾기 위해서는 $e(K_{43}) = 903$ 개 간선들의 절반인 452개 또는 453개를 동일한 색으로 칠하는 경우로, 모든 가능한 경우의 수는 식 (1)과 같다.

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \tag{1}$$



식 (1)을 적용하여 $\binom{903}{452}$ 을 계산하고 모든 경우 수에 대해 R 색의 K_s 또는 B 색의 K_t 중 어느 하나가 반드시 존재함을 보여야 한다. 따라서 현실적으로 증명이 불가능함을 알 수 있다.

본 논문은 $41 < R(5,5) \leq 43$ 과 $89 < R(6,6) \leq 91$ 을 제안한다. 2장에서는 $R(3,3) = 6, R(3,4) = 9, R(4,4) = 18$ 의 램지 수를 고찰해 본다. 3장에서는 $R(5,5)$ 와 $R(6,6)$ 을 증명하는 방법을 제안한다. 4장에서는 제안된 방법을 적용하여 $R(5,5) = 43$ 과 $R(6,6) = 91$ 을 증명한다.

II. 관련 연구와 연구 배경

그림 1과 같이 $19 \times 19 = 361$ 바둑판에서 오목을 두는 경우와 램지수 게임을 비교하여 보자. 오목은 (a)와 같이 가로, 세로 또는 대각선의 간선이 교차하는 316개 정점들에 대해

백색 또는 흑색의 연속적인 5개 바둑알을 먼저 두는 사람이 승리한다. 이 경우 한 쪽이 막힌 4개와 막히지 않은 3개의 교차점 또는 양쪽이 모두 막히지 않은 3개와 3개의 교차점에 바둑알을 두면 승리한다. 여기서는 흑이 승리한 경우이다. 반면에, 대칭 램지수 $R(s,t), s=t$ 는 (b)와 같이 두 명이 번갈아가면서 간선에 색을 칠하는 게임으로는 s 는 적색 (R)을, t 는 청색 (B)을 색칠할 경우 K_s 또는 K_t 중 하나는 반드시 발생하여 게임을 승리할 수 있는 최소한의 K_n -완전 그래프를 찾는 문제이다. 즉, 오목의 바둑판 크기에 해당하는 K_n 을 결정하는 문제이다. 여기서는 $R(3,3) = 6$ 으로 s 는 직선, t 는 점선으로 색을 칠한 순서를 결정한 결과 s 가 5회에서 K_3 을 얻어 승리한 경우로 이는 K_6 -완전 그래프 게임판으로 게임을 할 수 있음을 의미한다.



(b) $R(3,3) = 6$ Ramsey game

그림 1. 오목과 램지수 게임

Fig. 1. Omok and Ramsey number game

그림 2는 Bondy와 Murty[15]가 $R(3,3) = 6, R(3,4) = 9, R(4,4) = 18$ 이 됨을 설명한 그래프이다.

(a)는 K_5 그래프로 간선 수 $e(K_5) = 10$ 개 중에서 2명이 각각 5개씩 선택할 경우, $K_s, (s=3)$ 과 $K_t, (t=3)$ 의 어느 하나도 존재하지 않는 경우이다. 따라서 $R(3,3) = 6$ 으로 K_5 에는 존재하지 않고, 최소한 K_6 에는 존재함을 의미한다.

(b)는 $R(3,4) = 9$ 에 대한 사례로, $e(K_8) = 28$ 개 간선 중에서 $s = 12$ 개, $t = 16$ 개의 간선을 선택할 수 있다. 이를 바꾸어 말하면 28개 간선 중에서 $s = 12$ 개의 간선을 선택하여 나머지 16개 간선들이 $K_t, (t=4)$ 가 되지 못하는 경우를 찾은

것이다. $R(3,4) = 8$ 로는 $K_s, (s=3)$ 과 $K_t, (t=4)$ 모두를 얻지 못함을 알 수 있다.




그림 2. 램지 수 증명 사례

Fig. 2. Proofing examples of Ramsey Number

(c)는 $R(4,4) = 18$ 에 대한 예로, $e(K_{17}) = 136$ 개 간선 중 $s = 68$ 개, $t = 68$ 개의 간선을 색칠할 경우, $K_s, (s=4)$ 와 $K_t, (t=4)$ 모두 얻지 못하는 경우이다.

지금까지 알려진 램지 수는 표 1에 제시되어 있다. $43 \leq R(5,5) \leq 49$ 이며, $102 \leq R(6,6) \leq 165$ 는 아직까지 미해결 문제로 남아 있다. 따라서 3장에서는 $R(s,t)$ 를 증명하는 방법을 제안하며, 이 증명 방법에 기반하여 4장에서는 $R(5,5) = 43$ 과 $R(6,6) = 91$ 을 제시한다.

표 1. 램지 수
Table 1. Ramsey number

s, t	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3			6	9	14	18	23	28	36	(40,43)
4				18	25	(35,41)	(49,61)	(56,84)	(73,115)	(92,149)
5					(43,49)	(58,87)	(80,143)	(101,216)	(125,316)	(143,442)
6						(102,165)	(113,298)	(127,495)	(169,780)	(179,1171)
7							(205,540)	(216,1031)	(233,1713)	(289,2826)
8								(282,1870)	(317,3583)	≤ 6090
9									(565,6588)	(580,12677)
10										(798,23556)

III. 대칭 램지 수 $R(s,t)$ 증명 방법

본 장에서는 K_n -완전 그래프를 식 (2)와 식 (3)의 분할

방법을 적용하여 $R(s,t)$ 를 증명한다.

$$K_{(n-1)/2} : 1 : K_{(n-1)/2} \text{ 분할, } s=t \text{ 대칭 램지수} \quad (2)$$

$$s : 1 : t \text{ 분할, } s \neq t \text{ 비대칭 램지수} \quad (3)$$

K_n 완전 그래프에서 C_n 사이클 그래프 (cycle graph)만을 고려하여 임의의 정점 v 에서 $n-1$ 개의 각 정점까지의 경로길이를 거리로 치환하면 그림 3과 같이 거리 그래프 (distance graph)로 표현할 수 있다. 그림 3은 K_8 에 대한 예로 v 정점에서 다른 모든 정점까지의 거리 d_i 는 $1 \leq d_i \leq 4$ 가 존재한다.







그림 3. K_8 거리 그래프

Fig. 3. K_8 distance graph

거리 그래프 개념을 적용하여 그림 2의 3개 그래프를 임의의 정점 v 를 중심으로 좌측과 우측으로 분할하여 표현하면 그림 4와 같다.





(c) K_{17} 의 8:1:8 분할
 그림 4. 그래프 분할 방법
 Fig. 4. Graph partition method

K_5 완전 그래프는 $1 \leq d_i \leq 2$ 가 존재하며, d_1 의 간선 수 $e(d_1)$ 은 5개, d_2 의 간선 수 $e(d_2)$ 는 5개이다. 10개 간선 중에서 $e(d_1)$ 을 s 가, $e(d_2)$ 를 t 가 선택한 경우이다. 이를 $s = \{d_1\}$, $t = \{d_2\}$ 로 표기하자. K_8 완전 그래프는 $e(d_1) = 8, e(d_2) = 8, e(d_3) = 8, e(d_4) = 4$ 이다. 여기서 $s = \{d_1, d_4\}, t = \{d_2, d_3\}$ 를 선택하여 간선수를 3:4로 분할한 경우이다. K_{17} 완전 그래프는 $s = \{d_1, d_2, d_4, d_8\}$ 을, $t = \{d_3, d_5, d_6, d_7\}$ 을 선택한 경우이다.

좌측 부분 그래프를 K_L , 우측 부분 그래프를 K_R 이라 하자. $K_5 = K_2 + v + K_3$ 로, $K_8 = K_4 + v + K_3$ 으로, $K_{17} = K_8 + v + K_8$ 로 분할된다.

그림 1의 3개 그래프 모두 임의의 정점 v 의 간선 수 $n-1$ 개는 정확히 $R = (n-1)/2$ 와 $B = (n-1)/2$ 개로 양분된다. 이 방법으로 분할하면 $\{K_L, v\}$ 의 모든 간선들은 R 색이 되며, $\{v, K_R\}$ 의 모든 간선들은 B 색이 된다. 여기서 $\{K_L, K_R\}$ 간선들은 제외시켰다.

분할 그래프 방법은 K_{s-1} 과 $\{K_{s-1}, v\}$ 의 $s-1$ 개 간선이 동일한 색이면 K_s 색을 얻을 수 있다는 개념에 기반한다.


$5 < R(3,3) \leq 6$ 을 증명하여 보자. $K_5 = K_2 + v + K_3$ 로 K_L 2개 정점의 $\{1a, v\}, \{1b, v\}$ 간선은 R 과 B 중 R 색이, K_R 2개 정점의 $\{v, 2a\}, \{v, 2b\}$ 간선은 B 색이 배정된 상태이다. 따라서 남은 간선은 K_L 의 $\{1a, 1b\}$ 와 K_R 의 $\{2a, 2b\}$ 로 2개이다. 2개 간선 중 선택할 수 있는 경우 수 $(R,R), (R,B), (B,R), (B,B)$ 4가지 중 $(R,B), (B,R)$ 만이 가능하다. 만약, $\{1a, 1b\} = R, \{2a, 2b\} = B$ 이면 $(v, 1a, 1b)$ 는 R 의 K_3 이, $(v, 2a, 2b)$ 는 B 의 K_3 이 형성되어 2가지 경우가 모두 나와 먼저 게임을 시작한 사람이 승리한다. 그러나 $\{1a, 1b\} = B, \{2a, 2b\} = R$ 이면 $(v, 1a, 1b)$ 는 R 의 K_3 가 형성되지 못하며, $(v, 2a, 2b)$ 는 B 의 K_3 가 형성되지 못하여 어느 누구도 게임을 이길 수 없다. 따라서 $5 < R(3,3) \leq 6$ 이 된다.


$K_7 = K_3 + 1 + K_3$ 으로는 항상 $R(3,3)$ 을 얻을 수 있다. 결

국, $5 < R(3,3) \leq 7$ 이다. $R(s-1, t) + R(s, t-1) = R(s, t)$ 법칙을 적용하면 $R(2,3) + R(3,2) = R(3,3), R(2,3) = R(3,2) = 3$ 으로 $R(3,3) = 6$ 이 $5 < R(3,3) \leq 7$ 에 포함되어 $R(3,3) = 6$ 을 얻는다.

$R(4,4)$ 를 증명하여 보자. 먼저, $R(3,3) + 1 + R(3,3) = K_6 + v + K_6 = K_{13}$ 으로 $R(4,4)$ 가 되지 않는 경우를 고찰해 보자. 얼핏 보면, $K_6 + v + K_6$ 은 $R(4,4)$ 가 될 수 있을 것 같아 보인다. 왜냐하면 $\{K_L, v\}$ 의 6개 간선이 R 색을, $\{v, K_R\}$ 의 6개 간선이 B 색을 양분하여 배정되었고, K_L 의 K_6 로는 항상 $R(3,3)$ 으로 동일한 R 색을 얻을 수 있으며, K_R 의 K_6 로 B 색을 얻을 수 있다. 결국, 동일한 색의 K_3 과 $\{K_3, v\}$ 의 3개 간선으로 K_4 가 될 수 있기 때문이다. 그러나 이 경우는 K_L 또는 K_R 의 어느 한 쪽만을 고려한 경우이다. 한쪽의 $e(K_6) = 15$ 은 $e(d_1) = 6, e(d_2) = 6, e(d_3) = 3$ 개가 존재하며, 양쪽을 고려하면 전체 간선 수는 30개이다. $\{K_L, v\} = R$ 과 $\{v, K_R\} = B$ 인 상태에서 동일한 색의 K_4 가 되지 못하도록 K_L 에서 $R = \{d_2\}, B = \{d_1, d_3\}$ 을, K_R 에서 $B = \{d_2\}, R = \{d_1, d_3\}$ 을 선택하면 R 은 K_L 에서 6개, K_R 에서 9개로 총 15개를, B 는 K_L 에서 9개, K_R 에서 6개로 총 15개를 선택하여 30개 간선을 정확히 양분하였다. 이 경우, K_L 과 K_R 어느 하나도 R 과 B 의 K_4 를 얻지 못한다. 따라서 K_{13} 은 $R(4,4)$ 가 되지 못한다.

K_{13}, K_{15}, K_{17} 이 $R(4,4)$ 가 되지 못하는 증명 결과는 그림 5에 제시되어 있다.





(c) $R(4,4) > 17$

그림 5. $R(4,4) = 18$ 증명

Fig. 5. Proof of $R(4,4) = 18$

$K_{15} = K_7 + K_1 + K_7, K_{17} = K_8 + K_1 + K_8$ 로 분할된다. 동일한 방법을 적용하면 K_{15} 와 K_{17} 도 $R(4,4)$ 를 얻지 못한다. 참고로, $K_n, (6 \leq n \leq 9)$ 의 거리별 간선은 표 2에 제시되어 있다.

표 2. $K_n, (6 \leq n \leq 9)$ 의 거리별 간선 수

Table 2. Edges per each distance for $K_n, (6 \leq n \leq 9)$

K_n	간선 수				
	$e(K_n)$	$e(d_1)$	$e(d_2)$	$e(d_3)$	$e(d_4)$
K_6	15	6	6	3	
K_7	21	7	7	7	
K_8	28	8	8	8	4
K_9	36	9	9	9	9

분할 그래프에서 다음 2가지 조건을 만족하면 대칭 램지 수 $R(s,t), (s=t)$ 를 얻을 수 있다.

- (1) K_L 과 K_R 의 최대 거리 d_i 는 짝수가 되어야 한다.
- (2) 최대거리 d_i 정점의 부속 간선 수 (차수) $e(d_i)$ 는 d_{i-1} 거리의 정점 차수 $e(d_{i-1})$ 과 동일해야 한다. 즉, 모든 거리의 정점 부속 간선 수는 동일해야 한다.

결국, 분할 그래프로 $R(4,4)$ 를 얻기 위한 필요충분조건은 $K_9 + K_1 + K_9$ 로 $17 < R(4,4) \leq 19$ 이다. 또한 $R(3,4) + R(4,3) = 18$ 이 $17 < R(4,4) \leq 19$ 에 포함되어 $R(4,4) = 18$ 이다.

IV. 실험 및 결과 분석

먼저, $R(5,5)$ 를 구하여 보자. $R(4,4) + R(4,4) < R(5,5), R(4,5) + R(5,4) < R(5,5), R(4,5) = 25$ 이며, $43 \leq R(5,5) \leq 49$ 로 알려져 있다. 따라서 $36 < R(5,5) \leq [43, 49]$ 범위에서 구할 수 있다.

$K_{37} = K_{18} + K_1 + K_{18}, K_{39} = K_{19} + K_1 + K_{19}, K_{41} = K_{20} + K_1 + K_{20}, K_{43} = K_{21} + K_1 + K_{21}$ 이 된다. 표 3의 각 거

리별 간선 수 법칙에 따르면 $K_{39} = K_{19} + K_1 + K_{19}$ 의 각 거리별 간선 수는 모두 동일하지만 최대 거리가 9인 홀수로 조건을 만족시키지 못한다.

표 3. $K_n, (18 \leq n \leq 21)$ 의 거리별 간선 수

Table 3. Edges per each distance for $K_n, (18 \leq n \leq 21)$

K_n	간선 수										
	$e(K_n)$	$e(d_1)$	$e(d_2)$	$e(d_3)$	$e(d_4)$	$e(d_5)$	$e(d_6)$	$e(d_7)$	$e(d_8)$	$e(d_9)$	$e(d_{10})$
K_{18}	153	18	18	18	18	18	18	18	18	9	0
K_{19}	171	19	19	19	19	19	19	19	19	19	0
K_{20}	190	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10
K_{21}	210	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21

다음으로 최대거리는 짝수와 모든 거리의 정점 차수는 동일 조건을 만족하는 경우는 $K_{43} = K_{21} + K_1 + K_{21}$ 이다. 결국, $41 < R(5,5) \leq 43$ 을 얻는다. $R(4,5) + R(5,4) = 50$ 이 $41 < R(5,5) \leq 43$ 범위에 존재하지 않으므로 $R(5,5) = 43$ 이 된다.

$R(5,5) = 43$ 에 기반하여 $R(6,6)$ 을 구하여 보자. $R(5,5) + R(5,5) < R(6,6)$ 이며, $R(6,6) = [102, 165]$ 로 알려져 있다. 따라서 $86 < R(6,6) \leq [102, 165]$ 범위에서 구할 수 있다. 표 4에 따르면 $K_L + v + K_R$ 에서 K_L 과 K_R 은 최대 거리는 짝수와 모든 거리 별 차수는 동일 조건을 만족하는 완전 그래프는 K_{45} 이다. 따라서 $86 < R(6,6) \leq 91$ 이다. $R(5,6) + R(5,6) = R(6,6), R(5,6) = [58, 87]$ 로 $86 < R(6,6) \leq 91$ 범위를 충족시키지 못하여 $R(6,6) = 91$ 이다.

표 4. $K_n, (43 \leq n \leq 45)$ 의 거리별 간선 수

Table 4. Edges per each distance for $K_n, (43 \leq n \leq 45)$

K_n	간선 수											
	$e(K_n)$	$e(d_1)$	$e(d_2)$	$e(d_3)$	$e(d_4)$	$e(d_5)$	$e(d_6)$	$e(d_7)$	$e(d_8)$	$e(d_9)$	$e(d_{10})$	$e(d_{11})$
K_{43}	903	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
K_{44}	946	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	22
K_{45}	990	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

V. 결론

본 논문은 1930년에 제시된 램지 수에 대해 아직까지 증명하지 못한 $43 \leq R(5,5) \leq 49$ 와 $102 \leq R(6,6) \leq 165$ 문제를 해결하였다.

증명방법은 K_n -완전 그래프의 램지 수 $R(s,t)$ 는 임의의 정점 v 의 $n-1$ 개 간선 수를 $(n-1)/2 = R$ 과 $(n-1)/2 = B$ 의 2가지 색으로 정확히 양분한다는 법칙을 적용하였다. 임의의 정점 v 로부터 거리 개념을 적용하여 $K_n = K_L + v + K_R$ 의

분할 그래프를 형성하고 $K_s = K_{s-1} + (n-1)/2$, $K_t = K_{t-1} + (n-1)/2$ 로 구하였다. $R(s,t) = K_n$ 이 되기 위한 K_L 과 K_R 의 최대 거리는 짝수와 모든 정점의 부속 간선 수는 동일 조건을 만족시켰다. 결국, $R(5,5) = 43$ 과 $R(6,6) = 91$ 을 증명하였다. 이는 K_5 -완전 그래프를 먼저 생성할 수 있는 램지 수 게임을 하기 위해서는 K_{43} -완전 그래프 게임 판을, K_6 -완전 그래프를 먼저 생성할 수 있는 램지 수 게임을 하기 위해서는 K_{91} -완전 그래프 게임 판을 준비해야 함을 증명하였다. 즉, $43 \leq R(5,5) \leq 49$ 을 $R(5,5) = 43$ 으로 확정시킬 수 있었으며, $102 \leq R(6,6) \leq 165$ 을 $R(6,6) = 91$ 로 감소시켰다.

REFERENCES

- [1] F. P. Ramsey, "On a Problem of Formal Logic," Proceedings of London Mathematics, Series 2, Vol. 30, pp. 264-286, 1930.
- [2] Wikipedia, "Ramsey Theory," http://en.wikipedia.org/wiki/Ramsey_theory, Wikimedia Foundation Inc., 2014.
- [3] Wikipedia, "Ramsey's Theorem," http://en.wikipedia.org/wiki/Ramsey's_theorem, Wikimedia Foundation Inc., 2014.
- [4] E. W. Weisstein, "Ramsey's Theorem" <http://mathworld.wolfram.com/RamseysTheorem.html>, MathWorld, Wolfram Research, Inc., 2014.
- [5] E. W. Weisstein, "Ramsey Number" <http://mathworld.wolfram.com/RamseyNumber.html>, MathWorld, Wolfram Research, Inc., 2014.
- [6] Wikipedia, "Theorem on Friends and Strangers," http://en.wikipedia.org/wiki/Theorem_on_friends_and_strangers, Wikimedia Foundation Inc., 2014.
- [7] Wikipedia, "Pigeonhole Principle," http://en.wikipedia.org/wiki/Pigeonhole_principle, Wikimedia Foundation Inc., 2014.
- [8] G. E. W. Taylor, "Ramsey Theory," School of Mathematics, The University of Birmingham, 2006.
- [9] Math Explorers' Club, "How to Play Ramsey Graph Games," Math Explorers' Club, Cornell Department of Mathematics, 2004.
- [10] I. Leader, "Friends and Strangers," Millenium Mathematics Project, University of Cambridge, 2001.
- [11] B. D. McKay and S. P. Radziszowski, "Subgraph Counting Identities and Ramsey Numbers," Journal of Combinatorial Theory, Series B, Vol. 69, No. 2, pp. 193-209, Mar. 1997.
- [12] C. J. Kunkel and P. Ng, "Ramsey Numbers: Improving the Bounds of $R(5,5)$," Midwest Instruction and Computing Symposium (MICS), 2003.
- [13] Z. Bian, F. Chudak, W. G. Macready, L. Clark, and F. Gaitan, "Experimental Determination of Ramsey Numbers," Physical Review Letters, Vol. 111, No. 13, pp. 1-6, Sep. 2013.
- [14] X. Xiaodong, X. Zheng, G. Exoo, and S. P. Radziszowski, "Constructive Lower Bounds on Classical Multicolor Ramsey Numbers," Electronic Journal of Combinatorics, Vol. 11, No. 1, pp. 1-24, Jan. 2004.
- [15] J. A. Bondy and U. S. R. Murty, "Graduate Texts in Mathematics: Graph Theory," Springer-Verlag, 2006.

저 자 소 개



이 상 운(Sang-Un, Lee)

1983년 ~ 1987년 :

한국항공대학교 항공전자공학과 (학사)

1995년 ~ 1997년 :

경상대학교 컴퓨터학과 (석사)

1998년 ~ 2001년 :

경상대학교 컴퓨터학과 (박사)

2003.3 ~ 현재 :

강릉원주대학교 멀티미디어공학과 부교수

관심분야 : 소프트웨어 프로젝트 관리,

소프트웨어 개발 방법론,

소프트웨어 신뢰성, 그래프

알고리즘

e-mail : sulee@gwnu.ac.kr