

Effect of sweeteners on the quality characteristics of ginger (*Zingiber officinale* Rosc) *Jungkwa*

Yeong-Min Lee¹, Hyeon-Jeong Lee¹, Jeong-Seok Cho^{1,2}, Ji-Young Choi¹,
Jin-Ho Woo¹, Kwang-Deog Moon^{1,2*}

¹School of Food Science and Biotechnology, Kyungpook National University Daegu 41566, Korea

²Food and Bio-Industry Research Institute, Kyungpook National University, Daegu 41566, Korea

감미료가 생강정과의 품질특성에 미치는 영향

이영민¹ · 이현정¹ · 조정석^{1,2} · 최지영¹ · 우진호¹ · 문광덕^{1,2*}

¹경북대학교 식품공학부 식품생물공학전공, ²식품생물산업연구소

Abstract

In this study the physicochemical properties and antioxidant capacities of ginger (*Zingiber officinale* Rosc) *Jungkwa* with different kinds of sweeteners were determined. *Jungkwa* made with different sugars (sugar, xylitol, honey or oligosaccharides) were compared in aspect of physicochemical properties, antioxidant activities, total phenolic contents and sensory evaluation. Moisture contents *Jungkwa* treated different kinds of oligosaccharides showed highest value, in the order of honey, xylitol and sugar. L* value of *Jungkwa* treated with xylitol was the highest, a* value of *Jungkwa* treated with honey, sugar *Jungkwa* were higher than others. Free sugar contents of *Jungkwa* treated with sugar showed the highest value in sucrose, glucose and galactose. *Jungkwa* with xylitol showed lowest value in all free sugar contents. Hardness and chewiness of *Jungkwa* treated with xylitol showed the highest value. The antioxidant activity measured by DPPH and ABTS radical scavenging activity and total phenolic content were the highest in *Jungkwa* treated with honey, followed by *Jungkwa* treated with xylitol, oligosaccharides and sugar. Appearance and color of oligosaccharides and honey treated *Jungkwa* were preferred. In ginger taste, sweetness, chewiness were highest in sugar treated *Jungkwa* (not significant difference in treatments). As a result, honey treated *Jungkwa* has higher antioxidant activity and quality than other sugar treatments.

Key words : ginger, *Jungkwa*, sweeteners, physicochemical properties, antioxidant capacities

서 론

생강(*Zingiber officinale* Rosc)은 생강과에 속하는 아열대, 또는 열대 원산의 다년생 초본 식물의 하나이다. 생생강 (fresh ginger), 건생강(dried ginger), 정유 등의 형태로 유통되며 식용, 약용 또는 화장품용으로 널리 사용되고 있다 (1,2). 생강에 관한 선행 연구로는 재배지에 따른 성분비교

(3) 및 아미노산조성(4) 등의 연구결과가 보고되어있으며 생강의 flavor와 밀접한 관계가 있는 매운맛 성분(5)과 방향 성분(6)에 관해서도 연구가 수행되어져 왔다. 생강은 주로 10-11월에 수확하여 저장 한 후 연중 유통되나 10℃ 이하에서는 저온장해가 발생하고 18℃ 이상에서는 발아(7) 및 곰팡이 번식과 표면건조 및 연화 등으로 인하여 저장성이 매우 낮은 편이다(8). 생강 저장의 어려움을 해결하고 소비 형태의 다양성을 증가시키기 위해 생강가루를 첨가한 찹쌀 머핀(9), 생강 가루를 이용한 생강잼(10) 등의 연구가 진행되었다.

정과는 식물의 뿌리나 줄기 등을 줄여서 달고 쫄깃한 형태가 되도록 하는 것으로 연근, 생강, 당근, 도라지 등을 이용한 정과가 있다(11). 최근 당뇨, 성인병 및 비만식품의

*Corresponding author. E-mail : kdmoon@knu.ac.kr

Phone : 82-53-950-5773, Fax : 82-53-950-6772

Received 6 December 2016; Revised 10 May 2017; Accepted 19 June 2017.

Copyright © The Korean Society of Food Preservation. All rights reserved.

증가로 자연식품에 대한 관심이 증가하고 있는데 이에 과일과 채소를 이용한 정과가 다시 선호되고 있다(12). 정과에 사용되는 감미료는 설탕, 포도당, 과당, 꿀, 올리고당과 같은 천연 감미료와 스테비오사이드, 사카린 등과 같은 인공 감미료가 있다. 이러한 대체 감미료는 설탕과 유사한 단맛을 지니면서 열량이 전혀 없거나, 설탕에 비해 현저하게 낮은 칼로리로 체중 감소에 도움이 되고 충치와 당뇨병을 예방하는데 도움이 된다(13). 정과와 관련된 연구로 감미료의 종류를 달리한 수삼정과의 품질특성(14), 당 종류를 달리하여 제조한 지황정과의 품질특성 및 항산화성(15) 등이 있다.

생강의 저장성 향상이나 생강을 첨가한 가공품에 대해서는 여러 연구가 진행되어 왔지만 생강의 가공과정에서 변화하는 이화학적 특성이나 기능성 성분, 생강 자체로 만든 가공품에 대한 연구는 부족한 실정이다. 따라서 본 연구에서는 다양한 생리활성 기능을 가진 생강으로 당 종류를 달리하여 정과를 제조하였을 때 품질 특성을 조사하여 기능성이 높은 생강 가공품을 제조하고자 한다.

재료 및 방법

실험 재료

본 실험에 사용한 원료 생강은 2015년 11월 충청남도 서산에서 생산된 생강 중 흠이 없고 크기나 색깔이 비슷한 품질이 좋은 상품을 선정하여 사용하였으며 정과 제조에는 백설탕(100% 원당, CJ, Incheon, Korea), 자일리톨(100% xylitol, Roquette, Lestrem, France), 꿀(사양벌꿀 90%, 잡화꿀 10%, 고려인삼주식회사, Gangwon, Korea), 건강한 올리고당(프락토 올리고당 50% 이상, CJ, Incheon, Korea)을 사용하였다.

정과의 제조

생강은 크기와 형태가 균일한 것을 선별하고 절단기(RG-100, Hallde, Sweden)를 이용하여 0.4 cm 두께로 일정하게 절단하였으며 예비 실험을 통해 기능성 성분의 유출이 가장 적은 80°C의 열수에서 한 시간 동안 증숙한 생강편을 사용하였다. 열수 처리된 생강은 물기를 제거하고 설탕, 자일리톨, 꿀, 올리고당을 생강과 2:1(w/w)의 비율로 섞어 예비실험을 거쳐 약 80°C에서 40분간 졸여 제조하였다.

수분함량 측정

정과의 수분함량은 각 시료 2 g을 취하여 적외선 수분 측정기(FD-720, Kett Electric Laboratory Co., Ltd., Tokyo, Japan)를 사용하여 측정하였으며 시료는 3회 반복 측정하여 그 평균값을 구하였다.

pH 및 가용성 고형분 함량 측정

생강편의 pH는 시료에 4배에 해당하는 증류수와 희석 및 마쇄 후, 서서히 교반하면서 pH meter(Orion 3 star, Thermo Electron Co., Waltham, MA, USA)를 사용하여 측정하였다. 증류수에 의한 희석배수는 측정된 pH 값에 별도로 반영하지 않았다.

가용성 고형분 함량은 시료 10 g에 증류수 40 mL를 첨가하고 homogenizer(AM-9, Nihonseiki Kashima Co., Ltd., Tokyo, Japan)를 이용하여 마쇄한 후 검액을 굴절당도계(Master- α , ATAGO Co., Tokyo, Japan)로 측정하여 °Brix로 나타내었으며, 희석배수는 측정된 값에 별도 반영하지 않았다.

색도 측정

색도는 표준 백색판($L^*=97.79$, $a^*=-0.38$, $b^*=2.05$)으로 보정된 colorimeter(CR-400, Minolta Co., Osaka, Japan)를 사용하였다. 처리구 당 시료 10개를 임의로 선택하여 표면의 색차를 각각 3회 반복 측정 후 평균값을 이용하였다. L^* 은 lightness, a^* 는 redness, b^* 는 yellowness를 나타낸 값이다.

물성 측정

생강 정과의 물성은 rheometer(Compac-100II, SunScientific Co., Tokyo, Japan)를 이용하여 측정하였다. 5 mm cylinder probe를 사용하여 견고성(hardness), 탄력성(springiness), 응집성(cohesiveness), 씹힘성(chewiness)을 시료별로 15회 측정 후 평균값을 이용하였다. 조건은 sample height 4 mm, sample width 40 mm, adaptor type cycle, table speed 60 mm/min로 설정하였으며 penetration distance는 sample height의 40%로 설정하여 1.6 mm 침투되도록 하였다.

유리당 함량 측정

열수처리된 생강의 유리당 함량을 분석하기 위해 정과 5 g에 증류수 45 mL를 가하여 3시간 동안 50°C 온수에서 초음파 추출을 하였으며 추출물을 Whatman No. 4로 여과한 후, 0.45 μ m membrane filter로 여과하여 HPLC(Prominence, Shimadzu Co., Tokyo, Japan)를 실시하였다(column: Sugar- Pak I column(Waters Co.) \varnothing 6.5 \times 300 mm, column, temp: 90°C, mobile phase: 0.01M Ca-EDTA buffer(50 mg/L Ld.H₂O), flow rate: 0.5 mL/min, sample injection vol: 20 μ L, detector: RI model RID-10A). 표준품은 glucose(Duksan Science, Seoul, Korea), fructose(Daejung Chemicals & Metals Co., Siheung, Korea), sucrose(Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, USA), galactose(Samchun Chemical, Cheonan, Korea)를 일정량씩 혼합하여 증류수에 녹여 표준용액으로 사용하였다. 표준품과 시료의 당 성분은 머무른 시간을 비교하여 확인하였고 peak의 면적으로 각각의 당 함량을 산출하였다.

항산화 활성 측정

DPPH radical assay는 Blois의 방법(16)을 변용하여 측정하였다. 시료용액 제조는 정과 5 g을 80% ethanol 45 mL을 가하여 10배 희석된 시료를 증류수로 채운 초음파발생기 (40 kHz, Daihan Scientific Co., Ltd., Seoul, Korea)를 이용하여 상온에서 30분동안 초음파 추출하였다. 이 시료원액을 희석하지 않고 실험에 그대로 이용하였다. 0.4 mM DPPH 용액을 흡광도 값이 0.95-0.99가 되도록 ethanol로 보정한 후 시료용액과 4:1로 혼합하고 10초간 진탕하고 10분간 암소에서 정치한 후 반응한 용액을 UV-visible spectrophotometer (Evolution 201, Thermo Fisher Scientific Inc, Madison, WI, USA)를 사용하여 517 nm에서 흡광도를 측정하였으며 다음 식에 의하여 DPPH 라디칼 소거능을 나타내었다.

$$\text{DPPH radical scavenging activity(\%)} = \frac{\text{blank absorbance} - \text{sample absorbance}}{\text{blank absorbance}} \times 100$$

ABTS 라디칼 소거능 측정은 Re 등의 방법(17)을 변용하여 측정하였다. 추출액은 DPPH radical assay에 사용된 시료와 동일한 방법으로 제조하였다. 7.4 mM ABTS에 2.45 mM potassium persulphate를 1:1로 섞은 후, 암소에 14시간 동안 방치하여 양이온 라디칼($\text{ABTS}^{\cdot+}$)을 형성시킨 후, 734 nm에서 흡광도의 값이 1.00 이하가 되도록 희석하였다. 희석된 $\text{ABTS}^{\cdot+}$ 용액 980 μL 에 시료용액 20 μL 를 가한 뒤 10분간 정치한 후 흡광도를 측정하였으며 다음 식에 의하여 ABTS 라디칼 소거능을 나타내었다.

$$\text{ABTS radical scavenging activity(\%)} = \frac{\text{blank absorbance} - \text{sample absorbance}}{\text{blank absorbance}} \times 100$$

총 페놀성 화합물 함량 측정

총 페놀성 화합물 함량(total phenolic content, TPC)은 Folin-Ciocalteu 법(13)을 응용하여 정량하였다. 시료는 정과 5 g을 80% ethanol 45 mL로 30분간 초음파 추출한 것을 사용하였고, 이 시료원액을 희석하지 않고 실험에 그대로 이용하였다. 시료액 1 mL에 Folin-Ciocalteu reagent 1 mL를 혼합하여 15분간 정치한 후 10% Na_2CO_3 1 mL를 첨가하여 60분 동안 암소에서 반응시켜 UV-visible spectrophotometer (Evolution 201, Thermo Fisher Scientific Inc., USA)로 700 nm에서 흡광도를 측정하였으며, tannic acid를 표준물질로 하여 총 페놀성 화합물의 함량을 tannic acid equivalent (TAE) mg/kg 으로 나타내었다.

관능검사

관능검사는 실험에 대한 검사방법에 충분히 훈련된 15명의 경북대학교 식품공학부 대학원생들을 대상으로 실시하였다. 평가 항목은 색(color), 외관(appearance), 향(flavor),

맛(taste), 생강맛(ginger taste), 단맛(sweet taste), 씹힘성(chewiness), 전반적 기호도(overall preference)를 검사하였고, 7점 척도법(1점, 매우 나쁘다; 7점, 매우 좋다)으로 표시하도록 하였다.

통계처리

모든 실험 결과는 3회 반복하여 실시하였고 그 결과 값을 평균과 표준편차로 표시하고(mean \pm SD), SAS program(9.4, SAS Institute, Inc., Cary, NC, USA)을 이용하여 분산분석과 Duncan's multiple range test($p < 0.05$)를 실시하였다.

결과 및 고찰

수분함량, pH 및 가용성 고형분 함량

감미료를 달리하여 제조한 생강정과의 수분함량, pH, 가용성 고형분 함량을 Table 1에 나타내었다. 정과의 수분함량은 설탕 19.63%, 자일리톨 20.54%, 꿀 32.14%, 올리고당 33.25%로 시료 간에 유의적인 차이를 나타내었으며 프락토 올리고당의 경우, 설탕의 과당 잔기에 과당 분자를 1-3개 정도 β 결합시킨 것으로 보습성이 클 것으로 보인다(16). 또한 가용성 고형분 함량은 자일리톨이 7.07 °Brix로 가장 높은 수치를 나타내었다. 감미료 각각의 특색이 다르기 때문에 장시간 뜨거운 액체로 졸여질 경우 결정의 모양과 형태, 수분흡수력 등이 달라서 수분함량과 가용성 고형분 함량에 차이가 나는 것으로 생각된다. 설탕과 자일리톨 처리구는 수분함량이 적어 표면에 결정이 생성된 반면 꿀과 올리고당 처리구는 완전히 건조되지 않고 끈적이는 제형을 나타내었다. 정과의 pH는 올리고당이 5.82로 가장 낮았으며 설탕이 6.59로 가장 높은 값을 나타내었다.

Table 1. Moisture contents, pH and soluble solid content of ginger *Jungkwa* treated with different types of sweeteners

Samples	Moisture contents (%)	Total soluble solid contents (°Brix)	pH
Sugar	19.63 \pm 0.52 ^{d1)}	6.37 \pm 0.06 ^b	6.59 \pm 0.08 ^a
Xylitol	20.54 \pm 0.49 ^c	7.07 \pm 0.15 ^a	6.48 \pm 0.02 ^{ab}
Honey	32.14 \pm 0.13 ^b	5.70 \pm 0.30 ^c	6.02 \pm 0.09 ^c
Oligosaccharides	33.25 \pm 0.08 ^a	5.97 \pm 0.06 ^c	5.82 \pm 0.09 ^d

¹⁾Means \pm SD (n=3) with different letters in the same column represent significantly different at 5% level.

색도 및 물성

감미료를 달리하여 제조한 생강정과의 L*, a*, b* 값을 Table 2에 나타내었다. L* 값의 경우 자일리톨로 제조한 정과가 60.48 \pm 7.94로 가장 높았으며 나머지 처리구는 유의적인 차이가 없었다. 이는 자일리톨 정과의 표면에 형성된 결정이 정과의 명도에 영향을 미친 것으로 생각된다. 설탕

정과에서도 결정이 형성되었으나 결정의 크기가 크고 부분적으로 분포하여 전반적인 색차에는 영향을 미치지 않은 것으로 생각된다. 이는 최종적으로 제품이 완료되었을 때 당도가 매우 높아 과포화 의해 생기는 석출현상이 감미료 종류에 따라 다르게 일어남으로 이는 색도에 영향을 미칠 수 있음을 보여준다. a^* 값의 경우에는 꿀로 만든 정과가 1.02로 가장 높은 값을 나타내었고 설탕, 자일리톨, 올리고당 순으로 나타났다. 감미료를 달리하여 제조한 생강정과의 물성은 Table 3에 나타내었다. 이는 설탕으로 제조한 수삼정과의 황색도와 적색도가 자일리톨로 제조한 수삼정과의 황색도가 유의적으로 낮았다는 Jo 등(14)의 결과와 유사하였다. 정과의 물성은 제조에 사용되는 당에 따라 물성학적 특성이 다르게 나타나는데(17) 경도의 경우 자일리톨로 제조한 정과가 $75,330 \pm 9,863 \text{ g/cm}^2$ 으로 가장 높은 값을 나타내었고 설탕, 꿀, 올리고당 처리구의 경우 유의적인 차이를 보이지 않았다. 씹힘성은 경도에 비례하는 경향을 보이는데 생강정과의 경우에도 경도와 씹힘성이 유사한 경향을 나타내었다. 탄력성에서 xylitol 처리구는 꿀 또는 올리고당 처리구와 유의적인 차이가 있으며, 응집성의 경우에는 설탕 처리구와 xylitol 처리구에서 유의적인 차이를 보였다. 또한 올리고당으로 제조한 생강정과의 씹힘성이 가장 낮다는 결과는 Jo 등(14)이 연구한 수삼정과에 대한 결과와 일치하였다.

Table 2. Color values of ginger *Jungkwa* treated with different types of sweeteners

Samples	L^*	a^*	b^*
Sugar	44.98±2.91 ^{b1)}	0.79±1.07 ^b	20.97±3.21 ^c
Xylitol	60.48±7.94 ^a	-0.05±0.70 ^c	21.55±2.74 ^{bc}
Honey	40.78±2.26 ^c	1.02±0.89 ^a	22.50±2.56 ^{ab}
Oligosaccharides	42.44±2.48 ^c	-0.62±0.94 ^d	23.46±2.33 ^a

¹⁾Means±SD (n=3) with different letters in the same column represent significantly different at 5% level.

Table 3. Texture properties of ginger *Jungkwa* treated with different types of sweeteners

Samples	Hardness (g/cm ²)	Springiness (g)	Cohesiveness (g)	Chewiness (g)
Sugar	25,340±9,348 ^{b1)}	101.67±0.99 ^{ab}	158.14±28.29 ^a	3,207±1,479 ^b
Xylitol	75,330±9,863 ^a	98.01±10.44 ^b	133.98±27.67 ^b	7,675±2,079 ^a
Honey	29,370±8,613 ^b	102.52±2.73 ^a	144.55±22.57 ^{ab}	3,279±1,138 ^b
Oligosaccharides	24,780±7,397 ^b	103.94±1.47 ^a	150.33±26.56 ^{ab}	2,805±779 ^b

¹⁾Means±SD (n=15) with different letters are significantly different at 5% level.

유리당 함량

감미료를 달리하여 제조한 생강정과의 유리당 함량은 Table 4에 나타내었다. 생강원료의 유리당 조성에 대한 연구는 Lee 등(18)에 의해 보고 되었으며, Kim 등(19)은 HPLC

를 이용하여 생강의 fructose, glucose와 sucrose함량이 0.23, 0.20, 0.44% 검출되었다고 보고하였다. 하지만 이와는 달리 Choi 등(20)의 연구에서는 sucrose이 매우 미량이며, glucose와 fructose가 대부분이고 저장, 살균과정 그리고 발효과정에서 이들이 sucrose로 전환된다고 보고하였습니다. 따라서 생강의 유리당 함량과 그 조성은 원료 품종이나, 재배지에 따라 다를수 있으며, 유통과정에서도 변화가 있으며, 특히

Table 4. Free sugar contents of ginger *Jungkwa* treated with different types of sweeteners

Samples	Sucrose	Glucose	Fructose	Galactose
Sugar	84.67±1.52 ^{a1)}	389.13±6.09 ^a	ND ²⁾	272.49±3.70 ^a
Xylitol	0.13±0.00 ^d	0.26±0.02 ^d	0.14±0.01 ^b	ND
Honey	37.73±1.65 ^b	219.8±7.63 ^c	246.82±8.31 ^a	ND
Oligosaccharides	25.22±0.54 ^c	264.68±4.62 ^b	ND	134.60±2.05 ^b

¹⁾Means±SD (n=3) with different letters in the same column represent significantly different at 5% level.

²⁾ND, Not detected.

고온으로 줄이는 정과 가공과정에서는 더욱 큰 변화가 있을 것으로 보인다. 설탕으로 제조한 정과에서 sucrose, glucose 함량이 처리구 중 가장 높게 나타내었으며 fructose는 검출되지 않았다. 이는 설탕으로 제조한 인삼 정과의 유리당 분석 결과 fructose의 함량이 비교적 높게 나타났다는 Lee 등(21)의 결과와 일치하지 않았다. Choi 등(20)의 연구의 살균 및 저장 중 fructose가 glucose보다 급격히 감소한다는 결과에서 보듯이 고온 장시간의 가공 과정에서 glucose보다 구조적 변화가 쉬운 특성으로 보다 급격히 변화한 것으로 보인다. 자일리톨 처리구의 경우 당 성분이 sucrose는 0.13 mg/g, glucose는 0.26 mg/g으로 극히 미량이었고, fructose는 검출되지 않았다. 꿀 처리구는 fructose함량이 246.82 mg/g으로 가장 높았으며 glucose, sucrose가 역시 적지 않은 양이

검출되었다. 꿀처리구가 xylitol처리구보다 훨씬 많은 유리당을 함유함에도 불구하고 가용성 고형분이 xylitol처리구보다 낮게 나온 것은 꿀이 보수력을 가지고 있기 때문에 수분함량이 높아 당성분이 희석되었을 것으로 보인다. 올

리고당 처리구의 경우 glucose 함량이 가장 높았으며 fructose는 검출되지 않았다. 실험에 사용된 프락토올리고당은 포도당, 과당등의 단당류가 glycoside 결합에 의해 탈수 축합된 중합도 2-10의 소당류에 대한 총칭이며, 구성당 종류에 따라 다양하다(20). 이러한 올리고당은 쉽게 분해되지 않아 에너지원으로 이용되지 않는 저칼로리 감미료이며, 감미도 역시 설탕의 30-50%로 낮다(23). 특히 난소화성 올리고당인 프락토올리고당은 분해되지 않고 대장까지 도달하여, 식이섬유와 같은 다양한 기능을 가진 것으로 알려져있다(24). 따라서 분해나 다른 물질로의 전이가 어려우므로 fructose가 증가하지 않은 것으로 사료된다. galactose가 증가한 이유에 대해서는 추후 좀 더 면밀한 검토로 고찰되어야 할 것으로 보인다. 이와 같이 정과 제조시 사용되는 당의 종류에 따라 최종 정과제품의 구성 당에 큰 영향을 미치게 되므로 정과 제조 시 적절한 당 종류를 선택할 필요가 있을 것으로 생각된다.

항산화 활성 및 페놀화합물 함량

감미료를 달리하여 제조한 생강정과의 DPPH 라디칼 소거능은 Fig. 1에 제시하였다. 라디칼 소거능에 사용된 DPPH는 안정한 자유라디칼로 517 nm 부근에서 최대 흡광도를 나타내며 전자 또는 수소를 받으면 517 nm 부근에서 흡광도가 감소하고(25), 방향족 아민류 및 방향족 화합물 등에 의해 환원되어 짙은 보라색이 탈색되는 것으로 항산화능을 측정하는 방법이다(26). 꿀을 이용하여 제조한 정과의 라디칼 소거능이 60.11%로 가장 높게 나타났으며 자일리톨, 올리고당, 설탕 순으로 나타났다. 이는 벌꿀에는 플라보노이드, 페놀 화합물, 각종 효소, 비타민 C, 유기산, 아미노산 등 항산화 활성과 관련된 물질이 많아 항산화 활성이 높게 나타난다는 Kim 등(27)의 보고와 유사하였다. 생강정과의 ABTS 라디칼 소거능은 Fig. 2에 제시하였다. 꿀로 제조한




Fig. 1. DPPH radical scavenging activity of ginger *Jungkwa* treated with different type of sweeteners.

Means±SD (n=3) with different letters in the same column represent significantly different at 5% level.

생강정과의 ABTS 라디칼 소거능이 62.79%로 가장 높게 나타났으며 설탕으로 제조한 정과가 37.57%로 가장 낮은 값을 보였다. 이는 앞서 진행한 DPPH 라디칼 소거능 실험 결과와 유사한 경향을 나타내었다. 감미료를 달리하여 제조한 생강정과의 총 페놀성 화합물 함량은 Fig. 3과 같으며 mg tannic acid equivalent(TAE)/kg 로 나타내었다. 꿀을 이용하여 제조한 생강정과의 경우 총 페놀성 화합물의 함량이 가장 높았으며 자일리톨, 올리고당, 설탕 순으로 나타났다. 이는 당의 종류를 달리하여 제조한 지황정과의 항산화성을 분석한 Kim 등(15)의 연구에서 total phenol 함량이 꿀, 이소말토올리고당, 설탕, 솔비톨 순으로 나타난 결과와 유사하였다.




Fig. 2. ABTS radical scavenging activity of ginger *Jungkwa* treated with different type of sweeteners..

Means±SD (n=3) with different letters in the same column represent significantly different at 5% level.




Fig. 3. Total phenol contents of ginger *Jungkwa* treated with different type of sweeteners..

Means±SD (n=3) with different letters in the same column represent significantly different at 5% level.

Table 5. Sensory evaluation of ginger *Jungkwa* treated with different types of sweeteners

Sample	Appearance	Color	Odor	Taste	Ginger taste	Sweet taste	Chewiness	Overall preference
Sugar	4.67±1.11 ^{ab1)}	4.33±0.90 ^{bc}	4.27±1.16 ^a	4.87±1.25 ^a	5.33±1.18 ^a	4.80±1.15 ^a	5.20±1.47 ^a	4.73±1.10 ^a
Xylitol	4.00±1.65 ^b	3.73±0.96 ^c	4.53±1.19 ^a	4.47±1.36 ^a	4.93±1.33 ^a	4.53±1.30 ^a	4.73±1.03 ^a	4.47±1.19 ^a
Honey	5.40±0.63 ^a	5.80±0.68 ^a	5.27±1.58 ^a	4.47±1.51 ^a	5.07±1.33 ^a	4.40±1.30 ^a	4.73±1.71 ^a	4.93±1.33 ^a
Oligosaccharides	5.13±1.19 ^a	4.87±0.99 ^b	4.87±1.13 ^a	4.40±1.24 ^a	5.00±1.25 ^a	4.40±1.12 ^a	4.47±1.06 ^a	4.73±1.16 ^a

¹⁾Means±SD (n=3) with different letters in the same column represent significantly different at 5% level.

**Fig. 4. Photographs of ginger *Jungkwa* treated with different sweeteners.**

관능검사

감미료를 달리하여 제조한 생강정과의 관능검사 결과는 Table 5에 나타내었다. Fig. 4에서 보이는 것과 같이 외관과 색의 경우 건조한 상태인 설탕정과의 자일리톨 정과에 비해 수분이 많은 꿀정과의 올리고당 정과의 선호도가 유의적으로 높게 나타났다. 위의 색도 분석 결과와 비교해 보았을 때 색의 기호도는 L^* 값이 낮을수록 높은 점수를 나타내었다. 이에 따라 정과가 어두운 색을 나타낼수록 시각적 기호도가 높아짐을 알 수 있었고, 가장 L^* 값이 낮은 꿀 > 올리고당 > 설탕 > 자일리톨 순으로 색의 기호도 결과가 나타났다. 생강맛과 단맛, 씹힘성을 측정한 항목에서는 설탕으로 제조한 정과가 가장 높이 평가되었으나 처리구 간의 유의적인 차이는 나타나지 않았다. 따라서 감미료에 따라 생강의 특유의 맛이나, 향, 식감에는 큰 차이를 주지 않는 것으로 보인다. 종합적 기호도는 꿀, 설탕, 올리고당, 자일리톨 순으로 높은 점수를 나타냈으며 정과의 제형에 따른 유의적인 차이는 나타나지 않았다.

요약

감미료의 종류를 달리하여 제조한 생강정과의 품질 특성 및 항산화성을 분석하여 품질이 향상된 생강정과를 제조하고자 하였다. 열수처리한 생강을 설탕, 자일리톨, 꿀, 올리고당과 2:1의 비율로 약한불에서 졸여 정과를 제조하였다. 생강정과의 수분함량은 꿀과 올리고당 정과가 높았으며 설탕과 자일리톨 정과는 수분함량이 적어 표면에 결빙이

생성되었다. 가용성 고형분 함량은 자일리톨이 7.07 °Brix로 가장 높았다. 정과의 pH는 올리고당이 5.82로 가장 낮았으며 설탕이 6.59로 가장 높은 값을 나타내었다. 자일리톨로 제조한 정과의 명도가 가장 높았으며 꿀로 만든 정과가 적색도가 1.02로 가장 높은 값을 나타내었고 설탕, 자일리톨, 올리고당 순으로 나타났다. 자일리톨 정과의 hardness와 chewiness 값이 가장 높았으며 다른 항목에서는 유의적인 차이가 나타나지 않았다. 유리당 함량은 설탕으로 제조한 정과의 sucrose, glucose, galactose 함량이 가장 높았으며 자일리톨 처리구의 경우 당 성분이 극히 미량이거나 검출되지 않았다. 꿀로 제조한 생강정과의 DPPH, ABTS 라디칼 소거능이 가장 높게 나타났으며 총 페놀성 화합물 함량도 꿀이 가장 높았고 자일리톨, 올리고당, 설탕 순으로 나타났다. 관능검사에서 꿀과 올리고당으로 제조한 정과가 외관과 색의 선호도가 유의적으로 높게 나타났으며 종합적 기호도는 꿀, 설탕, 올리고당, 자일리톨 순으로 나타났다. 이상의 실험 결과로 미루어 보아 생강정과를 제조할 때 꿀을 사용하는 것이 정과의 품질과 기호도를 높일 수 있을 것으로 생각된다.

References

1. Lee YN (1996) Flora of Korea. Kyohaksa, Seoul, Korea, p 1107-1109
2. Lee CB (1979) Illustrated Flora of Korea. Hyangmoon Publish Co, Seoul, Korea, p 231

3. Chung TY, Jeong MC, Lee SE, Kim DC, Kim OW (1996) Morphological characteristics of ginger depending on habitat. Korean J Food Sci Technol, 28, 834-840
4. Takahashi M, Osawak, Sato T, Ueda J (1982) Components of amino acids of *Zingiber officinale* Roscoe. Ann Rep Tohoku Coll Pharm, 29, 75-88
5. Chen CC (1986) Chromatographic analyses of gingerol compounds in ginger (*Zingiber Officinale* Roscoe) extracted by liquid carbon dioxide. J Chromatogr A, 360, 163-173
6. Moon HI, Lee JH (1997) Volatile aromatic components of ginger (*Zingiber Officinale* Roscoe) rhizomes and Japanese spice bush (*Lindera obtusiloba* BL). Korean J Crop Sci, 42, 7-13
7. Enmaya H (1981) Dictionary of food science. Dou Dan Publishing Co, Tokyo, Japan, p 300
8. Jo KS, Kim JH, Shin HS (1996) Major components affecting nonenzymatic browning in ginger (*Zingiber officinale* Roscoe) paste during storage. Korean J Food Sci Technol, 28, 433-439
9. Lee SM, Joo NM (2011) Characteristics and optimization of processed sweet rice muffin using ginger powder. Korean J Food Cookery Sci, 27, 31-43
10. Park HJ (2009) Quality characteristics of ginger jam with ginger powder. MS Thesis, Chonbuk National University, Korea, p 1-4, p 28-29
11. Blois MS (1958) Antioxidant determinations by the use of a stable free radical. Nature, 181, 1199-1200
12. Re R, Pellegrini N, Proteggente A, Pannala A, Yang M, Rice-Evans C (1999) Antioxidant activity applying and improved ABTS radical cation decolorization assay. Free radic Biol Med, 26, 1231-1237
13. Benvenuti S, Pellati F, Melegari M, Bertelli D (2004) Polyphenols, anthocyanins, ascorbic acid, and radical scavenging activity of *Rubus*, *Ribes*, and *Aronia*. J Food Sci, 69, 164-169
14. Jo EH, Kim HA, Kim YS (2015) Quality characteristics of *JungKwa* made with ginseng and the effects of different types of sweeteners. Korean J Culinary Res, 21, 248-258
15. Kim HJ, Min SR, Kim MR (2014) Quality characteristics and antioxidant activities of *Rehmannia glutinosa* *JungKwa* prepared with different kinds of sugars. Korean J Food Cook Sci, 30, 76-83
16. Spiegel JE, Rose R, Karabell P, Frankos VH, Schmitt DF (1994) Safety and benefits of fructooligosaccharides as food ingredients. Food Technol, 48, 85-89
17. Park MR, Choi SK, Jung IC, Byun GI (2006) Rheological & sensory characteristics of pine mushroom *Jung-Gwa* by different amount of saccharide (honey and oligosaccharide). Korean J Food Culture, 21, 695-701
18. Lee SE, Jung MC, Jung TY (1994) A Study on the development of storage facilities for ginger. Korea Food Research Institute Report, E1294-0538
19. Kim JS, Koh MS, Kim YH, Kim MK, Hong JS (1991) Volatile flavor components of Korean ginger (*Zingiber officinale* Roscoe). Korean J Food Sci Technol, 23, 141-149
20. Choi EJ, Lee KA, Kim BS, Ku KH (2012) Effect of pre-treatment and storage conditions on the quality characteristics of ginger Paste. Prev Nutr Food Sci, 17, 46-52
21. Lee KS, Kim GH, Seong BJ, Kim HH, Song MR, Kim MR, Lee GH (2010) Physicochemical characteristics of ginseng *JungKwa* produced with hot-water extract from *Maegmundong* (*Liriope platyphylla* tubers). J Korean Soc Food Sci Nutr, 39, 1819-1825
22. Park KH (1994) Understand and use food functional ingredients. Inje Food Science Forum collection of treatises, 2, 165-195
23. Heo KT (1995) Physiological functions of oligosaccharides. Food Science and Industry, 28, 24-28
24. Lee MR, Lee KA, Ly SY (2003) Improving effects of fructooligosaccharide and isomaltooligosaccharide contained in sponge cakes on the constipation of female college students. J Korean Soc Food Sci Nutr, 32, 621-626
25. Shin YS, Lee JE, Yeon IK, Do HW, Cheung JD, Kang CK, Choi SY, Youn SJ, Cho JG, Kwoen DJ (2008) Antioxidant and antimicrobial effects of extract with water and ethanol of oriental melon (*Cucumis melo* L.var *makuwa* Makino). J Korean Soc Appl Biol Chem, 51, 194-199
26. Ancerewicz J, Migliavacca E, Carrupt PA, Testa B, Bree F, Zini R, Tillement JP, Labidalle S, Guyot D, Chauvet-Monges AM, Crevat A, Le Ridant A (1998) Structure-property relationships of trimetazidine derivatives and model compounds as potential antioxidants. Free Radical Biol Med, 25, 113-120
27. Kim HK, Lee MY, Hong IP, Chio YS, Kim NS, Lee ML, Lee SC (2010) Antioxidant an antimicrobial capacity of several monofloral honey correlation with phenolic and flavonoid contents. Korean J Apiculture, 25, 275-282