

Review Article / 종설

『東醫寶鑑』 中 附子가 主藥으로 配伍된 方劑研究³

이준서¹, 조정훈¹, 정창옥², 송춘호², 윤용갑^{1,3}, 임규상^{2,3*}

¹원광대학교 대학원

²원광대학교 한의학 전문대학원

³한국전통의학연구소

A Study on the Applications of Radix Aconiti Lateralis Preparata Mainly Blended Prescription in 『Dongeuibogam』

Joon Suh Lee¹, Jung Hoon Cho¹, Chang Ohk Jung², Chun Ho Song², Young Gab Yun^{1,3}, Kyu Sang Lim^{2,3*}

¹Graduate School of Wonkwang University

²Professional Graduate School of Korean Medicine, Wonkwang University

³Korean Traditional Medicine Institute

ABSTRACT

Objectives : This report describes 70prescriptions related to the use of Radix Aconiti Lateralis Preparata mainly blended from Dongeuibogam.

Methods : The following conclusions were drawn through investigations on the pre-scriptions that use Radix Aconiti Lateralis Preparata as a key component.

Results : Prescriptions that Radix Aconiti Lateralis Preparata was taken as a monarch drug are utilized for 31 therapeutic purposes, for example, cold disease, stool disease, child disease. In particular, 17.3% of prescriptions appear in the chapter of cold.

Prescriptions that utilize Radix Aconiti Lateralis Preparata as the main component are used in the treatment of cold, diarrhea and child disease, Bi syndrome due to pathogenic wind, cold and damp and they are also used for treating 55 different types of disease.

Radix Aconiti Lateralis Preparata is used in pathogenic factors such as wind, cold and dampness and used in pathology related to the kidney and spleen and stomach system.

© 2018 The Korean Medicine Society For The Herbal Formula Study

This paper is available at <http://www.formulastudy.com> which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

The dosage of Radix Aconiti Lateralis Preparata is 2pun(about 0.75g) to 5don(about 18.8g), however 1don(about 3.75g)~1don 5pun(about 5.63g) has been taken the most for clinical application.

Conclusions : Gangbutang and Ijungtang are the most useful base prescriptions which use the Radix Aconiti Lateralis Preparata as the main ingredient.

Key words : Dongeuibogam., Radix Aconiti Lateralis Preparata, Gangbutang.

I. 緒論

附子는 毛茛科(미나리아제비과 : Ranunculaceae)에 속한 多年生本草인 烏頭의 子根을 加工한 것으로 학명은 *Aconitum carmichaeli* DEBX.(= *A. chinense* auct. non PAXT.) 이다. 중국의 四川과 陝西에서 많이 재배하고 6월 하순부터 8월 초순 사이에 채취하여 사용한다^{1~2)}.

附子의 性味는 辛, 热 有毒하고 心·腎·脾 三經에 작용하며 心陽을 도와 通脈하고 脾胃를 溫하게 하여 健運시키고 腎陽을 溫補하며 回陽救逆, 补火助陽, 溫中止痛, 逐風寒濕邪 等의 효능이 있어 大汗亡陽, 吐利厥逆, 陰盛隔陽, 心腹冷痛, 脾冷泄痢, 腳氣水腫, 小兒慢性驚風, 風寒濕痺, 跛躊拘攣, 陰疽瘡漏, 一切의 沈寒痼冷 및 각종 만성의 陽衰의 증상과 寒濕邪가 經絡을 침습한 寒痺證 등에 활용되어 왔다^{3~9)}.

附子는 心筋의 수축력 증가 體溫上昇 血液循環 改善 鎮痛作, 免疫 및 炎症反應 抑制 뇌하수체 및 부신 피질을 흥분시키는 약리작용이 있다. 附子에 含有된 성분으로는 强心作用이 있는 coryneine, higenamine 등의 alkaloid와 유독성물질인 diterpenene계 알칼로이드인 aconitine, hypaconitine 등이 있다.

aconitine은 소량에서 운동과 호흡 및 선분비를 항진시키지만, 조금만 지나치면 호흡중추마비 심전도장애 순환기마비 지각 및 운동신경마비로 間代性 혹은 強直性痙攣 구토 동공확대를 일으키며, higenamine은 心筋細胞의 박동수를 증가시키고 心筋細胞의 자발적인 박동실조를 개선하는 것으로 알려져 있다^{10~16)}.

한편 附子는 여러 가지 약물과 함께 配伍하여 다양하게 方劑구성에 사용되어 왔는데, 四逆湯에서와 같이 乾薑과 甘草를 배합하여 사용하면, 大汗, 大吐, 大

下 후에 식은땀이 나며 四肢가 厥逆하며 脈微欲絕 등의 亡陽厥脫證에 활용하며, 八味丸 右歸丸과 같이 肉桂 熟地黃 山藥 등과 配伍하면, 命門의 火가 衰하여 생긴 陽痿 子宮冷이나 무릎이 시리고 아픈 것을 다스리고, 附子理中湯에서와 같이 人蔘 乾薑 白朮 甘草와 配伍하여 陰寒內盛의 脾陽不運 嘴吐下痢 등의 병증에 사용하였고, 附子湯, 甘草附子湯에서와 같이 桂枝 白朮 甘草 등과 配伍하여 風寒濕痺을 제거하고 溫經하여 止痛하고 屈伸不利를 다스리는데 사용하여 왔다^{5~8)}.

이와 같이 附子는 配伍되는 약물에 따라 다양한 효능을 발휘하고 있는 바 저자는 『東醫寶鑑』 중 附子가 主藥으로 配伍된 70種의 方劑에 대한 治療領域, 痘症 및 主治 痘因·病理 使用量 處方構成 等의 資料分析을 통하여 附子의 活用에 대한 方劑學의 知見을 얻었기에 報告하는 바이다.

II. 本論

본 논문의 研究方法은 『東醫寶鑑』 中 附子가 主藥으로 配伍된 70處方의 内容을 data base化하여 文獻的 資料analysis 및 研究內容을 整理하였으며, 處方名은 同一하나 構成內容이 다른 경우는 處方에 (2)를 表記하여 區分하였다.

本 論文에서 主藥이라 함은 處方構成에서 附子의 役割이나 使用量이 君臣藥으로 作用하거나, 혹은 여러 가지 藥物과 等分으로 構成되어 있는 경우로 效能과 사용량으로 볼 때 主된 역할을 할 수 있는 것으로 한정하였다.

이에 대한 근거로는 『素問』 『至真要大論』에서 “主病之謂君, 佐君之謂臣...”, 『脾胃論』에서는 “君藥分量最多, 臣藥次之, 使藥又次之, 不可令臣過于君”,

* Corresponding author : Kyu Sang Lim, Professional Graduate School of Korean Medicine, Wonkwang University, 460, Iksan-daero, Iksan-si, Jeollabuk-do, 54538, Republic of Korea.

Tel: +82-63-850-6916, Fax: +82-63-850-7324, E-mail : kslim@wku.ac.kr

•Received : May 4, 2018 / Revised : May 18, 2018 / Accepted : May 25, 2018



“力大者爲君”, 《活人心統》에서는 “凡用藥殊分, 主病爲君, 以十分爲率, 臣用七八分, 輔佐五六分, 使以三四分”이라 하여 사용분량이 가장 많거나, 中心이 되는 痘症에 사용되는 藥이거나, 藥效가 가장 큰 것을 君藥으로 사용하였다고 언급한 내용 등을 참고하였다
 17,18)

Table 1. The therapy domain of Radix Aconiti Lateralis Preparata as Mainly Blended Prescription

治療領域 (病門)	處方名	頻度數	百分率
寒	麻黃附子甘草湯, 真武湯, 通脈四逆湯, 附子散, 正陽散, 廻陽返本湯, 霹靂散, 廻陽救急湯 加減白通湯, 附子理中湯, 附子瀉心湯, 陶氏再造散	12	17.3
大使	附子溫中湯, 四柱散, 溫脾散, 禹餘糧丸, 固腸丸, 大斷下丸, 加味養臟湯, 麴芎丸	8	11.5
小兒	加味朮附湯, 蝶附散, 補脾益真湯, 黑附湯, 生附四君子湯	5	7.1
風	星附散, 一粒金丹, 沈香半夏湯, 附子湯	4	5.8
胸	九痛丸, 扶陽助胃湯, 破結丹	3	4.3
諸瘡	溫經丸, 治心漏方, 生附散	3	4.3
癰瘍	果附湯, 七棗湯, 四將軍飲	3	4.3
黃疸	茵陳吳茱萸湯, 茵陳四逆湯, 茵陳附子乾薑湯	3	4.3
前陰	九仙靈應散, 丁香練實丸, 木香金鈴丸	3	4.3
津液	桂枝附子湯, 桂附湯	2	2.9
虛勞	茸附湯, 沈香鱉甲散	2	2.9
濕	加味朮附湯(2), 羌附湯	2	2.9
浮腫	實脾散, 加味腎氣丸	2	2.9
救急	大固陽湯	1	1.4
臍	代灸塗臍膏	1	1.4
面	升麻附子湯	1	1.4
瘧疾	聖散者	1	1.4
內傷	白朮附子湯	1	1.4
火	既濟湯	1	1.4
癰疽	托裏溫中湯	1	1.4
嘔吐	附子散(2)	1	1.4
胞	桂附湯(2)	1	1.4
邪祟	八毒赤散	1	1.4
小便	生附湯	1	1.4
頭	羌活附子湯	1	1.4
鼻	細辛膏	1	1.4
眼	臘茶飲	1	1.4
頸項	椒附散	1	1.4
血	平胃地榆湯	1	1.4
咳嗽	羌活附子湯(2)	1	1.4
毛髮	三聖膏	1	1.4
Total		70	100.0

1. 附子가 主藥으로 配伍된 方劑의 治療領域에 대한 調査

附子가 主藥으로 配伍된 方劑의 治療領域에 대하여
빈도수가 높은 순서대로 整理하였으며 治療領域의 분
류는 『東醫寶鑑』 의 痘門을 기준으로 하였다(Table 1).

2. 附子가 主藥으로 配伍된 方劑의 痘症 및 主治 調査
 附子가 主藥으로 配伍된 方劑를 疾患別로 区分하

Table 2-1. The symptoms and charge of Radix Aconiti Lateralis Preparata as Mainly Blended Prescription in cold, stool

區分	病症 區分	處 方	主 治
大便	寒泄	附子溫中湯	中寒 腹痛泄瀉 水穀不化
		四柱散	元藏虛冷 脘腹冷痛 大便滑泄 耳鳴 頭暈
	泄瀉諸證	固腸丸	泄痢日久 滑數瘦弱
	休息痢	加味養臟湯	休息痢
	久泄	溫脾散	久痢 米穀不化 水穀入口 即時直下 下元虛冷滑脫
	滑泄	禹餘糧丸	虛寒滑泄不禁
	虛痢	大斷下丸	久痢滑數 消瘦困弱
	濕泄	翹芎丸	風濕滑泄
		麻黃附子甘草湯	少陰病 無吐利厥逆
	少陰形證	真武湯	服滿痛 小便利 或 下利 或 嘘
寒		通脈四逆湯	下利 四肢厥冷 脈微欲絕 或 無脈
		附子散	傷寒陰毒
	傷寒陰毒	正陽散	傷寒陰毒
		廻陽救急湯	傷寒陰證 及 陰毒四肢厥冷 脈沈細
		廻陽返本湯	陰盛隔陽
	陽極似陰	霹靂散	陰盛隔陽
	可汗不可汗證	陶氏再造散	陽虛不得汗 亡陽證
	傷寒痞氣	附子瀉心湯	傷寒痞氣
	中寒證	附子理中湯	中寒口噤身強直
	痼冷	加減白通湯	沈寒痼冷 脘腹冷痛 大便自利 足脛寒而逆
小兒		蝎附散	慢脾風 回陽 脘痰
		補脾益貞湯	慢脾風
	慢脾風	黑附湯	慢脾風危急
		生附四君子湯	慢脾 助胃回陽
	慢驚風	加味朮附湯	吐瀉後 變成慢驚 或 因藏寒 洞泄得者



Table 2-2. The symptoms and charge of Radix Aconiti Lateralis Preparata as Mainly Blended Prescription in wind, damp, chest, an abscess, body fluid, malaria disease

區分	病症 區分	處 方	主 治
風	痺證病	附子湯	風寒濕合而爲痺 骨節疼痛 皮膚不仁 肌肉重着四肢緩縱
	手足癱瘓	星附散	中風只手足顛曳
	諸風通治	一粒金丹	一切諸風
濕	痰涎壅盛	沈香半夏湯	中風痰盛 祛痰醒脾和氣益心
	中濕	加味朮附湯(2)	中濕諸證
	風濕	羌附湯	風濕相搏 肢體掣痛 浮腫
胸	心痛	九痛元	九種心痛 及 積冷心胸痛
	陰陽毒結胸	破結丹	陰陽毒伏逆變爲結胸
	冷心痛	扶陽助胃湯	胃脘當心而痛 寒氣客於腸胃之間則 卒然痛得熱
諸瘡	疳瘻	溫經丸	陷脈久瘻
		治心漏方	胸前有孔常出血水
	凍瘻	生附散	凍瘻爛痛
津液	自汗	桂附湯	自汗 漏不止
	亡陽證	桂枝附子湯	傷寒發汗過多 隘漏不止 四肢拘急 難以屈伸
		果附湯	脾寒瘧疾面青振寒
痃瘻	痃瘻	七棗湯	五藏氣虛 陰陽相勝 作爲痃瘻 不問遠近
	瘻疾	四將軍飲	瘻作時仆厥 撼腋不省

Table 2-3. The symptoms and charge of Radix Aconiti Lateralis Preparata as Mainly Blended Prescription in jaundice, urethra, consumptive, edema disease

區分	病症 區分	處 方	主 治
黃疸	陰黃	茵陳吳茱萸湯	陰黃 曾服薑附諸藥未愈 脈尚遲者
		茵陳四逆湯	陰黃 肢體逆冷自汗
		茵陳附子乾薑湯	陰黃
前陰	諸疝通治	丁香練實丸	男子七疝 女子瘕聚帶下
		木香金鈴丸	諸般疝氣 及 外腎腫脹痛 一服立應
	陰痿	九仙靈應散	男子陰濕陽痿每逢不舉
虛勞	陽虛	茸附湯	氣精血虛耗 潮熱盜汗
	虛勞通治	沈香鱉甲散	諸虛百損一切勞傷
浮腫	水腫	實脾散	陰水發腫 先實脾土
		加味腎氣丸	腎虛 不能行水 以致浮腫

Table 2-4. The symptoms and charge of Radix Aconiti Lateralis Preparata as Mainly Blended Prescription in the other disease

區分	病症 區分	處 方	主 治
救急	脫陽證	大固陽湯	脫陽證
臍	臍宜溫煖	代灸塗臍膏	下元虛寒 臍腹冷痛
面	面寒	升麻附子湯	面寒
瘧疫	瘧疫	聖散者	疫癘流行 不問陰陽表裏 連服取差 又 治風溫 濕溫等證
內傷	內傷病始爲熱 中終爲寒中	白朮附子湯	內傷未傳爲寒中證
火	虛煩	既濟湯	霍亂後虛煩自利手足冷
癰疽	癰疽雜證	托裏溫中湯	癰疽 陽氣下陷 腹痛泄瀉 咳逆 昏憚
嘔吐	噎膈反胃	附子散(2)	反胃
胞	帶下	桂附湯(2)	白帶腥臭 多悲不樂 大寒之證
邪祟	邪祟尸疰	八毒赤散	人染着神鬼
小便	冷淋	生附湯	冷淋 小便澀痛 增寒凜凜
頭	厥逆頭痛	羌活附子湯	大寒犯腦 令人腦痛 齒亦痛
鼻	鼻鼽	細辛膏	鼻塞腦冷 清涕不止
眼	外障	臘茶飲	赤脈腎從上而下
頸項	項強	椒附散	腎氣上攻項背 不能轉移
血	便血	平胃地榆湯	結陰便血
咳嗽	咳逆	羌活附子湯(2)	大病後 胃中虛寒 咳逆
毛髮	鬚髮黃落	三聖膏	髭髮脫落 能令再生

3. 附子가 主藥으로 配伍된 方劑의 痘因·病理 調査

附子가 主藥으로 配伍된 方劑 70方中 痘因·病理가

기록된 34개 處方을 중심으로 内容을 調査하여 有形

別로 分類하여 整理하였다(Table 3).

Table 3. The eti-pathology of Radix Aconiti Lateralis Preparata as Mainly Blended Prescription.

區分	病因·病理	病 症	處 方
臟腑 病理	下元虛寒	久瀉米穀不化 水穀入口 即時直下 下元虛冷滑脫	溫脾散
		下元虛寒 臍腹冷痛	代灸塗臍膏
	五臟氣虛	元藏虛冷 臍腹冷痛 大便滑泄 耳鳴 頭暉	四柱散
		五臟氣虛 陰陽相勝 作爲痰瘡不問遠近	七聚湯
	腎氣上攻	腎氣上攻 項背不能轉移	椒附散
	腎虛	腎虛不能行水 以致浮腫	加味腎氣丸
	脾寒	脾寒瘡疾 面青振寒	果附湯



區分	病因病理	病 症	處 方
虛寒 病理	虛寒	虛寒 滑泄不禁	禹餘糧丸
	陽虛	陽虛不得汗	陶氏再造散
		九種心痛 及 積冷心胸痛	九痛元
	積冷	沈寒痼冷 脘腹冷痛	
		大便自利足脛寒而逆	加減白通湯
		癰疽 陽氣下陷 腹痛泄瀉 咳逆 昏憚	托裏溫中湯
	陰盛隔陽	陰盛隔陽	廻陽返本湯
		陰盛隔陽證	霹靂散
	結陰	結陰便血	平胃地榆湯
	氣精血虛耗	氣精血虛耗 潮熱盜汗	茸附湯
		傷寒痞氣	附子瀉心湯
		傷寒陰毒	附子散
		傷寒陰毒證	正陽散
	傷寒	傷寒陰證 及 陰毒四肢厥冷 脈沈細 脣青面黑	回陽救急湯
		傷寒發汗過多 險漏不止 四肢拘急 難以屈伸	桂枝附子湯
	少陰病	少陰病 腹滿痛 小便利 或 下利 或 嘘	真武湯
		少陰病下利 四肢厥冷 脈微欲絕 或 無脈	通脈四逆湯
六氣 病理	風寒濕	風寒濕合而爲痺 骨節疼痛 皮膚不仁 肌肉重着 四肢緩縱	附子湯
	風濕	風濕相搏 肢體掣痛 浮腫	羌附湯
	中風	中風只手足顓曳	星附散
	中濕	中濕諸證	加味朮附湯(2)
		中寒 腹痛泄瀉 水穀不化	附子溫中湯
		大寒犯腦 令人腦痛 齒亦痛	羌活附子湯
	中寒	中寒口噤身強直	附子理中湯
		胃脘當心而痛 寒氣客於腸胃之間 則 卒然痛得熱	扶陽助胃湯
		內傷未傳爲寒中證	白朮附子湯
其他 病理	七情	人染着神鬼 鬼疰病	八毒赤散
	凍傷	凍瘡爛痛	生附散

4. 附子의 使用量에 대한 調査

附子가 主藥으로 配伍된 方劑 70方中 等分과 用量이 불확실한 경우는 百分率 계산에서 제외시켰으며 각 49개 方劑의 處方別 一回 使用量을 調査하여 整理

하면 Table 4와 같다. 丸劑 散劑 膏劑中 사용량의 기준이 없는 것은 20貼分量으로 나누어 계산하였으며 外用劑는 備考에 “外”라고 표시하였다.

Table 4. The dosage of Radix Aconiti Lateralis Preparata at once(water extract)

用 量	病 症	處 方	用 量	備 考	百 分 率
二分～ 七分	慢脾風	補脾益真湯	2分		
	鼻鼽	細辛膏	4分	外	
	久泄	溫脾散			
	瘧疫	聖散者			
	泄瀉諸證	固腸丸	5分		20.4
	虛痢	大斷下丸			
	傷寒陰毒	正陽散			
	陰痿	九仙靈應散	6分	外	
	冷淋	生附湯			
	面寒	升麻附子湯	7分		
一錢～ 一錢半	陽極似陰	廻陽返本湯			
	中寒證	附子理中湯			
	內傷病始爲 熱中終爲寒中	白朮附子湯			
	便血	平胃地榆湯			
	水腫	實脾散	1錢		44.9
	手足癱瘓	星附散			
	可汗不可汗證	陶氏再造散			
	虛勞通治	沈香鱉甲散			
	少陰形證	麻黃附子甘草湯			
	傷寒陰毒	廻陽救急湯			
一錢～ 一錢半	痺證病	附子湯			
	咳逆	羌活附子湯(2)			
	陰黃	茵陳吳茱萸湯			
		茵陳四逆湯	1錢		
	外障	臘茶飲			
	厥逆頭痛	羌活附子湯			44.9
	疳瘻	溫經丸			
	寒泄	四柱散	1.25錢		
	鬚髮黃落	三聖膏		外	
	寒泄	附子溫中湯			
慢脾風	風濕	羌附湯	1.5錢		
	慢脾風	黑附湯			



用 量	病 症	處 方	用 量	備 考	百 分 率
二錢～ 二錢半	陰黃	茵陳附子乾薑湯			
	痼冷	加減白通湯			
	冷心痛	扶陽助胃湯			
	傷寒痞氣	附子瀉心湯			
	虛煩	既濟湯	2錢		
	中濕	加味朮附湯(2)			
	癰疽雜證	托裏溫中湯			26.6
	水腫	加味腎氣丸			
	少陰形證	通脈四逆湯			
	傷寒陰毒	附子散			
三錢	自汗	桂附湯	2.5錢		
	陽虛	茸附湯			
	痰瘡	果附湯			
五錢	少陰形證	真武湯			
	亡陽證	桂枝附子湯	3錢		6.1
	帶下	桂附湯(2)			
瘡疾	瘡疾	四將軍飲	5錢		2.0

5. 附子가 主藥으로 配伍된 方劑의 構成內容 調査

附子가 主藥으로 配伍된 方劑를 疾患別로 區分하고
 이에 대한 處方 構成 内容을 調査하여 分析하였다.

본 논문에서 基本方이라 함은 韓醫學의 개념이 포함된 최소단위의 處方을 말한다(Table 5).

Table 5-1. The composition of Radix Aconiti Lateralis Preparata as Mainly Blended Prescription in stool, cold, child.

病症	處 方	構 成 内 容	基本處方
寒泄	附子溫中湯	附子炮 乾薑炮 各一錢半 人參 白朮 白茯苓 芍藥 甘草炙 各一錢 厚朴 草豆蔻煨 陳皮 各六分	附子理中湯 平胃散 芍藥甘草湯
	四柱散	木香 白茯苓 人參 附子炮 各一錢二分半	
泄瀉 諸證	固腸丸	龍骨 附子炮 枯白礬 訶子皮 各一兩 丁香 良薑 赤石脂 白豆蔻 縮砂 各五錢 木香 三錢	
休息痢	加味養臟湯	真人養臟湯 加 附子 青皮 烏藥 茯苓	真人養臟湯
久泄	溫脾散	黃芪蜜炒 人參 白朮土炒 白茯苓 山藥炒 乾薑炮 訶子炮 肉豆蔻煨 瞿栗殼蜜炒 草果 丁香 肉桂 附子炮 黃蓮薑汁炒 縮砂 陳皮 厚朴 甘草 各五分	附子理中湯 八柱散 異功散 平胃散
滑泄		禹餘糧丸	禹餘糧煨 赤石脂煨 龍骨 菖撥 訶子炮 乾薑炮 肉豆蔻煨 附子炮 各等分

病症	處 方	構 成 內 容	基本處方
虛痢	大斷下丸	龍骨 附子炮 白礬枯 肉豆蔻煨 牡蠣煅 調子皮酸 石榴皮 各一兩 良薑 乾薑 赤石脂 各七錢半 細辛 三錢七分半	薑附湯 固腸丸類
濕泄	麴芎丸	神麴 芎芻 白朮 附子炮 各等分	
少陰 形證	麻黃附子 甘草湯	麻黃 甘草 各二錢 附子炮 一錢	
	真武湯	茯苓 芍藥 附子炮 各三錢 白朮 二錢	三白湯類
	通脈四逆湯	附子 二錢半 乾薑 一錢半 甘草 一錢	薑附湯
	附子散	附子炮 二錢半 桂心 當歸 白朮 各二錢 半夏製 乾薑炮 各一錢	附子理中湯類 薑附湯
傷寒 陰毒	正陽散	附子炮 一兩 乾薑炮 甘草灸 各二錢半 皂角 一挺 麝香 一錢	通脈四逆湯 薑附湯
	迴陽救急湯	人參 白朮 白茯苓 陳皮 半夏 乾薑炮 肉桂 附子炮 五味子 甘草灸 各一錢	附子理中湯 二陳湯
陽極 似陰	迴陽返本湯	附子炮 乾薑炮 人參 陳皮 麥門冬 五味子 甘草灸 臘茶 各一錢	附子理中湯類 生脈散
	霹靂散	附子一箇炮 過以冷灰培半時許取出切 半箇細剉入臘 茶一錢 水一盞煎至六分	
可汗不可 汗證	陶氏再造散	人參 黃芪 桂枝 附子炮 細辛 羌活 防風 川芎 甘草灸 各一錢	桂枝加附子湯類 防風湯類 保元湯
傷寒 痞氣	附子瀉心湯	大黃 黃連 黃芩 各二錢 剥附子炮 二錢別煮作汁	三黃瀉心湯
中寒證	附子理中湯	附子炮 人參 白朮 乾薑炮 甘草灸 各一錢	理中湯 四君子湯類
痼冷	加減白通湯	附子炮 二錢 乾薑炮 肉桂 草豆蔻煨 半夏 人參 白朮 甘草灸 各一錢	附子理中湯 薑附湯
	蝎附散	附子炮 二錢 南星炮 白附子炮 木香 各一錢 全蝎 七箇	星香散類 牽正散類
慢脾風	補脾益真湯	丁香 木香 調子皮 陳皮 厚朴 草果 肉豆蔻 白茯苓 人參 白朮 桂枝 半夏 附子炮 甘草灸 各二分 全蝎炒 一枚	半夏厚朴湯類 錢氏異功散
	黑附湯	附子 三錢 木香 一錢半 白附子 一錢 甘草灸 半錢	
	生附四君子湯	四君子湯料加 生附子末等分	四君子湯
慢驚風	加味朮附湯	附子炮 白朮 各一兩 肉豆蔻煨 二箇 木香 甘草灸 各五錢	

Table 5-2. The composition of Radix Aconiti Lateralis Preparata as Mainly Blended Prescription in wind, damp, chest, an abscess, body fluid malaria disease

病症	處方	構成內容	基本處方
痺證病	附子湯	附子生 白芍藥 桂皮 人參 白茯苓 甘草 各一錢 白朮 一錢半	桂枝加附子湯 四君子湯
手足癱瘓	星附散	南星 半夏並薑製 人參 附子炮 白附子 白茯苓 川烏 白僵蠶 各一錢 沒藥 五分	三仙丸 牽正散類
諸風通治	一粒金丹	川烏炮 附子炮 白附炮 各一兩 白僵蠶 白蒺藜炒 五靈脂 白礬枯過 沒藥 各五錢 朱砂 細墨(磨汁) 麝香 各二錢半	牽正散類
痰涎壅盛	沈香半夏湯	附子炮 一隻 沈香 與附子 等分 人參 五錢 半夏製 二錢 南星炮 一錢	
中濕	加味朮附湯 (2)	附子炮 二錢 白朮 赤茯苓 甘草炒 各一錢半	
風濕	羌附湯	羌活 附子炮 白朮 甘草 各一錢半	
心痛	九痛丸	炮附子 三兩 吳茱萸 人參 乾薑炮 巴豆去皮油 各一兩 狼毒 五錢	附子理中湯類 薑附湯
陰陽毒 結胸	破結丹	辰砂 青礞石 莩蔴子 肉豆蔻 木香 桂心 附子 巴豆 黑丑頭末 各五錢 輕粉 半分 麝香 五分 金箔 五片	
冷心痛	扶陽助胃湯	附子炮 二錢 乾薑炮一錢半 草豆蔻 益智仁 白芍藥酒炒 人參 甘草灸 官桂各一錢 吳茱萸 白朮 陳皮各五分	附子理中湯 芍藥甘草湯 薑附湯
疳瘻	溫經丸	附子 二兩 醋浸炮七次 去皮臍 厚朴 官桂 白朮 乾薑 木香 甘草灸 各一兩	附子理中湯類 薑附湯
	治心漏方	鹿茸酥灸 附子炮 鹽花 各等分	茸附湯
凍瘡	生附散	生附子爲末 麻水調付之.(綱目)	
自汗	桂附湯	桂枝 附子炮 各二錢半	
亡陽證	桂枝附子湯	桂枝 附子炮 各三錢 白芍藥 二錢 甘草灸 一錢	桂枝湯
痃瘞	果附湯	草果 附子炮 各二錢半	
	七棗湯	附子 一箇 炮裂以鹽水浸再炮如此 七次去皮臍	
瘧疾	四將軍飲	附子 一兩炮 虎子 四箇煨 去核 陳皮 四箇 全者 甘草 四寸灸	

Table 5-3. The composition of Radix Aconiti Lateralis Preparata as Mainly Blended Prescription in jaundice, urethra, consumptive, edema disease

病症	處 方	構 成 內 容	基本處方
陰黃	茵陳吳茱萸湯	茵陳一物湯 加吳茱萸 附子炮 乾薑炮 木通 當歸 各一錢也。(活人)	茵陳薑附湯 茵陳四逆湯類
	茵陳四逆湯	茵陳一物湯 加附子炮 乾薑炮 甘草炙 各一錢也。(活人)	茵陳薑附湯
		附子炮 乾薑炮 各二錢 茵陳 一錢二分 草豆蔻 一錢 枳實 半夏 澤瀉 各五分 白朮 四分 白茯苓 橘紅 各三分	茵陳薑附湯 二陳湯類 枳朮丸
諸症 通治	丁香練實丸	當歸 附子炮 川練肉 茵香 各一兩	一捻金元類
	木香金鈴丸	乳香 沒藥 木香 附子炮 茵香鹽炒 川棟肉 玄胡索 全蝎炒 人參 各等分	丁香練實丸類 乳香散
		附子炮 蛇床子 紫梢花 遠志 石菖蒲 海螵蛸 丁香 木鱉子 各二錢 小腦 一錢半	
陰痿	九仙靈應散		
陽虛	茸附湯	鹿茸 附子炮 各二錢半	
虛勞 通治	沈香鱉甲散	鱉甲醋灸 附子炮 肉桂 各一錢 當歸 熟地黃 羌活 各七分半 沈香 木香 人參 巴戟 白茯苓 牛膝 黃芪 柴胡 荊芥 半夏 秦艽 各五分 全蝎 二分半 肉豆蔻煨 一箇	內補丸 十全大補湯類
		厚朴 白朮 木瓜 草果 大腹子 附子炮 白茯苓 各一錢 木香 乾薑炮 甘草炙 各五分	果附湯 薑附湯
		附子炮 二兩 白茯苓 澤瀉 肉桂 牛膝 車前子炒 山藥 山茱萸 牡丹皮 各一兩 熟地黃 五錢	八味丸
水腫	加味腎氣丸		

Table 5-4. The composition of Radix Aconiti Lateralis Preparata as Mainly Blended Prescription in the other disease.

病症	處 方	構 成 內 容	基本處方
脫陽證	大固陽湯	大附子 一枚炮切作八片 白朮 乾薑炮 各五錢 木香 二錢半	附子理中湯類 薑附湯
臍宜溫緩	代灸塗臍膏	大附子 馬蘭子 蛇床子 木香 肉桂 吳茱萸 各等分	



病症	處 方	構成內容	基本處方
面寒	升麻附子湯	升麻 附子炮 葛根 白芷 黃芪蜜炒各七分 人參 草豆蔻 甘草灸 各五分 益智仁 三分	升摩葛根湯類 保元湯
瘧疫	聖散者	草豆蔻殼 猪苓 石菖蒲 赤茯苓 良薑 獨活 赤芍藥 附子 麻黃 厚朴 藁本 枳殼 柴胡 澤瀉 細辛 防風 白朮 薑香 半夏 吳茱萸 蒼朮 甘草 各五分	麻黃附子甘草湯 麻黃附子細辛湯 四苓散
內傷病始爲熱 中終爲寒中	白朮附子湯	白朮 附子炮 蒼朮 陳皮 厚朴 半夏 赤茯苓 澤瀉 各一錢 猪苓 五分 肉桂 四分	平陳湯類 五苓散
虛煩	既濟湯	竹葉石膏湯去石膏加炮附子 二錢也。 (入門)	生脈散類
癰疽 雜證	托裏溫中湯	附子炮 二錢 乾薑 羌活 各一錢二分半 甘草灸 一錢 益智 丁香 沈香 木香 茴香 陳皮 各五分	薑附湯 五香散類
噎膈 反胃	附子散(2)	大附子一箇坐於磚上四面着火漸逼淬入生薑汁中又灸又淬之可盡汁半椀許搗爲末粟米飲調下一錢 不過三服差或加丁香一錢同爲末。(入門)	
帶下	桂附湯(2)	附子炮 三錢 肉桂 一錢 黃柏 知母 各五分	
邪祟 尸疰	八毒赤散	雄黃 磬石 朱砂 牡丹皮 附子炮 藜蘆 巴豆霜 各一兩 蟠蛇灸 一條	
冷淋	生附湯	附子生 滑石各七分 木通 半夏製瞿麥 各一錢二分	
厥逆 頭痛	羌活附子湯	麻黃 附子 防風 白芷 白僵蠶炒各一錢 黃柏 羌活 蒼朮各七分 黃芪 升麻 甘草灸 各五分	防風湯類 二妙散 芪附湯
鼻鼽	細辛膏	細辛 川椒 乾薑 川芎 吳茱萸 附子 各七錢半 皂角屑五錢 桂心 一兩 猪油 六兩	薑附湯
外障	膾茶飲	芽茶 附子 白芷 各一錢 細辛 川芎 防風 羌活 荊芥 各半錢	九味羌活湯類 防風湯類
項強	椒附散	大附子 一箇 炮去皮 脣末之右末 每二錢 好川椒 二十粒 白麪墳 滿水一盞半 薑七片 煎至 七分 去椒入鹽空心溫服	
便血	平胃地榆湯	蒼朮 升麻 附子炮 各一錢 地榆 七分 葛根 厚朴 白朮 陳皮 赤茯 各五分 乾薑 當歸 神曲炒 白芍藥 益智仁 人參 甘草灸 各三分	平胃散 升摩葛根湯 附子理中湯 薑附湯
咳逆	羌活附子湯 (2)	羌活 附子炮 茴香炒 乾薑炮 木香 丁香 各一錢	薑附湯
鬚髮 黃落	三聖膏	附子 蔓荊子 柏子仁 各五錢	

Table 5-5. The basic prescription include Radix Aconiti Lateralis Preparata and nonimplicated basic prescription.

구분	附子가 포함된 基本方	附子가 포함되지 않은 基本方
泄瀉病	薑附湯, 附子理中湯, 八柱散, 固腸丸類	平胃散, 異功散, 四君子湯, 理中湯, 錢氏異功散, 真人養臟湯, 牽正散類, 芍藥甘草湯, 星香散類, 半夏厚朴湯類
寒, 少陰, 傷寒病	薑附湯, 附子理中湯, 通脈四逆湯, 桂枝加附子湯類	三白湯類, 二陳湯, 生脈散, 防風湯類, 保元湯, 三黃瀉心湯, 理中湯, 四君子湯類
風, 濕, 瘀	桂枝加附子湯	四君子湯, 牽正散類, 三仙丸
黃疸, 前陰, 虛勞 .浮腫病	茵陳薑附湯, 茵陳四逆湯類, 丁香練實丸類, 果附湯, 八味丸	二陳湯類, 枳朮丸, 一捻金元類, 乳香散, 內補丸, 十全大補湯類
其他疾患	附子理中湯, 麻黃附子甘草湯, 麻黃附子細辛湯, 薑附湯, 芪附湯	升摩葛根湯, 保元湯, 平陳湯類, 五苓散, 生脈散類, 五香散類, 防風湯類, 二妙散, 理中湯, 九味羌活湯類, 平胃散

III. 考察

『東醫寶鑑』 中 附子가 主藥으로 配伍된 方劑의 治療領域에 대한 調査 결과는 Table 1에서 보는 바와 같이 寒, 大便, 小兒, 風, 胸, 諸瘡, 痰瘡, 黃疸, 前陰, 津液, 虛勞, 濕, 浮腫, 救急, 脖, 面, 溫疫, 內傷, 火, 癰疽, 嘔吐, 胞, 邪祟, 小便, 頭, 鼻, 眼, 頸項, 血, 咳嗽, 毛髮 等 모두 31개의 領域에서 活用하고 있음을 알 수 있다. 이 중 寒門에 사용한 處方 빈도 수가 17.3%로 가장 많았고, 大便門이 11.5% 小兒門이 7.1%, 風門이 5.8%로 조사되어, 附子는 주로 虛寒에 관련된 痘證에 활용하고 있음을 알 수 있었다 (Table 1).

附子가 主藥으로 활용된 痘症을 조사해보면 Table 2에서 보는 바와 같이 大便門에 있어서는 寒泄, 泄瀉諸證, 休息痢, 久泄, 滑泄, 虛痢, 濕泄에, 寒門에는 少陰形證, 傷寒陰毒, 陽極似陰, 可汗不可汗證, 傷寒痞氣, 中寒證, 痰冷에, 小兒에는 慢脾風, 慢驚風에 附子를 主藥으로 사용하고 있는 것으로 보아 附子는 주로 腸腑의 虛寒, 泄瀉, 痞疾, 少陰病, 傷寒陰證, 中寒證, 小兒 慢脾風, 慢驚風 등에 溫中 散寒 回陽을 목적으로 가장 많이 활용되었음을 알 수 있다 (Table 2-1). 風門에는 瘀證病, 手足癱瘓, 諸風通治, 痰涎壅盛에,

濕門에는 中濕, 風濕에, 胸에는 心痛, 陰陽毒結胸, 冷心痛에, 諸瘡에는 瘟瘡, 凍瘡에 津液에는 自汗, 亡陽證에, 痰瘡에는 痰瘡, 瘰疾, 黃疸에는 陰黃에, 前陰에는 諸瘡通治, 陰痿에, 虛勞에는 陽虛, 虛勞通治에, 浮腫에는 水腫에 附子를 사용하고 있어 附子가 中風, 中濕證이나 心痛, 亡陽, 瘰疾, 黃疸, 瘴, 浮腫 등 虛寒에 관련된 痘證에 활용하고 있음을 알 수 있다 (Table 2-2) (Table 2-3).

그러므로 風寒濕으로 인한 神經系統의 鎮痛作用과 循環障礙 또는 염증반응을 억제하여 오래된 감각신경의 마비, 마목감, 동통, 부종을 주로 호소하는 寒性 류마티스관절질환이나 慢性 虛寒 미란성피부병, 저체온으로 대사활동의 저하로 발생되는 虛勞 浮腫 등에 활용할 수 있을 것으로 생각된다.

그밖에도 面寒, 溫疫, 虛煩, 癰疽, 反胃, 帶下, 邪祟, 冷麻, 厥逆頭痛, 鼻鼽, 外障, 項強, 便血, 咳逆, 鬚髮黃落 등 다양한 병증에 활용되었는데, 附子는 虛寒으로 인한 인체의 陰證에 內外上下를 막론하고 사용하고 있어 附子의 효능이 인체의 전반에 걸쳐 작용하고 있음을 보여주고 있다. 湯液本草에도 “附子는 手少陽三焦, 命門에 속하는 藥으로 浮上하는 가운데沈降하여 가지 않는 곳이 없다.”라고 기술하고 있다 (Table 2-4).

附子가 主藥으로 配伍된 方劑의 痘因病理는 Table



3에서 보는 바와 같다. 腸腑病理에서는 下元虛寒, 五臟氣虛, 腎虛, 脾寒 病理에, 虛寒病理에서는 陽虛, 積冷, 陰盛隔陽, 結陰 等의 病理에, 六氣病理에서는 傷寒病理와 中風, 中濕, 中寒, 風寒濕, 風濕의 病理에 附子가 主藥으로 사용됨을 알 수 있었다. 그러므로 附子는 命門, 腎, 脾의 虛寒이나 陽虛, 積冷, 結陰과 風, 寒, 濕 等의 邪氣에 관련된 病因·病理에 주로 사용하고 있음을 알 수 있다(Table 3).

附子가 主藥으로 사용된 處方의 一貼當 附子 使用量을 조사한 결과는 Table 4와 같았으며 一回 使用量으로 계산해 보았을 때는 2 分에서 5.0 錢까지로 나타났음을 알 수 있었다. 그 중에서도 一回 使用量이 1.0 錢~1.5 錢인 경우가 전체의 44.9%로 가장 많은 빈도수를 나타냈으며, 그 다음으로 多用된 용량으로는 2.0 錢~2.5 錢이 26.6%, 2 分~7 分이 20.4%로 조사되었으며, 빈도수가 가장 많이 사용된 용량에서는 沈衰된 腸腑의 機能回復, 引經, 溫中散寒의 효능을 얻기 위해 사용되고 있음을 알 수 있었다. 附子의 사용량에 대한 특별한 경향성은 찾아 볼 수 없었지만, 瘰疾이 심하여 정신이 혼미할 경우에는 5.0 錢까지 활용하였고, 傷寒 古方에서 유래된 真武湯, 桂枝附子湯에서와 극심한 虛寒으로 인한 帶下病에서는 附子를 3.0 錢까지 사용하고 있는 특징을 보였다(Table 4).

附子가 主藥으로 配伍된 方劑의 構成內容을 조사해 보면 Table 5에서 보는 바와 같다. 즉 腸腑의 虛寒 및 泄瀉症에는 薑附湯, 附子理中湯, 平胃散, 異功散과 같이 溫中建脾之劑 등을 배합하고, 傷寒陰毒, 中寒證과 같이 陰證으로 인한 寒證에는 薑附湯, 理中湯을 활용한 예가 많았으며, 風證, 手足癱瘓에는 牽正散類 등을 활용하였다. 또한 瘰證, 風濕, 中濕에 白朮을 배합하여 활용하여, 白朮과 附子를 동시에 사용하면 風濕痺之效에 효과가 있음을 알 수 있으며, 自汗亡陽증에는 桂枝를 배합하여 表에 작용하게 하였고, 乾薑을 배합한 경우에는 裏로 작용하게 하여 表裏를 모두 다스리게 함을 알 수 있다(Table 5-1)(Table 5-2).

또한 黃疸에는 茵陳薑附湯, 諸般 痘症에는 回香 川練肉 木香 등을 配伍하였으며, 虛勞에는 十全大補湯類와 같이 氣血을 補하는 方劑를 配合하였고, 浮腫에는 利水하는 茯苓 등을 配伍하여 사용하였다(Table 5-3).

그밖에도 脫陽證, 陽氣下陷, 胃中虛寒일 때는 大固陽湯, 托裏溫中湯, 羌活附子湯(2) 경우에서와 같이 乾薑을 配伍하였고, 脾胃기능을 정상화 시킬 때는 白朮附子湯 平胃地榆湯의 경우에서와 같이 平胃散 등을 활용하였으며, 外感邪氣를 배출하는데에는 臘茶飲 羌活附子湯 聖散者에서와 같이 羌活 防風 등을 配伍하여 사용하고 있음을 알 수 있다(Table 5-4).

전체적으로는 附子가 포함된 基本方으로는 薑附湯 附子理中湯 四逆湯 桂枝加附子湯 등이 있었으며, 附子가 포함되지 않은 基本方으로는 理中湯 平胃散 牽正散類 四君子湯 異功散 防風湯類 二陳湯 生脈散 등이 활용되었음을 알 수 있다(Table 5-5).

위에서 보는 바와 같이 附子는 配伍되는 處方이나 藥物에 따라 回陽救逆·補火助陽·溫中止痛·逐風寒濕邪하는 다양한效能을發揮하고 있음을 알 수 있다. 따라서 附子가 主藥으로 配伍된 70種의 方劑에 대한 治療領域, 痘症 및 主治, 病因·病理, 使用量, 處方構成 等을 분석한 결과, 附子의 임상활용에 대한 이론적 근거를 제시하는데 도움이 될 수 있을 것으로 생각된다.

IV. 結論

『東醫寶鑑』 中 附子가 主藥으로 配伍된 方劑 70處方에 대하여 資料調査를 한 바 다음과 같이 要約할 수 있다.

1. 附子가 主藥으로 構成된 方劑의 治療領域에 따른 처방빈도는 寒門이 17.3%, 大便門이 11.5%, 小兒門이 7.1%, 風門이 5.8%로 조사되었으며 그밖에 27개 영역에서 사용되고 있다.
2. 附子는 寒泄, 慢脾風, 少陰形證, 傷寒陰毒, 陰黃等의 痘症에 가장 많이 활용되고 있었으며, 그밖에도 陽極似陰, 瘰瘍, 諸瘡通治, 水腫等의 50개 痘症에 다양하게 사용되었다.
3. 附子가 主藥으로 사용된 處方의 病因·病理는 下元虛寒, 腎虛, 五臟氣虛, 脾寒 等의 腸腑虛寒과 陽虛, 積冷, 陰盛隔陽, 結陰 病理 및 傷寒, 風寒濕, 風濕 等의 六氣病理에 사용하였다.
4. 附子가 主藥으로 사용된 處方의 1회 附子 使用量은 2 分~5.0 錢까지이며, 1.0 錢~1.5 錢을 가장 많이 사용하였다.
5. 附子는 配伍되는 藥物과 처방에 따라 回陽救逆·補

火助陽·溫中止痛·逐風寒濕邪 等의 다양한 효능을 발휘하고 있음을 알 수 있었으며, 附子가 포함된 基本方으로는 薑附湯, 附子理中湯, 四逆湯, 桂枝加附子湯 등이 있었으며, 附子가 포함되지 않은 基本方으로는 理中湯, 平胃散, 牽正散類, 四君子湯, 異功散, 防風湯類, 二陳湯, 生脈散 등이 활용되었다.

감사의 글

이 논문은 2018학년도 원광대학교 교비지원에 의해 수행됨

References

1. MG Shin. Clinical Galenical pharmacy, Seoul, Youngrimsa, 2002: 298.
2. DG Ahn. Illustrated Korean Herb book, Seoul, Kyohaksa, 1998: 566.
3. CM Kim. Chinese herb dictionary, Seoul, Jeongdam, 1997: 1850~6.
4. MG Shin. illustration Hyangyak(Pharmacognosy) Versus dictionary. Seoul. younglimsa, 1990: 475~6.
5. Korean Oriental Medicine Research Institute. Herbal Medicine, Seoul Yeogang Publishers, 1998: 331~3.
6. SP Ju. Herbal Medicine. Academy Books, 2002: 393~7.
7. BS Gang. Compiled, Clinical Application of Korean Herbal Medicine, Seoul Youngrimsa, 1994: 193~6.
8. KO Kim. Practical Galenical pharmacy, Seoul, Jeongdam, 2001: 213~5.
9. JH Han. Korean Medicine Pharmacology, Seoul, Euiseongdang, 2004: 271~8.
10. HG Kim. korean medicine pharmacology. Seoul. Goryeo Medical, 2000: 61~2.
11. CW Park. Korean Herb Pharmacology, Seoul, Shinkwang publishing company, 2004: 82.
12. HC Kim. Korean Herb Pharmacology, Seoul, Chipmundang, 2001: 250~2.
13. JP Lim. Herb galenical pharmacy, Seoul, Shinilsangsa, 2003: 202~4.
14. CS Mun. Component & utilize of Herb, Seoul, Ilwelseogak, 1999: 264~7.
15. BS Wang. Modern Chinese pharmacology. Tianjin. Tianjin science technology publishing company, 1999: 600~4.
16. Korean Medicine Pharmacology dictionary editing committee. : Korean Medicine Pharmacology, Seoul, Shinilsangsa, 2006: 430~6.
17. JC Jang. somunzipju. Seoul. Daesungmedia Group, 1993: 115, 168.
18. DW Lee. Dongwon medical collection. Beijing. People's Medical Publishing House(PMPH), 1995: 70, 214, 474.
19. HJ Jung. Modern research and application of traditional Chinese medicine. Beijing. HakWon publishing company, 1998: 2568~97.
20. MS Moo. Legal Chinese medicine pharmacology and clinical. Scholarly books Published of SeAn Company, 1998: 648~52.
21. L San. Galenical pharmacy jeong-ui. Seoul. CungHong, 2009: 540~53.
22. HG Wang. Decoction and Material Medica. Tianjin. TianjinScience and technology publishing company, 1999: 118~9.
23. SJ Lee. Compendium of materia medica. Beijing. Traditional Chinese medicine publishing company, 1999: 500~7.
24. JS Ju. Jang Jung-kyung pharmacology. Gyeonggi. Daesung Medical organization, 2008: 220~4.
25. A Wang. Galenical pharmacy gu jin. Seoul. Goryeo Jeonsan, 1999: 78~83.
26. J Hur. Dongeuibogam, Seoul, Ryogang publishing company, 2003: 180, 242, 249, 419, 490, 519, 520, 522, 527, 539, 542, 551, 557, 563, 595, 625, 648, 701, 781, 900, 903, 931, 1156, 1163, 1390, 1393, 1408, 1415, 1473, 1493, 1495, 1500, 1522, 1548, 1556, 1565, 1598, 1599, 600, 1697, 1765, 1791, 1897, 1959,



- 1960, 2035, 2036, 2066, 2073, 2077, 2091, 2204, 2115, 2259, 2284, 2369, 2574, 2583, 2584.
27. BC Bae. Standard clinical of prescriptions. Seoul. Sungboosa, 1995: 96, 98, 186, 187, 188, 390, 392.
28. S Gong. Gogumeuegam, Namchang, Kangsue science technology publishing company, 1990: 74, 138, 277.
29. JK Jang. Jang Jung-kyung Encyclopedia. Seoul. Daesung Munhwasa, 1993: 115, 168.
30. D Woo. Euehackjeungjun, Seoul, Sungbosa, 1986: 43.
31. WW Lim. Seeudeukhyubang, Seoul, Euesungdang, 1993: 63, 189, 272, 323.
32. CH Joo. Shinpyeon Dangaesimbaek sangha, Seoul, Daesungmunhwasa, 1993: 65, 129, 277, 288, 943.
33. SM Jin. Taepyunghweminhwajaegukbang, Beijing, People's Medical Publishing House(PMPH), 1985: 98.
34. MT Jin. Saminbang, Seoul, Hansungsa, 1977: 111, 122.
35. YS Yang. euilimchalyoo. (The translation of South Korea's medical department. seventh volume). Seoul. HaeDong Medical organization, 1999: 45.
36. C Lee. Euhanipmun, Seoul, Beobinmunhwasa, 2009: 1120, 1124, 1554, 1800, 1996.
37. JH Kong. Manbyunghaechun, Seoul, Beobinmunhwasa, 2007: 328.
38. Y Roo. Euehakgangmok Sangha, Seoul, Iljungsa, 1984: 879, 960, 1266, 1617.
39. YG Yun. Oriental Prescription & Explanation, Seoul, Euesungdang, 2002: 551~71.
40. YG Yun. New Korean Compositional Herbal Effect 2223, Seoul, Jeongdam, 2006: 14, 79, 84, 112, 130, 145, 152, 153, 203, 212, 235, 299, 304, 392, 468, 469, 472, 516, 601, 703, 782, 796, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 883, 884, 937, 1005, 1006, 1055, 1169, 1256, 1456, 1492, 1506, 1703, 1705, 1709, 1713, 1822, 1836, 1959, 2157, 2177, 2184, 2193, 2230, 2262, 2280, 2467, 2468.