

## 한국 성인에서 수면양상, 일주기 유형과 우울증상 간의 상관관계

김동희<sup>1</sup> · 강태욱<sup>2</sup> · 고상현<sup>1</sup>

<sup>1</sup>서울특별시 은평병원 정신건강의학과, <sup>2</sup>의정부 을지대학교병원 정신건강의학과

### Association Between Sleep Pattern, Chronotype and Depressive Symptoms in Korean Adults

Dong Hee Kim, MD,<sup>1</sup> Tae Uk Kang, MD,<sup>2</sup> Sang Hyun Koh, MD<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Department of Psychiatry, Seoul Metropolitan Eunpyeong Hospital, Seoul, Korea

<sup>2</sup>Department of Psychiatry, Uijeongbu Eulji Medical Center, Eulji University School of Medicine, Uijeongbu, Korea

Korean J Biol Psychiatry 2021;28(2):58-69

<https://doi.org/10.22857/kjbp.2021.28.2.004>

결과의 수면 양상 특성에 대한 기술에서 기상 시간(wake time)의 경우 새벽 6시부터 7시까지 “입면”하는 경우를 중간점으로 극단으로 갈수록 우울증상의 비율이 높아졌다고 하였으나, “입면”하는 경우를 “기상”하는 경우로 수정 합니다.

© This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.